

خرید کتاب های کنکور

با تخفیف ویژه

۹  
ارسال رایگان

Medabook.com



مدابوک



دریافت برنامه ریزی و مشاوره

از مشاوران رتبه برترا

مو<sup>۰</sup> کنکوری آیدی نوین

۰۲۱ ۳۸۴۴۲۵۴





## فصل ۶

جريان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ۱۳۷



## فصل ۷

مغناطیس و القای الکترومغناطیسی ۱۷۰




## فصل ۸

حرکت بر خط راست ۲۰۸



## فصل ۹

دینامیک ۲۳۴



## فصل ۱۰

نوسان و موج ۲۵۶



## فصل ۱۱

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته‌ای ۳۰۲



## فصل ۱

۷

فیزیک و اندازه‌گیری



## فصل ۲

۲۳

کار، انرژی و توان



## فصل ۳

۴۲

ویژگی فیزیکی مواد



## فصل ۴

۷۵

دما و گرما



## فصل ۵

۱۰۶

الکتریسیته ساکن

پاسخنامه تشریحی

پاسخنامه کلیدی

۳۲۸


۵۳۵

## (فصل ۱)

# فیزیک و اندازه‌گیری

(درس ۱)

## مبانی فیزیک



«علماء جعفری»

ارزش هر انسانی به اندازهٔ چیزی است که دوستش دارد.

### روش علم


نظریه پردازان فیزیک برای خلق یک نظریه یا قانون کارهای زیر را انجام می‌دهند:

**(الف)** پدیده‌های طبیعی را مشاهده می‌کنند (منظور از مشاهده، بررسی دقیق یک پدیده و عوامل تأثیرگذار بر آن پدیده است). **(ب)** پدیده‌های طبیعی، بی حساب و کتاب و بی ارتباط به هم نیستند. آن‌ها در این مرحله سعی می‌کنند نظم موجود در پدیده‌ها و ارتباط بین آن‌ها را مشخص کنند. **(پ)** نتیجهٔ تحقیق خود را به شکل قانون، مدل یا نظریهٔ فیزیکی بیان می‌کنند. **(ت)** قانون‌ها، مدل‌ها یا نظریه‌های ارائه شده زمانی معتبرند که درستی آن‌ها توسط مشاهدات و آزمایش‌های جدید تأیید شوند، در غیر این صورت، باید آن‌ها را کنار بگذاریم.

### اصلاح نظریه‌های فیزیکی

با رشد تکنولوژی و افزایش دقت و سایل اندازه‌گیری، مشاهده و آزمایش‌های دقیق‌تری را می‌توان انجام داد که این آزمایش‌های جدید ممکن است باعث ابطال یا تصحیح یک مدل یا نظریهٔ فیزیکی شوند. بنابراین نظریه‌های فیزیکی آزمون‌پذیرند و می‌توانند اصلاح شوند؛ این ویژگی اصلاً چیز بدی نیست! خیلی هم خوب است و به قول کتاب درسی « نقطه قوت دانش فیزیک است ».«

**نموده** نظریه‌ای کی از معروف‌ترین نظریه‌هایی است که بارها تغییر کرده، طوری که هر نظریه نسبت به نظریهٔ قبلی کامل‌تر شده و شناخت ما را نسبت به دنیای اتم‌ها بیشتر کرده است. شکل زیر مراحل دگردیسی این نظریه را نشان می‌دهد:



### قانون

قانون‌ها معمولاً به شکل گزاره‌هایی کلی و در عین حال واضح و مختصر بیان می‌شوند و نشان می‌دهند پدیده‌ها چگونه اتفاق می‌افتد. قوانین فیزیک معمولاً روابط ریاضی بین کمیت‌های فیزیکی را بیان و دامنه وسیعی از پدیده‌های طبیعی را توصیف می‌کنند.

**نموده** قانون دوم نیوتن ( $F = ma$ ) ارتباط ریاضی سه کمیت نیرو، جرم و شتاب را بیان می‌کند و در تمام شاخه‌های فیزیک کاربرد دارد.


### اصل

معمولًا برای توصیف پدیده‌هایی که عمومیت کمتری دارند و دامنه محدودتری از پدیده‌های طبیعی را شامل می‌شوند به جای قانون از اصطلاح «اصل» استفاده می‌کنیم.

**نموده** طبق اصل پاسکال اگر به بخشی از شاره ساکن و محصور، فشار وارد کنیم، فشار در همه نقاط شاره به یک اندازه تغییر می‌کند. محدودیتی که برای ویژگی‌های شاره قائل شده‌ایم، باعث شده از اصطلاح اصل استفاده کنیم.

### مدل‌سازی در فیزیک

اکثر پدیده‌های فیزیکی آن‌قدر پیچیده هستند که بررسی همه جانبه آن‌ها خیلی سخت و گاهی نشدنی است. به طور مثال تحلیل حرکت یک برگ اصلاً کار ساده‌ای نیست. برگ با حرکت‌های انتقالی، پیچشی و چرخشی به سمت پایین سقوط می‌کند؛ تازه مقاومت هوا و وزش باد هم روی حرکت برگ اثر می‌گذارد و همه این عوامل باعث می‌شوند نتوانیم تحلیل دقیقی از حرکت برگ ارائه دهیم. به همین خاطر باید یک سری عواملی را که در حرکت برگ چندان اثرگذار نیستند، نادیده بگیریم، به این کار، یعنی ساده‌کردن یک پدیدهٔ فیزیکی تا حدی که امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود، می‌گوییم «مدل‌سازی».



**نمونه** وقتی توپ را مطابق شکل (الف) پرتاپ می‌کنیم، عوامل جزئی زیادی حرکت توپ را بیجیده می‌کنند که در مدل سازی حرکت توپ از آن‌ها جسم می‌بوشیم:

- ۱ توپ را به صورت یک ذره در نظر می‌گیریم؛ با این ساده‌سازی، از چرخش توپ به دور خود و اندازه و شکل آن سرفناصر می‌کنیم (شکل ب).
- ۲ مقاومت هوا و باد به توپ نیرو وارد می‌کنند، وجود آن‌ها را نادیده می‌گیریم و فرض می‌کنیم توپ در خلاً حرکت می‌کند (شکل ب).
- ۳ وقتی توپ بالا می‌رود، وزن آن به طور جزئی کاهش می‌یابد، فرض می‌کنیم وزن توپ در ارتفاع‌های مختلف یکسان است (شکل ب).

**پرسش** آیا در مدل سازی حرکت توپ می‌توانیم از وزن توپ صرف نظر کنیم؟

**پاسخ** اصلاً اگر نیروی جاذبه زمین نباشد، توپ از مدار زمین خارج و حرکت توپ کاملاً متفاوت با حرکت واقعی آن می‌شود.

در مدل سازی باید اثرهای جزئی را حذف کنیم، نه عوامل مهم و تعیین‌کننده در آن پدیده را.

## پرسش‌های چهارگزینه‌ای

(برگرفته از متن کتاب درسی ■)

۱- کدام یک از عبارت‌های زیر درست است؟


(۱) مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان همواره ثابت و معترف هستند.

(۲) یک اصل در دامنه وسیعی از پدیده‌ها معتبر است، اما یک قانون فیزیکی برای توصیف دامنه محدودتری از پدیده‌های فیزیکی استفاده می‌شود.

(۳) آزمایش و مشاهده بیشترین نقش را در پیشبرد و تکامل علم فیزیک ایفا کرده است.

(۴) ویژگی آزمون‌پذیری و اصلاح نظریه‌های فیزیکی، نقطه قوت دانش فیزیک است.

۲- در شکل مقابل، شخصی در حال هل دادن یک جسم بزرگ است. برای مدل سازی این پدیده، کدام فرض مناسب است؟



(۱) نیروی وزن وارد بر شخص و جسم را نادیده می‌گیریم.

(۲) جسم را به صورت یک ذره در نظر می‌گیریم.

(۳) از نیروی اصطکاک وارد بر شخص و جسم صرف نظر می‌کنیم.

(۴) فرض می‌کنیم جسم همواره ساکن باقی می‌ماند.

۳- خودرویی که در حال حرکت است، ترمز کرده و پس از طی مسافتی متوقف می‌شود. برای مدل سازی این پدیده کدامیک از ساده‌سازی‌های زیر نامناسب است؟




(۱) با صرف نظر از اندازه و شکل خودرو آن را به صورت یک ذره در نظر می‌گیریم.

(۲) از چرخش چرخ‌ها صرف نظر کرده و خودرو را همانند یک جسم صلب در نظر می‌گیریم.

(۳) فرض می‌کنیم خودرو در خلاً حرکت می‌کند و از مقاومت هوا چشم پوشی می‌کنیم.

(۴) از اصطکاک بین خودرو و زمین صرف نظر می‌گیریم.

۴- شکل زیر، گلوله کوچکی را نشان می‌دهد که به وسیله نخ از سقف آویزان شده است. گلوله را اندکی از وضع تعادل خود جابه‌جا کرده و رها می‌کنیم تا حرکت رفت و برگشتی انجام دهد. برای مدل سازی این پدیده کدام ساده‌سازی مناسب نیست؟




(۱) از نیروی وزن نخ در مقابل نیروی وزن گلوله صرف نظر می‌کنیم.

(۲) از مقاومت هوا و اصطکاک چشم پوشی می‌کنیم.

(۳) فرض می‌کنیم زاویه انحراف گلوله از وضع تعادل ( $\theta$ ) خیلی کوچک باشد.

(۴) مسیر حرکت گلوله را به صورت قسمتی از یک دایره در نظر می‌گیریم.

۵- شکل زیر، تعادل گرمایی بین دو جسم با دمای متفاوت را نشان می‌دهد. برای مدل سازی این پدیده، کدامیک از ساده‌سازی‌های زیر مناسب است؟



(الف) دو جسم را به صورت دو ذره در نظر می‌گیریم که در حال مبادله گرما هستند.

(ب) فرض می‌کنیم دو جسم هیچ گرمایی با محیط مبادله نمی‌کنند.

(پ) گرمای ویژه دو جسم را یکسان در نظر می‌گیریم.

(ت) فرض می‌کنیم در هر لحظه، دمای قسمت‌های مختلف هر یک از جسم‌ها یکسان است.


۶- شکل مقابل، چگونگی تشکیل تصویر را در یک دوربین عکاسی نشان می‌دهد. درباره مدل سازی این پدیده، کدام فرض نادرست است؟

(۱) از مدل پرتوی نور برای مدل سازی انتشار نور استفاده می‌کنیم.

(۲) باریکه نور را به صورت پرتوهای موازی نور مدل سازی می‌کنیم.

(۳) فرض می‌کنیم پرتوهایی که از یک چشم نور خیلی دور می‌آیند، با هم موازی‌اند.

(۴) فرض می‌کنیم پرتوهایی که از یک جسم حقیقی بازتاب می‌شوند، همگرا هستند و یک تصویر تشکیل می‌دهند.



# کمیت‌های فیزیکی و دستگاه پیش‌گیری

## طبقه‌بندی کمیت‌ها

در فیزیک به هر چیزی که قابل اندازه‌گیری باشد، «کمیت» می‌گوییم؛ مثل دما، سرعت و ... . کمیت‌ها را از یک لحاظ کلی می‌توان به دو دسته «نرده‌ای» و «برداری» تقسیم کرد:

### کمیت نرده‌ای

کمیت‌هایی که صرفاً با یک عدد و یکای مناسب شناسایی می‌شوند، «کمیت نرده‌ای» می‌گوییم. این کمیت‌ها از قواعد جمع جبری (همانی که در دوره دبستان فوایده‌ای!) پیروی می‌کنند.

**نمونه** جرم، یک کمیت نرده‌ای است که با یک عدد و یکای مناسب (مثل  $65 \text{ kg}$ ) بیان می‌شود. ضمن این‌که جرم از قواعد جمع معمولی پیروی می‌کند (مثلاً همیشه  $3 \text{ kg} + 4 \text{ kg} = 7 \text{ kg}$  است).

### کمیت برداری

این کمیت‌ها یک چیز اضافه‌تر از کمیت‌های نرده‌ای دارند: جهت، بنابراین از قواعد جمع برداری پیروی می‌کنند.

**نمونه** اگر از شخصی آدرس محلی را بپرسید و او جواب بدهد  $2 \text{ km}$ ، آن محل را نمی‌توانید پیدا کنید! جهت رسیدن به آن مکان نیز باید مشخص شود؛ پس جایه‌جایی و مکان، کمیت‌هایی برداری هستند. فرض کنید شخصی مطابق شکل روبرو، ابتدا فاصله  $AB = 4 \text{ m}$  و سپس  $BC = 3 \text{ m}$  را طی می‌کند. شخص در این حرکت  $5 \text{ m}$  جایه‌جا می‌شود:  $AC = 5 \text{ m}$

همان‌طور که می‌بینید جایه‌جایی را نمی‌توانیم با استفاده از جمع معمولی حساب کنیم.

**نمونه** کمیت‌های برداری را به کمک پیکانی بالای نماد آن کمیت نشان می‌دهیم؛ مثل  $\vec{F}$  که نماد نیرو و  $\vec{v}$  که نماد سرعت است. حذف پیکان از روی نماد یک کمیت برداری به معنی بیان اندازه آن کمیت است. مثلاً اگر نیروی وارد بر جسمی  $N = 2 \text{ N}$  است، این موضوع باید به شکل  $F = 2 \text{ N}$  مطرح شود (اشتباه است).

### تست در کدام‌یک از گزینه‌های زیر، همه کمیت‌ها برداری هستند؟

- (۱) گرما، انرژی جنبشی، فشار      (۲) جریان الکتریکی، جرم، نیرو      (۳) تنفس، جایه‌جایی، مسافت      (۴) وزن، شتاب، سرعت

### پاسخ گزینه‌های

به سه‌تا نکته توجه کنید. یکی این‌که وقتی کمیتی از جنس نرده‌ای یا برداری است، تمام اعضای خانواده آن کمیت از همان جنس‌اند. مثلاً همه انرژی‌ها نرده‌ای‌اند؛ انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، انرژی گرمایی و خلاصه همه انرژی‌ها. با این حساب «وزن» هم

که از جنس نیرو است، برداری است. نکته دوم در مورد «جریان الکتریکی» است. با این‌که جریان جهت قائل می‌شویم، اما این کمیت برداری نیست! چون تابع قاعده جمع برداری نیست. به طور مثال در شکل روبرو، جریان‌های  $I_1$  و  $I_2$  به گره  $M$  وارد و  $I_3$  از آن خارج می‌شود. سیم‌های حامل جریان‌های  $I_1$  و  $I_2$  هر زاویه‌ای با هم بسانند، تساوی  $I_1 + I_2 = I_3$  برقرار است؛ یک کمیت برداری چنین خاصیتی ندارد.

و اما نکته سوم: از تقسیم یک کمیت برداری به یک کمیت نرده‌ای، یک کمیت برداری ایجاد می‌شود. مثلاً شتاب، حاصل تقسیم کمیت برداری نیرو بر  $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$

جایه‌جایی برداری است؛ مسافت نرده‌ای. سرعت برداری است؛ تنفس نرده‌ای.

### یکا (واحد)

به مقدار مشخصی از یک کمیت «یکا (یا واحد)» آن کمیت می‌گویند. اندازه‌گیری یک کمیت به معنی مقایسه آن کمیت با یکای آن است (به طور مثال وقتی می‌گوییم «طول جسمی  $3 \text{ m}$  است»، یعنی طول جسم  $3$  برابر یکای اندازه‌گیری طول است).

ویژگی‌های یکای استاندارد اندازه‌گیری  تغییرناپذیر باشد.  قابل بازتولید در مکان‌های مختلف باشد.

### نمونه

یکای «یارد» به صورت فاصله نوک بینی تا نوک انگشتان دست کشیده هنری اول (پادشاه انگلستان) تعریف شد و هنوز هم در بعضی کشورها برای اندازه‌گیری طول به کار می‌رود. بدترین یکای ممکن! نه ویژگی اول را دارد، نه ویژگی دوم را! (هنری اول هردو  $900$  ساله مرده!)

## کمیت‌های اصلی و فرعی

مجموع عمومی اوزان و مقیاس‌ها، طبقه‌بندی جدیدی از کمیت‌ها ارائه داد و آن‌ها را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم کرد.

### کمیت‌های اصلی

کمیت‌هایی هستند که یکای آن‌ها به طور مستقل تعریف می‌شود. به مجموعه یکاهای این کمیت‌ها «یکاهای اصلی» می‌گویند. تعداد این کمیت‌ها ۷ تا است که همراه با یکای آن‌ها در دستگاه بین‌المللی یکاهای (SI) در جدول زیر فهرست شده‌اند.



نام یکا (در SI)	نماد یکا (در SI)	کمیت
متر	m	طول
کیلوگرم	kg	جرم
ثانیه	s	زمان
کلوین	K	دما
مول	mol	مقدار ماده
آمپر	A	جريان الکتریکی
کندهلا (شمع)	cd	شدت روشنایی

### کمیت‌های فرعی

کمیت‌هایی هستند که یکاهای آن‌ها حاصل‌ضرب یا تقسیم دو یا چند یکای اصلی است. به یکاهای این کمیت‌ها «یکاهای فرعی» می‌گویند. به طور مثال، سرعت یک کمیت فرعی است که یکای آن حاصل تقسیم دو یکای اصلی (m/s) است.

بعضی یکاهای فرعی را با نام به‌خصوصی بیان می‌کنیم؛ مثل نیوتون، ژول و ...؛ بعضی هم اسم ندارند (مثل m/s).

برای تشخیص رابطه یکای فرعی با یکاهای اصلی باید رابطه ریاضی که کمیت‌های مربوط به یکاهای را به هم ربط می‌دهد پیدا کنیم و سپس جای کمیت‌های به کار رفته در رابطه را به یکای آن‌ها بدهیم.

نموده می‌خواهیم رابطه یکای نیرو در SI (یعنی نیوتون) را با یکاهای اصلی مشخص کنیم. با توجه به قانون دوم نیوتون می‌نویسیم:

$$F = ma \rightarrow N = kg \times m / s^2 \rightarrow (یکای a). (یکای m) = (یکای F)$$

تست یکاهای ژول و پاسکال کدام رابطه را با یکدیگر دارند؟

$$Pa = J / m^4$$

$$Pa = J \cdot m^3$$

$$Pa = J / m^3$$

$$Pa = J \cdot m^1$$

$$P = \frac{F}{A} \rightarrow P = \frac{N}{m^2} \rightarrow Pa = \frac{N}{m^2} \rightarrow Pa = J \cdot m^{-3} \quad (I)$$

با توجه به رابطه فشار و نیرو:

$$W = Fd \rightarrow W = (یکای F). (یکای d)$$

و با توجه به رابطه کار و جابه‌جایی:

$$J = (Pa \cdot m^3) \times m \rightarrow Pa = J / m^3$$

از مقایسه (I) و (II) نتیجه می‌گیریم:

### سازگاری یکاهای

دو طرف یک رابطه فیزیکی قطعاً از جنس یک کمیت فیزیکی‌اند (متناً نمی‌شود یک طرف رابطه از جنس نیرو باشد و طرف دیگر از جنس انرژی)، بنابراین یکای دو طرف یک تساوی فیزیکی برابر است.

تست شتاب (a)، فاصله (x) و زمان (t) یک متحرک با رابطه  $P = 2xt^2$  به یکدیگر مربوط هستند (۲ عددی بدون یکا است). P چه عددی باشد تا معادله

این متحرک درست باشد؟

$$-2$$

$$2$$

$$-\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

با توجه به سازگاری یکاهای دو طرف رابطه، می‌نویسیم:

$$(یکای t)^P = (یکای x)^P$$

$$m / s^2 = m \times s^P \rightarrow s^{-2} = s^P \rightarrow P = -2$$

پاسخ گزینه ۴

## پرسی سه یکای اصلی (متر-کیلوگرم-ثانیه)

### طول

مطلوب زیر تکامل یکای طول (متر) را در گذر زمان نشان می‌دهد:

(الف) یک دهمیلیونیم ( $\frac{1}{10^7}$ ) فاصله استوا تا قطب شمال. (ب) فاصله میان دو خراش ظریف در نزدیکی دو انتهای میله‌ای از جنس پلاتین-ایridیم

در دمای صفر درجه سلسیوس. (پ) مسافتی که نور در مدت ۵  $\frac{1}{299792458}$  در خلاصی می‌کند.

پاسخ گزینه ۲

۱۰

یکای متر برای مقاصد نجومی یکای کوچکی است و در این زمینه از یکاهای بزرگتری مثل «یکای نجومی» و «سال نوری» استفاده می‌شود.

### یکای نجومی (AU)

برابر میانگین فاصله زمین تا خورشید است. با توجه به این که نور با تندی تقریبی  $m/s = 3 \times 10^8$  فاصله خورشید تا زمین را در مدت تقریبی ۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه طی می‌کند، یکای نجومی برابر است با:

$$x = vt \rightarrow 1 \text{ AU} = 3 \times 10^8 \times (8 \times 60 + 20) = 3 \times 10^8 \times 500 \rightarrow 1 \text{ AU} = 1/5 \times 10^{11} \text{ m}$$

### سال نوری (ly)

مسافتی است که نور در مدت یک سال در خلاطی می‌کند. برای محاسبه این فاصله به روش زیر عمل می‌کنیم:

$$1 \text{ year} = 365 \text{ day} = 365 \times 24 \text{ h} = 365 \times 24 \times 3600 \text{ s} = 31536000 \text{ s}$$

$$x = vt \rightarrow 1 \text{ ly} = 3 \times 10^8 \times 31536000 = 94608 \times 10^{11} \text{ m} \rightarrow 1 \text{ ly} = 9/5 \times 10^{15} \text{ m}$$

تست تقریباً ۸ دقیقه طول می‌کشد تا نور از سطح خورشید به زمین برسد. با این فرض، یک سال نوری چند برابر یکای نجومی است؟

۱۳۱۴۰۰ (۴)

۶۵۷۰۰ (۳)

۳۲۸۵۰ (۲)

۲۱۹۰۰ (۱)

$$\bullet \frac{1 \text{ ly}}{1 \text{ AU}} = \frac{\sqrt{v} \times t}{\sqrt{v} \times t} = \frac{365 \times 24 \times 60 \text{ (min)}}{8 \text{ (min)}} = 65700$$

پاسخ گزینه ۳

### جرم

یکای جرم در SI کیلوگرم است. یک کیلوگرم جرم استوانه‌ای از جنس آلیاژ پلاتین-ایریدیم است که در موزه سور فرانسه نگهداری می‌شود و نمونه‌های مشابهی از آن برای هر کشور ارسال شده است.

### زمان

در هر رویدادی که به طور منظم و در بازه‌های زمانی یکسان اتفاق می‌افتد، می‌توان برای تعریف یکای زمان استفاده کرد. طبق یک تعریف قدیمی «یک ثانیه  $\frac{1}{86400}$  میانگین روز خورشیدی است». چون زمان یک شبانه‌روز ثابت نیست، این تعریف منسخ شده و در حال حاضر ثانیه براساس ساعت‌های اتمی تعریف می‌شود.

### تبدیل یکاهای

#### ضریب تبدیل

اگر یکای  $y$  با یکای  $x$  رابطه  $y = ax$  را داشته باشند، به نسبت  $\frac{y}{ax}$  یا  $(\frac{y}{ax})$  «ضریب تبدیل» یکاهای  $y$  و  $x$  می‌گوییم. در واقع ضریب تبدیل، نسبتی از یکاهای است که برابر ۱ است.

نمونه هر ساعت ۳۶۰۰ ثانیه است، پس  $(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}})$  ضریب تبدیل این دو یکا به یکدیگر هستند.

با فرض  $x = y$ ، برای تبدیل عددی برحسب یکای  $y$  به یکای  $x$  کافی است عدد مورد نظر را در ضریب تبدیل  $(\frac{ax}{y})$  ضرب کنیم. به این روش در تبدیل یکاهای به یکدیگر می‌گوییم «تبدیل زنجیره‌ای».

نمونه فرض کنیم با استفاده از ضریب تبدیل مناسب می‌خواهیم بینیم  $24 \text{ h}$  چند ثانیه است. با توجه به این که هر ساعت  $3600 \text{ s}$  است، می‌نویسیم:

$$24 \text{ h} = (24 \text{ h})(1) = (24 \text{ h})\left(\frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}}\right) = 24 \times 3600 \text{ s} = 86400 \text{ s}$$

توجه کنید که اگر در نمونه بالا از ضریب تبدیل  $(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}})$  استفاده می‌کردیم، یکاهای  $h$  با هم ساده نمی‌شدند. همیشه باید از ضریب تبدیلی استفاده کنید که صورت آن بر حسب یکایی باشد که می‌خواهیم به دست آوریم و مخرج آن شامل یکایی باشد که می‌خواهیم آن را حذف کنیم.

تست طول زمینی ۱۰۰ یارد است. طول این زمین تقریباً چند سانتی‌متر است؟ (۱) یارد برابر ۳ فوت و هر فوت برابر ۱۲ اینچ و هر اینچ تقریباً ۲/۵ سانتی‌متر است.

۹۰۰۰ (۴)

۳۰۰۰ (۳)

۱۴۴۰ (۲)

۹۰۰ (۱)

رابطه مستقیم یکاهای یارد و سانتی‌متر مطرح نشده است. باید سهتاً ضریب تبدیل به کار ببریم. یکی از آن‌ها یارد (yd) را به فوت

(ft)، دیگری فوت را به اینچ (in) و آخری اینچ را به سانتی‌متر (cm) تبدیل کند:

$$\bullet 1 = 100 \text{ yd} = (100 \text{ yd})(1)(1)(1) = 100 \times \frac{3 \text{ ft}}{1 \text{ yd}} \times \frac{12 \text{ in}}{1 \text{ ft}} \times \frac{2/5 \text{ cm}}{1 \text{ in}} = 100 \times 3 \times 12 \times 2/5 \text{ cm} = 9000 \text{ cm}$$

پاسخ گزینه ۴



**تست** سه اتومبیل A، B و C به ترتیب با تندی‌های  $30$  متر بر ثانیه،  $72$  کیلومتر بر ساعت و  $3$  مایل بر دقیقه حرکت می‌کنند. کدام مقایسه بین تندی سه اتومبیل درست است؟ (هر مایل  $1609\text{ m}$  است).

$$v_C > v_A > v_B \quad (4)$$

$$v_A > v_C > v_B \quad (3)$$

$$v_C > v_B > v_A \quad (2)$$

$$v_A > v_B > v_C \quad (1)$$

تندی اتومبیل‌های B و C را بحسب متر بر ثانیه به دست می‌آوریم تا بتوانیم به راحتی آن‌ها مقایسه کنیم:

$$v_B = 72 \text{ km/h} = (72 \frac{\text{km}}{\text{h}})(1)(1) = (72 \frac{\text{km}}{\text{h}})(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}})(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}}) = \frac{72}{3600} \text{ m/s} = 20 \text{ m/s}$$

$$v_C = 3 \frac{\text{mi}}{\text{min}} = (3 \frac{\text{mi}}{\text{min}})(1)(1) = (3 \frac{\text{mi}}{\text{min}})(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}})(\frac{1609 \text{ m}}{1 \text{ mi}}) = \frac{1609}{20} \text{ m/s} = 80 \text{ m/s} \Rightarrow v_C > v_A > v_B$$

**پاسخ گزینهٔ ۴**

### پیشوندهای یکاها

یکی از خوبی‌های دستگاه SI این است که می‌توانید با اضافه کردن پیشوندهایی به یکاهای اصلی، آن یکاهای را به اندازه کافی کوچک با بزرگ کنید. این پیشوندها در جدول رو به رو فهرست شده‌اند. (پیشوندهایی که کاربرد بیشتری دارند با رنگ مشخص شده‌اند).

پیشوندهای کاهنده			پیشوندهای افزاینده		
نام پیشوند	نماد	ضریب	نام پیشوند	نماد	ضریب
دیسی	d	$10^{-1}$	دیکا	da	$10^1$
سانتی	c	$10^{-2}$	هکتو	h	$10^2$
میلی	m	$10^{-3}$	کیلو	k	$10^3$
میکرو	μ	$10^{-6}$	مگا	M	$10^6$
نانو	n	$10^{-9}$	گیگا (جیگا)	G	$10^9$
پیکو	p	$10^{-12}$	ترا	T	$10^{12}$
فیمتو	f	$10^{-15}$	پتا	P	$10^{15}$

**نمونه** اضافه کردن پیشوند میکرو در کنار یکای اصلی، آن یک را یک میلیون بار کوچک‌تر و اضافه کردن پیشوند مگا در کنار یکای اصلی، آن یک را یک میلیون بار بزرگ‌تر می‌کند:  $1\text{ }\mu\text{m} = 10^{-6}\text{ m}$  ،  $1\text{ Mm} = 10^6\text{ m}$

$1\text{ }\mu\text{m}$  را یک «میکرون» می‌نامند.

پیشوندهای یکاها

**تست** جرم یک گیره کاغذ  $10^{-4}\text{ kg}$  است. جرم این گیره چند میلی‌گرم است؟

$$10^{-7} \quad (4)$$

$$10^{-3} \quad (3)$$

$$10^{-1} \quad (2)$$

$$10^2 \quad (1)$$

**راه اول** با استفاده از تبدیل زنجیره‌ای داریم:

**پاسخ گزینهٔ ۱**

$$10^{-4} \text{ kg} = (10^{-4} \text{ kg})(1)(1) = (10^{-4} \text{ kg})\left(\frac{10^3 \text{ g}}{1 \text{ kg}}\right)\left(\frac{1 \text{ mg}}{10^{-3} \text{ g}}\right) = 10^{-4} \times 10^6 \text{ mg} = 10^2 \text{ mg}$$

**راه دوم** در واقع می‌خواهیم بدایم  $\frac{10^{-4} \text{ kg}}{1 \text{ mg}}$  چه مقدار است. می‌نویسیم:

$$\frac{10^{-4} \text{ kg}}{1 \text{ mg}} = \frac{10^{-4} \times 10^3 \text{ g}}{1 \times 10^{-3} \text{ g}} = 10^2$$

هنگام تبدیل یکاهای توان دار به یکدیگر، ضرب معادل پیشوند را هم باید به توان برسانید.

$$1\text{ m} = 10^3\text{ cm}$$

**نمونه** به روش تبدیل یکاهای  $\text{m}^3$  به  $\text{cm}^3$  و  $\text{m}^3$  به  $\text{cm}^3$  توجه کنید:


$$(1\text{ m})^3 = (10^3\text{ cm})^3 \rightarrow 1\text{ m}^3 = 10^9\text{ cm}^3$$

$$(1\text{ m})^3 = (10^3\text{ cm})^3 \rightarrow 1\text{ m}^3 = 10^9\text{ cm}^3$$

یک هکتومتر مربع را یک «هکتار» می‌نامیم. طبق محاسبات زیر هر هکتار  $10000\text{ m}^2$  است:

$$1\text{ hm} = 10^2\text{ m} \rightarrow (1\text{ hm})^2 = (10^2\text{ m})^2 \rightarrow 1\text{ hm}^2 = 10^4\text{ m}^2 \rightarrow 1\text{ hm}^2 = 10000\text{ m}^2$$

هر لیتر (L) معادل  $1000\text{ cm}^3$  است؛ بنابراین برای تبدیل یکاهای  $\text{m}^3$ ،  $\text{L}$  و  $\text{cm}^3$  به یکدیگر می‌توانید از شکل رو به رو استفاده کنید.



تغییرات یک کمیت در واحد زمان را آهنگ تغییر آن کمیت می‌نامند.

**نمونه** وقتی می‌گوییم آهنگ رشد گیاهی  $10\text{ }\mu\text{m/s}$  است، یعنی این گیاه در هر ثانیه  $10\text{ }\mu\text{m}$  رشد می‌کند.

**تنت** از یک شلنگ آب با آهنگ  $5\text{ m}^3$  لیتر بر دقیقه خارج می‌شود. چند ساعت طول می‌کشد تا توسط این شلنگ، استخراج به ابعاد  $2\text{ m} \times 6\text{ m} \times 5\text{ m}$  از آب پر شود؟

$$V = 5 \times 6 \times 2 = 60 \text{ m}^3$$

$$20 \text{ l}$$

$$120 \text{ l}$$

$$20 \text{ l}$$

حجم استخراج برابر است با:

**پاسخ گزینه ۳**

آهنگ خروج آب از شلنگ را بر حسب متر مکعب بر دقیقه حساب می‌کنیم:

پس هر دقیقه  $0.05 \text{ m}^3$  آب به آب استخراج اضافه می‌شود و زمان پرشدن استخراج ( $t$ ) را می‌توان به صورت زیر حساب کرد:

$$V = (5 \times 10^{-2} \frac{\text{m}^3}{\text{min}}) \times t \rightarrow t = \frac{V}{(5 \times 10^{-2} \frac{\text{m}^3}{\text{min}})} = \frac{60 \text{ m}^3}{(5 \times 10^{-2} \frac{\text{m}^3}{\text{min}})} = 1200 \text{ min} = 20 \times 60 \text{ min} = 20 \text{ h}$$

### نمادگذاری علمی

نمادگذاری علمی روش مناسبی برای نوشتمن اعداد بسیار کوچک است. در این روش هر عدد را به شکل حاصل ضرب عددی از  $1$  تا  $10$  در توان صحیحی از  $10$  می‌نویسند. بنابراین، عدد  $X$  با استفاده از نمادگذاری علمی به شکل زیر نوشتمن می‌شود:

$$x = a \times 10^n \quad (1 \leq a < 10, n \in \mathbb{Z})$$

**نمونه** سرعت نور در  $299792458 \times 10^8 \text{ m/s}$  است. این عدد به کمک نمادگذاری علمی به شکل  $299792458 \times 10^8 \text{ m/s}$  نوشتمن می‌شود. (توان  $8$  برابر تعداد رقم‌هایی است که بعد از ممیز قرار داده‌ایم). قطر میانگین یک گلوبول قرمز  $71 \times 10^{-6} \text{ m}$  است. این عدد با استفاده از نمادگذاری علمی به شکل  $71 \times 10^{-6} \text{ m}$  نوشتمن می‌شود (عدد  $6$  بیانگر تعداد رقم‌هایی است که ممیز به سمت راست رفته است).

## پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۷- کدام عبارت درباره یک کمیت فیزیکی نادرست است؟

(۱) به هر چیزی که بتوان آن را اندازه گرفت، کمیت فیزیکی می‌گوییم.

(۲) یکای هر کمیت، مقدار معینی از همان کمیت است.

(۳) همه کمیت‌های فیزیکی دارای یکای هستند.

(۴) کمیت‌هایی که یکای آنها به طور مستقل تعریف شده است را کمیت‌های اصلی می‌نامیم.

۸- آیا لازم است برای هر یک از کمیت‌های فیزیکی یکای مستقلی تعریف شود؟ چرا؟

(۱) بله، چون تعداد کمیت‌های فیزیکی محدود است.

(۲) بله چون هر کمیتی یکای مخصوص به خود را دارد.

(۳) خیر، چون در عمل با تمام کمیت‌های فیزیکی سروکار نداریم.

(۴) خیر، چون رابطه‌ها و تعریف‌های فیزیکی کمیت‌ها را به هم مرتبط می‌کند.

۹- در دستگاه **SI** از کمیت‌های اصلی و ..... از کمیت‌های فرعی می‌باشد.

(۱) حجم و جرم - زمان و انرژی

(۲) طول و جرم - مساحت و نیرو

۱۰- کدام یک از گزینه‌های زیر از یکاهای اصلی در **SI** نمی‌باشد؟

(۱) آمپر

(۲) مول

(۳) گرم

(۴) کندلا

۱۱- از میان کمیت‌های زیر، دو تا جزو کمیت‌های اصلی هستند. یکای این دو کمیت در **SI** مطابق کدام گزینه است؟

نیرو، فشار، مقدار ماده، انرژی، شدت روشنایی و توان

(۴) مول، شمع

(۳) کیلوگرم، کندلا

(۲) پاسکال، وات

(۱) نیوتون، ژول

۱۲- می‌دانیم نیوتن (N) یکای نیرو، پاسکال (Pa) یکای فشار، ژول (J) یکای انرژی و وات (W) یکای توان در **SI** هستند. کدام کمیت بر حسب یکاهای اصلی به درستی بیان نشده است؟

$$W = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} \quad (4)$$

$$J = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^3} \quad (3)$$

$$Pa = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2} \quad (2)$$

$$N = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} \quad (1)$$

۱۳- چندتا از کمیت‌های زیر نرده‌ای هستند؟

مسافت، جایه‌جایی، سرعت، تندی، جرم و وزن

(۴) ۵

(۳) ۴

(۲) ۳

(۱) ۲

(آزمون پیش‌دانشگاهی ریاضی ■ ۷۷)

۱۴- کدام گروه از کمیت‌های زیر همگی برداری هستند؟

- (۱) توان، اندازه حرکت، سرعت  
 (۲) سرعت، نیرو، شتاب  
 (۳) شتاب، انرژی، نیرو  
 (۴) مکان، اندازه حرکت، کار
- ۱۵- کدام یک از عبارت‌های زیر درباره کمیت‌های برداری کامل‌تر است؟
- (۱) هر کمیتی که قابل اندازه‌گیری باشد، برداری است.  
 (۲) کمیتی است که تنها بزرگی دارد.  
 (۳) کمیتی است که علاوه بر بزرگی، جهت هم دارد.  
 (۴) کمیتی است که از قاعده جمع برداری پیروی می‌کند.

۱۶- می‌توان برای زمان جهت قائل شد (از گذشته به حال مثبت)، همچنین جریان الکتریکی در یک سیم دارای جهت است. با این وصف کمیت‌های زمان و جریان (تمرین فیزیک دانشگاهی ▲)

- (۱) برداری، برداری  
 (۲) عددی، برداری  
 (۳) برداری، عددی  
 (۴) عددی، عددی

۱۷- مکان یک ذره (x) نسبت به زمان (t) با تابع  $x = At - t^3$  بیان شده است. A چه کمیتی است؟

- (۱) مکان  
 (۲) سرعت  
 (۳) شتاب  
 (۴) زمان

۱۸- شعاع اتم هیدروژن برابر  $5 \times 10^{-9}$  آنگستروم است. شعاع این اتم با نمادگذاری علمی چند متر است؟

- (۱)  $5 \times 10^{-9}$   
 (۲)  $5 \times 10^{-11}$   
 (۳)  $5 \times 10^{-10}$   
 (۴)  $5 \times 10^{-12}$

۱۹- با توجه به پیشوندهای یکاها، کدام عبارت نادرست است؟

- (۱) هر دقیقه معادل  $6 \times 10^1$  ثانویه است.  
 (۲) هر لیتر معادل یک دسی‌متر مکعب است.  
 (۳) در کدام گزینه، تبدیل یکاها نادرست است?

$$1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$1 \text{ g/L} = 1 \text{ kg/m}^3$$

$$1 \text{ m/s} = 3.6 \text{ km/h}$$

$$1 \text{ cm/s} = 0.6 \text{ L/min}$$

۲۰- حداکثر سرعت مجاز در یک جاده کوهستانی، ۴۵ مایل بر ساعت است. اگر هر مایل برابر ۱۶۰۰ متر باشد، این سرعت چند متر بر ثانیه است؟ (تمرین فیزیک پایه ▲)

- (۱) ۷/۸  
 (۲) ۱۲/۵  
 (۳) ۲۰  
 (۴) ۲۸/۱

۲۱- از شلنگی آب با آهنگ  $8 \text{ cm}^3/\text{s}$  خارج می‌شود. آهنگ خروج آب از این شلنگ چند لیتر بر دقیقه است؟ (تمرین کتاب درسی ▲)

- (۱) ۴/۵  
 (۲) ۱۵  
 (۳) ۱۵  
 (۴) ۲۵

۲۲- هواپیمایی در فاصله ۳۰۰۰۰ پا (فوت) از سطح آزاد دریاها در حال پرواز است. ارتفاع پرواز این هواپیما چند کیلومتر است؟ (۱ in = 2/5 cm, 1 ft = 12 in)

- (۱) ۳  
 (۲) ۵  
 (۳) ۹  
 (۴) ۳۰

۲۳- ذرع و فرسنگ از جمله یکاهای قدیمی ایرانی برای طول هستند. هر ذرع ۱۰۴ سانتی‌متر و هر فرسنگ ۶۰۰۰ ذرع است. یک فرسنگ مربع تقریباً چند هکتار است؟ (تمرین کتاب درسی ▲)

- (۱) ۶/۲۴  
 (۲) ۳۹۰۰  
 (۳) ۳۹۰۰  
 (۴) ۶۲۴۰

۲۴- ذرع و فرسنگ از جمله یکاهای قدیمی ایرانی برای طول هستند. هر ذرع ۱۰۴ سانتی‌متر و هر فرسنگ ۶۰۰۰ ذرع است. یک فرسنگ مربع تقریباً چند هکتار است؟ (تمرین کتاب درسی ▲)

- (۱) ۶/۲۴  
 (۲) ۳۹۰۰  
 (۳) ۳۹۰۰  
 (۴) ۶۲۴۰

۲۵- جرم الماس کوه نور ۱۸۲ قیراط است. اگر هر قیراط ۲۰۰ میلی‌گرم و هر مثقال معادل  $4/68$  گرم باشد، جرم این الماس تقریباً چند مثقال است؟ (تمرین کتاب درسی ▲)

- (۱) ۷/۷۸  
 (۲) ۸/۳۱  
 (۳) ۳۶/۴  
 (۴) ۳۸/۹

۲۶- خروار، از جمله یکاهای قدیمی ایران برای اندازه‌گیری جرم است. هر خروار تقریباً معادل چند کیلوگرم است؟ (فعالیت کتاب درسی ▲)

- (۱) ۳  
 (۲) ۱۰  
 (۳) ۱۰۰  
 (۴) ۳۰۰

۲۷- گیاهی در مدت ۵ روز،  $21/6$  سانتی‌متر رشد می‌کند. آهنگ رشد این گیاه چند میکرومتر بر ثانیه است؟ (تمرین کتاب درسی ▲)

- (۱) ۰/۵  
 (۲) ۱  
 (۳) ۲/۵  
 (۴) ۵

۲۸- سال نوری (ly) واحد اندازه‌گیری چه کمیتی است و اگر  $500$  ثانیه طول بکشد تا نور از خورشید به زمین برسد، یک یکای نجومی (AU) معادل چند متر است؟ (تمرین کتاب درسی ▲)

- (۱) طول،  $6 \times 10^8 \text{ m/s}$   
 (۲) طول،  $1/5 \times 10^{11} \text{ m}$   
 (۳) زمان،  $6 \times 10^5$   
 (۴) زمان،  $1/5 \times 10^{11}$

۲۹- اتومبیلی برای پیمودن  $100$  مایل،  $\frac{8}{3}$  گالن بنزین مصرف می‌کند. این اتومبیل با مصرف هر لیتر سوخت چند کیلومتر را طی می‌کند؟ (هر گالن برابر با  $75/2$  لیتر و هر مایل معادل  $1/6$  کیلومتر است). (تمرین فیزیک دانشگاهی ▲)

- (۱) ۵  
 (۲) ۸  
 (۳) ۱۰  
 (۴) ۱۶

۳۰- کالایی برای رسیدن به مقصد باید  $5$  مایل را با قطاری با تندی  $40 \text{ km/h}$  و  $45$  مایل را با یک کشتی با تندی  $15$  گره دریایی طی کند. کل زمانی که برای حمل کالا صرف می‌شود، چند ساعت است؟ (هر مایل در خشکی تقریباً  $1600$  متر و در دریا تقریباً  $1800$  متر است و هر گره دریایی تقریباً معادل  $5/8 \text{ m/s}$  است). (برگرفته از تمرین کتاب درسی ▲)

- (۱) ۲  
 (۲) ۳  
 (۳) ۴  
 (۴) ۵



پژوهش  
دانش  
کنگره

۱۴

# اندازه‌گیری

هیچ اندازه‌گیری‌ای نمی‌تواند بینقص باشد و به دلیل محدودیت در ساخت ابزارهای اندازه‌گیری و خطاهای انسانی، همه اندازه‌گیری‌ها با خطأ و عدم قطعیت همراه هستند؛ اما با اتخاذ تدبیری می‌توان این خطاه را تا حد امکان کاهش داد.


- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>۱ استفاده از وسیله‌ای با دقت اندازه‌گیری بالاتر</li> <li>۲ کاهش خطاهای انسانی (مهارت شخصی آزمایشگر)</li> <li>۳ افزایش تعداد دفعات اندازه‌گیری</li> </ol> | عوامل مؤثر در افزایش دقت اندازه‌گیری |
|---|--------------------------------------|

## دقت اندازه‌گیری

### دقت وسیله اندازه‌گیری

به کمترین مقداری که با یک وسیله اندازه‌گیری می‌توان اندازه گرفت «دقت اندازه‌گیری» آن وسیله می‌گویند و در این کتاب آن را با  $a$  نشان می‌دهیم.

**نمونه**



کوچکترین طولی که توسط خطکش شکل (الف) می‌توان اندازه گرفت  $1 \text{ mm}$  است. پس

$$a = 1 \text{ mm}$$

دقت اندازه‌گیری این خطکش  $1 \text{ mm}$  است:

در واقع، دقت اندازه‌گیری وسایل مدرج، برابر کمینه درجه‌بندی آن وسیله است. فرض کنید دماسنجد

رقمی (دیجیتال) شکل (ب) در محیطی با دمای  ${}^{\circ}\text{C}$  قرار دارد. به تدریج محیط را گرم می‌کنیم.

همراه با افزایش دمای محیط، عددی که دماسنجد نشان می‌دهد بالا و بالاتر می‌رود. اولین عددی که

نشان می‌دهد چقدر است؟  $1 {}^{\circ}\text{C}$ ، عدد بعدی:  $2 {}^{\circ}\text{C}$ ،  $3 {}^{\circ}\text{C}$ ،  $4 {}^{\circ}\text{C}$ ، ...؛ پس فاصله

بین عددهای متوالی که با دماسنجد نشان می‌دهد  $1 / 0 {}^{\circ}\text{C}$  است و دقت اندازه‌گیری با این دماسنجد

همین مقدار است.



.

در واقع، دقت اندازه‌گیری در وسایل رقمی، برابر یک واحد از آخرین رقمی است که وسیله نشان می‌دهد.

### خطای اندازه‌گیری

اگر شخصی اصول اندازه‌گیری با وسایل مدرج را بداشد، حداقل استباهی که در اندازه‌گیری با آن وسیله ممکن است مرتكب شود برابر نصف کمینه درجه‌بندی آن وسیله است. اصطلاحاً می‌گوییم خطای اندازه‌گیری با وسایل مدرج (e) برابر مثبت یا منفی نصف دقت اندازه‌گیری با آن وسیله است:

**e** =  $\pm \frac{a}{2}$  به همین ترتیب می‌توانیم استدلال کنیم خطای اندازه‌گیری در وسایل رقمی برابر مثبت یا منفی دقت آن وسیله است:

**نمونه** در نمونه قبلی، دقت اندازه‌گیری با خطکش برابر است با:

و خطای اندازه‌گیری با دماسنجد:

### رقم‌های بامعنای

به رقم‌های حاصل از اندازه‌گیری، «رقم‌های بامعنای» می‌گویند.

**نمونه** فرض کنید نتیجه اندازه‌گیری طول میله‌ای با یک خطکش  $3 / 4 \text{ m}$  و با خطکش دیگر  $4 / 3 \text{ m}$  باشد. تعداد رقم‌های بامعنای در اندازه‌گیری اول ۲ و در اندازه‌گیری دوم ۳ است (یعنی  $0.4\bar{m}$  را هم به حساب می‌آوریم). واضح است که هر چه تعداد ارقام بامعنای در یک اندازه‌گیری بیشتر باشد، دقت آن اندازه‌گیری بالاتر است.

در هنگام تبدیل یکاها به یکدیگر نباید تعداد ارقام بامعنای تغییر کند.

**نمونه** فرض کنید طول جسمی  $42 \text{ mm}$  گزارش شده است. طول این جسم  $0.42 \text{ m}$  است. هر دوی این اعداد ( $42 \text{ mm}$ ،  $0.42 \text{ m}$ ) دو رقم بامعنای دارند، به این معنی که در عدد  $0.42 \text{ m}$  صفرهای سمت چپ عدد ۴ جزو ارقام بامعنای حساب نمی‌شوند.

صفرهایی که سمت چپ اولین عدد غیرصفر هستند، بامعنای نیستند (قبول دارید این صفرهایا، با صفری که از اندازه‌گیری به دست می‌آید، فرق می‌کنند؟!)

**نمونه** فرض کنید طول جسمی  $42 \text{ m}$  گزارش شده است. طول این جسم چند میلی‌متر است؟ اگر جوابتان  $42000 \text{ mm}$  است، سخت در استباهید!  $42 \text{ m} = 42 \times 10^3 \text{ mm}$  و در شمارش ارقام بامعنای (در عدد  $42 \times 10^3 \text{ mm}$  فقط به عدد ۴۲ توجه کنیم).

اگر عدد ثبت شده در یک اندازه‌گیری به شکل  $x^n \cdot ab$  مطرح شود ( $x \in \mathbb{Z}$ ،  $n$  عدد دارای  $n$  رقم بامعنای است و عدد صحیح  $x$  تأثیری در تعداد ارقام بامعنای ندارد).

## رقم حدسی

به آخرین رقم سمت راست حاصل از یک اندازه‌گیری که آن را حدس می‌زنیم، «رقم حدسی» می‌گوییم. این رقم‌ها هم جزو ارقام بامعنا به حساب می‌آیند.

در وسایل اندازه‌گیری رقمی هم آخرین رقم سمت راست، مشکوک و غیرقطعی است (یعنی امکان دارد اشتباه باشد).



## گزارش نتیجه اندازه‌گیری

نتیجه حاصل از یک اندازه‌گیری به صورت «خطای وسیله  $\pm$  عدد حاصل از اندازه‌گیری» نوشته می‌شود.

عدد حاصل از اندازه‌گیری در ابزارهای مدرج شامل عدد حدسی شخص آزمایشگر نیز می‌باشد.

تعداد رقم‌های اعشاری خطای باید با تعداد رقم‌های اعشاری عدد حاصل از اندازه‌گیری برابر باشد.

**نمونه:**  $4/2 \pm 0/25$

$4/2 \pm 0/3$

5.420 kg

**تست** صفحه نمایشگر یک ترازوی دیجیتال مطابق شکل رویه‌رو است. کدامیک از اعداد زیر، گزارش درست‌تری از این اندازه‌گیری است؟

(۵)  $42 \pm 0/01$  kg (۲)

(۵۴۲۰  $\pm 0/5$ ) g (۴)

۵/۴۲۰ kg (۱)

(۵۴۲۰  $\pm 1$ ) g (۳)

ترازو  $g$  ۵۴۲۰ را نشان می‌دهد. نزدیک‌ترین اعداد به این عدد که ممکن است ترازو نشان دهد، اعداد  $5419 g$  و  $5421 g$  است؛

پس فاصله بین مقادیر متولی که ترازو نشان می‌دهد  $1 g$  است:  $e = a = 1 g = 5420 \pm 1 g$

(توجه بفرمایید که عدد صفر در خوانده ترازو جزو ارقام بامعنا است و حق نداریم آن را نادیده بگیریم و گزارشی مانند (۲) را ارائه دهیم).

**تست** در شکل رویه‌رو، طول چوب را توسط یک خطکش اندازه‌گرفته‌ایم. نتیجه این اندازه‌گیری (برحسب سانتی‌متر) به کدام صورت باید بیان شود؟

۳/۸۴  $\pm 0/02$  (۲)

۳/۸  $\pm 0/3$  (۴)


۳/۸۴  $\pm 0/25$  (۱)

۳/۸  $\pm 0/25$  (۳)

**پاسخ گزینه ۳** شاید شخصی طول چوب را نزدیک به  $7/3$  و شخص دیگری نزدیک به  $8/3$  بیان کند. هر دوی این اعداد محترمان! رقم ۳ قطعی و رقم‌های ۷ و ۸ غیرقطعی‌اند. ما مجاز نیستیم از دو رقم غیرقطعی برای گزارش نتیجه یک اندازه‌گیری استفاده کنیم. پس (۱) و (۲) قابل قبول نیستند. از  $a = 0/5 cm$  طرفی فاصله در جهات متولی خطکش و در نتیجه دقت اندازه‌گیری توسط آن  $0/5 cm$  است:

خطای اندازه‌گیری توسط این خطکش برابر است با:  $e = \pm 0/25 cm$

عدد گزارش شده ( $3/8$ ) یک رقم اعشار دارد، خطای اندازه‌گیری هم باید یک رقم اعشار داشته باشد. پس  $e = \pm 0/3 cm$  (۴) و طول چوب را  $cm$  ( $3/8 \pm 0/3$ ) بیان می‌کنیم.



**مهارت شخص آزمایشگر** مهارت شخص آزمایشگر در به کارگیری ابزار اندازه‌گیری روی دقت اندازه‌گیری تأثیرگذار است. یکی از این مهارت‌ها نحوه خواندن نتیجه اندازه‌گیری با ابزارهای اندازه‌گیری مدرج است که با یک نمونه توضیح داده می‌شود.

**نمونه:** در شکل رویه‌رو سه شخص A، B و C از سه منظر مختلف، دمای نشان داده شده توسط یک دماستنگ را می‌خوانند. شخص B که در یک ترازو افقی با سطح مایع دماستنگ قرار دارد، عدد دماستنگ را  $20^{\circ}C$  و اشخاص A و C که به طور مایل به سطح مایع نگاه می‌کنند، عدد دماستنگ را به ترتیب  $22^{\circ}C$  و  $18^{\circ}C$  تشخیص می‌دهند. واضح است که شخص B در موضعی قرار گرفته که گزارش دقیق‌تری از دما را بیان می‌کند.

## تعداد دفعات اندازه‌گیری

برای اطمینان از نتیجه یک اندازه‌گیری آن اندازه‌گیری را معمولاً چند بار تکرار می‌کنند. نتایجی را که اختلاف زیادی با بقیه دارند، حذف و میانگین بقیه اعداد را به عنوان نتیجه نهایی گزارش می‌دهند.

**تست** طول میله‌ای را ۵ بار اندازه‌گرفته‌ایم و مقادیر  $24, 22, 31, 17$  و  $23$  (همگی بر حسب سانتی‌متر) به دست آمده است. کدام عدد زیر را (برحسب سانتی‌متر) باید به عنوان نتیجه اندازه‌گیری طول این میله بیان کنیم؟

۲۵ (۴)

۲۳/۴ (۳)

۲۳ (۲)

۲۱/۵ (۱)


اعداد  $31$  و  $17$  فاصله زیادی با سه عدد دیگر دارند و آن‌ها را به حساب نمی‌آوریم. میانگین سه عدد باقی‌مانده برابر است با:

$$\frac{24+22+23}{3} = 23 \text{ cm}$$

**پاسخ گزینه ۲**

## پرسش‌های چهارگزینه‌ای

- ۳۱- داش آموزی برای اندازه‌گیری طول مدادی مطابق شکل رو به رو عمل کرده است. کدام گزینه گزارش درست تری از این اندازه‌گیری است؟



$$5 / ۲۲ \text{ cm} \pm ۰ / ۰۵ \text{ cm} (۱)$$

$$5 / ۲۲ \text{ cm} \pm ۰ / ۱ \text{ cm} (۲)$$

$$4 / ۲۲ \text{ cm} \pm ۰ / ۰۵ \text{ cm} (۳)$$

$$4 / ۲۲ \text{ cm} \pm ۰ / ۱ \text{ cm} (۴)$$

- ۳۲- شکل رو به رو، صفحهٔ تندي سنج یک خودرو را نشان می‌دهد. کدام گزینه تندي اين اتومبیل را درست‌تر نشان (تمرين کتاب درس) می‌دهد؟

$$115 \text{ km} \pm ۲ \text{ km} (۱)$$

$$115 \text{ km} \pm ۱ \text{ km} (۲)$$

$$110 \text{ km} \pm ۵ \text{ km} (۳)$$

$$110 \text{ km} \pm ۱0 \text{ km} (۴)$$

- ۳۳- کدام گزینه نتیجهٔ اندازه‌گیری توسط دما‌سنج شکل مقابل را درست‌تر نشان می‌دهد؟




(تمرين کتاب درس)

$$27^{\circ}\text{C} \pm ۳^{\circ}\text{C} (۱)$$

$$27^{\circ}\text{C} \pm ۲ / ۵^{\circ}\text{C} (۲)$$

$$25^{\circ}\text{C} \pm ۵^{\circ}\text{C} (۳)$$

$$25^{\circ}\text{C} \pm ۲ / ۵^{\circ}\text{C} (۴)$$



- ۳۴- در شکل رو به رو، نتیجهٔ اندازه‌گیری طول جسم مطابق کدام گزینه است؟


$$4 / ۲ \text{ cm} \pm ۰ / ۲۵ \text{ cm} (۱)$$

$$4 / ۲ \text{ cm} \pm ۰ / ۳ \text{ cm} (۲)$$





$$4 \text{ cm} \pm ۰ / ۲۵ \text{ cm} (۳)$$

$$4 \text{ cm} \pm ۰ / ۳ \text{ cm} (۴)$$

- ۳۵- در شکل زیر، به وسیلهٔ یک خط‌کش، طول جسمی را اندازه گرفته‌ایم. خطای اندازه‌گیری با این خط‌کش و تعداد ارقام بامعنای حاصل از این اندازه‌گیری مطابق (تمرين کتاب درس) کدام گزینه است؟



- ۳۶- مقداری مایع در یک استوانهٔ مدرج وجود دارد. اگر نتیجهٔ اندازه‌گیری حجم مایع با این استوانهٔ مدرج به صورت  $3 / 7 \text{ cm}^3 \pm ۰ / ۳ \text{ cm}^3$  باشد، شکل استوانهٔ مدرج مطابق کدام گزینه است؟



- ۳۷- با یک خط‌کش میلی‌متری طولی را اندازه گرفته‌ایم. کدام گزینه می‌تواند نتیجهٔ این اندازه‌گیری بر حسب سانتی‌متر باشد؟

$$7 / ۲۹ \pm ۰ / ۰۵ (۴)$$

$$7 / ۲۹ \pm ۰ / ۱ (۳)$$

$$7 / ۳ \pm ۰ / ۰۵ (۲)$$

$$7 / ۳ \pm ۰ / ۱ (۱)$$

- ۳۸- ضخامت جسمی به صورت  $2 / ۴۰ \text{ mm} \pm ۰ / ۰۵ \text{ mm}$  شده است. وسیلهٔ این اندازه‌گیری کدام است؟ (دقت اندازه‌گیری متر نواری، خط‌کش، کولیس و ریزسنج به ترتیب یک سانتی‌متر، یک میلی‌متر،  $1 / ۰$  میلی‌متر و  $۱ / ۰$  میلی‌متر فرض شود.)

(سراسری ریاضی ▲ ۹۳)

۳) خط‌کش

۲) کولیس

۱) ریزسنج

- ۳۹- با یک ریزسنج مدرج، طولی را اندازه گرفته‌ایم. نتیجهٔ این اندازه‌گیری به صورت  $m = ۰۰۵۰\text{~}۲۰ \text{ mm} \pm ۰ / ۰۰۵\text{~}۲۰ \text{ mm}$  گزارش شده است. کمینه تقسیم‌بندی این ریزسنج و تعداد ارقام بامعنای نتیجهٔ این اندازه‌گیری مطابق کدام گزینه است؟

$$۳, ۰ / ۰۰۵ \text{ mm} (۴)$$

$$۴, ۰ / ۰۰۵ \text{ mm} (۳)$$

$$۳, ۰ / ۰۱ \text{ mm} (۲)$$

$$۴, ۰ / ۰۱ \text{ mm} (۱)$$

۴۰- شکل زیر، یک آمپرسنچ رقمی (دیجیتال) را نشان می‌دهد. دقت اندازه‌گیری و تعداد ارقام بامعنای این اندازه‌گیری مطابق کدام گزینه است؟

۰۶.۴۵۰<sup>A</sup>

۳،۱ mA (۱)

۴،۱ mA (۲)

۳،۰ / ۵ mA (۳)

۴،۰ / ۵ mA (۴)



۴۱- شکل زیر یک دماسنچ دیجیتال را نشان می‌دهد که دمای داخل و خارج گلخانه‌ای را می‌خواند. کدام عبارت درباره این اندازه‌گیری نادرست است؟

(تمرین کتاب درسی)

OUT °C	IN °C
10.2	18.6

(۱) خطای اندازه‌گیری برابر  $1^{\circ}\text{C}$  است.

(۲) دقت اندازه‌گیری برابر  $2^{\circ}\text{C}$  است.

(۳) حداقل اختلاف دمای داخل و خارج گلخانه برابر  $8/2^{\circ}\text{C}$  است.

(۴) حداکثر اختلاف دمای داخل و خارج گلخانه برابر  $8/6^{\circ}\text{C}$  است.

۴۲- به وسیله یک ترازوی آشپزخانه، جرم توب فوتبالی را ده بار اندازه‌گرفته‌ایم. نتایج این اندازه‌گیری در جدول زیر آورده شده است. کدام گزینه (برحسب گرم) را باید به عنوان نتیجه اندازه‌گیری جرم این توب بیان کنیم؟

۴۲۵ g	۴۱۸ g	۴۲۳ g	۴۶۴ g	۴۱۶ g
۴۲۰ g	۴۷۶ g	۴۱۴ g	۴۲۰ g	۴۲۴ g

۴۱۸ (۱)

۴۲۰ (۲)

۴۲۵ (۳)

۴۳۰ (۴)

۴۳- با یک خطکش سانتی‌متری، دو ضلع عمود بر هم یک ورق فلزی مربع شکل را اندازه‌گیری کردند. اگر نتیجه هر دو اندازه‌گیری  $10/0\text{ cm}$  باشد، حداکثر مساحت ممکن برای این ورق فلزی چند سانتی‌متر مربع بیشتر از حداقل مساحت ممکن آن است؟

۴۰ (۴)

۲۰ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)

(درس ۴)

## تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک

تفصیل

منتظر از تخمین، بیان اندازه یک کمیت به طور تقریبی است.

- ۱ اطلاعات لازم برای تعیین مقدار دقیق کمیت را نداشته باشیم.  
 ۲ نخواهیم زمان زیادی را برای محاسبات خود صرف کنیم.  
 ۳ دنبال دقت بالایی از اندازه کمیت مورد نظر نباشیم.

پنجم  
چهارم  
پنجم  
ششم  
پنجم  
ششم

### تخمین مرتبه بزرگی

نوعی از تخمین است که در آن جواب نهایی به شکل توانی از  $10^n$  بیان می‌شود. برای انجام این نوع تخمین، عدد موردنظر را با استفاده از نمادگذاری علمی به شکل  $a \times 10^n$  می‌نویسیم ( $a \in \mathbb{Z}$ ) و سپس  $a$  را مطابق روش زیر گرد می‌کنیم:

اگر  $1 \leq a < 5$  باشد: (۱)

اگر  $5 \leq a < 10$  باشد: (۰)

نمونه به نحوه تخمین مرتبه بزرگی دو عدد در زیر توجه بفرمایید:

$$x = 8340 \text{ m} \rightarrow x = 8/340 \times 10^3 \text{ m} \xrightarrow{(6/340 > 5)} x \sim 10^1 \times 10^3 \text{ m} \rightarrow x = 10^4 \text{ m}$$

$$x = 0/00491 \text{ m} \rightarrow x = 0/91 \times 10^{-3} \xrightarrow{(4/91 < 5)} x \sim 1 \times 10^{-3} \text{ m} \rightarrow x = 10^{-3} \text{ m}$$

تست جرم کره زمین  $\text{kg} = 10^{24} \times 10^5 / 98 = 10^{24} \times 10^{-31} = 10^{-31} \text{ kg}$  و جرم الکترون  $\text{kg} = 10^{24} \times 10^{-31} = 10^{-31} \text{ kg}$  چند برابر مرتبه بزرگی جرم الکترون است؟

۱۰<sup>۵۶</sup> (۴)

۱۰<sup>۵۵</sup> (۳)

۱۰<sup>۵۴</sup> (۲)

۱۰<sup>۵۳</sup> (۱)

پاسخ گزینه ۳

$$\begin{cases} M_E = 5/98 \times 10^{24} \sim 10 \times 10^{24} = 10^{25} \text{ kg} \\ m_e = 9/11 \times 10^{-31} \sim 10 \times 10^{-31} = 10^{-30} \text{ kg} \end{cases} \rightarrow \frac{M_E}{m_e} = \frac{10^{25}}{10^{-30}} = 10^{55}$$



**تست** جرم آب اقیانوس‌های کره زمین چند کیلوگرم تخمین زده می‌شود؟ (شعاع کره زمین را  $6400\text{ km}$  و عمق متوسط اقیانوس‌ها را  $4\text{ km}$  در نظر بگیرید.)

(۱)  $10^{18}\text{ kg}$       (۲)  $10^{17}\text{ kg}$       (۳)  $10^{16}\text{ kg}$       (۴)  $10^{15}\text{ kg}$

گاهی برای تخمین لازم می‌شود از اطلاعات عمومی خود اندکی استفاده کنیم! مثلاً برای حل این تست باید بدانیم که حدود  $70\%$  از سطح زمین را اقیانوس‌ها فرا گرفته‌اند. بنابراین:

$$A_{\text{زمین}} = 7 \times 10^{18} \text{ m}^2$$

$$V = Ah = (4 \times 10^{14}) \times (4 \times 10^3) = 16 \times 10^{18} \text{ m}^3$$

$$m = \rho V = 1000 \times 16 \times 10^{18} = 16 \times 10^{21} \text{ kg} \rightarrow m \sim 10^{21} \text{ kg}$$

بهتر است تا رسیدن به بخش محاسباتی نهایی از تقریب‌هایی با فاصله زیاد از اعداد اصلی (مانند تخمین مرتبه بزرگی) پرهیز کنیم.

$$A_{\text{اقیانوس}} = \pi R^2 = \pi (6400)^2 = 4 \times 10^{14} \text{ m}^2$$

$$V = Ah = (4 \times 10^{14}) \times (4 \times 10^3) = 16 \times 10^{18} \text{ m}^3$$

$$m = \rho V = 1000 \times 16 \times 10^{18} = 16 \times 10^{21} \text{ kg}$$

حجم آب اقیانوس را از حاصل ضرب مساحت در عمق آن حساب می‌کنیم: چگالی آب  $1000\text{ kg/m}^3$  است؛ یعنی هر متر مکعب آب  $1000\text{ kg}$  جرم دارد. پس:

اگر در محاسبات خود اندکی اشتباه کنید (!) ممکن است به پاسخ‌های  $10^{22}\text{ kg}$  یا  $10^{23}\text{ kg}$  برسید که با توجه به اختلاف قابل توجه گزینه‌ها باید نزدیک‌ترین گزینه به این اعداد یعنی **۲** را انتخاب کنید. این نوع طراحی گزینه‌ها باعث می‌شود اشتباهات جزئی با جرم‌های همراه نباشند!

**تست** در یک روز بارانی، ظرف استوانه‌شکلی به شعاع قاعده  $20\text{ cm}$  و ارتفاع  $5\text{ cm}$  را در هوای آزاد قرار می‌دهیم. تعداد قطره‌های بارانی که این ظرف را از آب پر می‌کند، به کدامیک از اعداد زیر نزدیک‌تر است؟

(۱)  $10^2$       (۲)  $10^4$       (۳)  $10^6$       (۴)  $10^8$

**پاسخ گزینه** **۳** ابتدا حجم استوانه را حساب می‌کنیم: هر قطره باران را به شکل کره‌ای به قطر  $4\text{ mm}$  در نظر می‌گیریم. در این صورت حجم تقریبی هر قطره برابر است با:

$$V_1 = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3 \times (2 \times 10^{-3})^3 = 32 \times 10^{-9} = 3.2 \times 10^{-8} \text{ m}^3$$

برای تشخیص تعداد قطره‌هایی که در سطلهای می‌گیرند، کافی است حجم سطله را به حجم هر قطره تقسیم کنیم:

$$n = \frac{V}{V_1} = \frac{6 \times 10^{-2}}{3.2 \times 10^{-8}} = 2 \times 10^6 \sim 10^7$$

## پرسش‌های چهارگزینه‌ای

(کتاب درسی قدریمی)

۴۴- مرتبه فشاری که یک شخص بالغ بر یک سطح افقی وارد می‌کند، چند پاسکال است؟

- (۱)  $10^2$       (۲)  $10^4$       (۳)  $10^6$       (۴)  $10^8$

۴۵- مرتبه حجم خونی که قلب یک انسان در طول عمرش پمپ می‌کند، چند لیتر است؟ (قلب در هر ضربان به طور میانگین  $70\text{ cm}^3$  خون به سرخرگ آنورت پمپ می‌کند).

- (۱)  $10^5$       (۲)  $10^6$       (۳)  $10^7$       (۴)  $10^8$

۴۶- مرتبه بزرگی تعداد نفس‌هایی که یک شخص در طول عمرش می‌کشد، به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟

- (۱)  $10^9$       (۲)  $10^{12}$       (۳)  $10^{15}$       (۴)  $10^{18}$

۴۷- اگر کل کشور ایران را به صورت مسطح در نظر بگیریم، مرتبه تعداد اسکناس‌های  $10\text{ هزار تومانی}$  لازم برای فرش کردن کل ایران به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟

- (۱)  $10^{14}$       (۲)  $10^{17}$       (۳)  $10^{20}$       (۴)  $10^{23}$

۴۸- شهر رشت با مساحتی حدود  $180\text{ km}^2$  در زمینی مسطح و هموار در شمال ایران واقع است. در یک روز طوفانی حدود  $10\text{ mm}$  باران در این شهر باریده است. مرتبه تعداد قطره‌های بارانی که در این روز روی شهر رشت باریده است، مطابق کدام گزینه است؟

- (۱)  $10^1$       (۲)  $10^4$       (۳)  $10^{11}$       (۴)  $10^{22}$

۴۹- اطراف کره زمین لایه‌ای از هوا وجود دارد. به این لایه که از گازهای مختلفی تشکیل شده است، جو زمین گفته می‌شود. اگر شعاع زمین  $6400\text{ km}$  و فشار جو در تمام نقاط سطح زمین  $10^5\text{ Pa}$  باشد، مرتبه بزرگی جرم جو زمین چند کیلوگرم است؟

- (۱)  $10^{16}$       (۲)  $10^{19}$       (۳)  $10^{22}$       (۴)  $10^{25}$

۵۰- مرتبه بزرگی حجم بنزینی که کل خودروهای ایران در یک سال مصرف می‌کنند، چند لیتر است؟

- (۱)  $10^7$       (۲)  $10^{10}$       (۳)  $10^{13}$       (۴)  $10^{16}$

۵۱- تخمین بنزینید در هر شبانه‌روز چند لیتر بنزین، به صورت بخار وارد هوای شهر تهران می‌شود؟ (جرم مولی بنزین حدود  $80\text{ g/mol}$  است و چگالی بنزین  $680\text{ g/L}$  است).

- (۱)  $10^3$       (۲)  $10^5$       (۳)  $10^7$       (۴)  $10^9$



- ۵۲- قطر متوسط سلول‌های بدن انسان در حدود  $10 \mu\text{m}$  است. مرتبه تعداد سلول‌های بدن یک انسان بالغ به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟
- (مثال کتاب گام‌به‌گام)  $10^{13}$  (۱)
- (مثال فیزیک اوهانیان)  $10^{17}$  (۲)
- ۵۳- تخمین بزرگی در یک سکه  $500\text{ g}$  توانی چند اتم وجود دارد؟ (جرم اتمی نیکل  $58 / 71 = 0.82\text{ g}$  بر مول است).
- $10^{23}$  (۴)
- $10^{19}$  (۳)
- $10^{15}$  (۲)
- $10^{11}$  (۱)
- ۵۴- تخمین بزرگی در اتفاقی به ابعاد  $3\text{ m} \times 8\text{ m} \times 3\text{ m}$  چند مولکول هوا وجود دارد؟ (مولکول هوا  $= 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  عدد آوگادرو)
- $10^{27}$  (۴)
- $10^{24}$  (۳)
- $10^{21}$  (۲)
- $10^{18}$  (۱)
- ۵۵- یکای مورد استفاده برای جرم در فیزیک هسته‌ای، یکای جرم اتمی (u) است که تقریباً برابر با جرم یک پروتون است. مرتبه بزرگی یکای جرم اتمی بر حسب کیلوگرم به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟ ( $\text{atom} = 6 \times 10^{-23} \text{ kg}$  عدد آوگادرو)
- $10^{-27}$  (۴)
- $10^{-23}$  (۳)
- $10^{-19}$  (۲)
- $10^{-15}$  (۱)
- ۵۶- چگالی یک فلز فرضی  $8 \text{ g/cm}^3$  و جرم اتمی آن  $60 \text{ g/mol}$  است. مرتبه فاصله متوسط بین اتم‌های مجاور این فلز بر حسب متر، به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟
- $10^{-16}$  (۴)
- $10^{-13}$  (۳)
- $10^{-10}$  (۲)
- $10^{-7}$  (۱)

## چگالی (درس ۵)

$$\rho = \frac{m}{V}$$


جرم موجود در واحد حجم یک ماده را چگالی می‌نامند و با  $\rho$  نشان می‌دهند.

یکای چگالی در SI «کیلوگرم بر متر مکعب ( $\text{kg/m}^3$ )» است. از یکای «گرم بر سانتی‌متر مکعب ( $\text{g/cm}^3$ )» نیز برای بیان چگالی استفاده می‌شود. هر گرم بر سانتی‌متر مکعب،  $1000$  کیلوگرم بر متر مکعب است.

$$1 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1 \times \frac{10^3 \text{ g}}{10^6 \text{ cm}^3} = 10^{-3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \rightarrow 1 \text{ g/cm}^3 = 10^{-3} \text{ kg/m}^3$$

(چگالی آب  $1 \text{ g/cm}^3$  است؛ حفظ کنید!)

اگر چند مایع مخلوط‌نشدنی را در یک ظرف بریزیم، مایعی که چگالی آن از بقیه بیشتر است در کف و مایعی که چگالی آن از بقیه کم‌تر است در سطح قرار می‌گیرد. بنابراین، در شکل روبرو داریم:



$\rho_C > \rho_B > \rho_A$

پنجه کارکرد

تست سه مایع مخلوط‌نشدنی A، B و C با چگالی‌های  $\rho_A = 4 \text{ g/cm}^3$ ،  $\rho_B = 600 \text{ kg/m}^3$  و  $\rho_C = 1200 \text{ g/L}$  را در یک لوله آزمایش می‌ریزیم و پس از تعادل، مایع ..... پایین تر و مایع ..... بالاتر از بقیه مایع‌ها قرار می‌گیرند.

B و C (۴)

A و C (۳)

C و A (۲)

B و A (۱)

پاسخ گزینه ۱

$$1 \text{ g/cm}^3 = 10^{-3} \text{ kg/m}^3 \Rightarrow \rho_A = 4000 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_C = 1200 \frac{\text{g}}{\text{L}} = 1200 \times \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-3} \text{ m}^3} = 1200 \text{ kg/m}^3 \Rightarrow \rho_A > \rho_C > \rho_B$$

با توجه به چگالی مایع‌ها، A در صدر و B در قعر قرار می‌گیرند!

برای محاسبه حجم حفره داخل یک جسم تخلی می‌توانیم با در اختیار داشتن جرم و چگالی جسم، حجم واقعی جسم را حساب و آن را ز حجم ظاهری جسم کم کیم.

تست درون یک قطعه طلا به حجم ظاهری  $12 \text{ cm}^3$  و جرم  $199 / 5 \text{ g}$  حفره‌ای وجود دارد. اگر چگالی طلا  $19000 \text{ kg/m}^3$  باشد، حجم حفره خالی چند سانتی‌متر مکعب است؟

۳ / ۴ (۴)

۲ / ۵ (۳)

۱ / ۵ (۲)

۰ / ۷۵ (۱)

$$\rho = 19000 \text{ kg/m}^3 = 19 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{\rho} = \frac{199 / 5 (\text{g})}{19 \left( \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \right)} = 10 / 5 \text{ cm}^3$$

$$V' = 12 - 10 / 5 = 1 / 5 \text{ cm}^3$$

چگالی طلا برابر است با:

پاسخ گزینه ۲

حالا حجم واقعی طلا را حساب می‌کنیم:

حجم حفره ( $V'$ ) از تفاضل حجم واقعی طلا از حجم ظاهری آن به دست می‌آید:



اگر چند ماده با جرم‌های  $m_1, m_2, \dots$  و حجم‌های  $V_1, V_2, \dots$  را با یکدیگر مخلوط کنیم، چگالی مخلوط را می‌توان از رابطه زیر حساب کرد:

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_1 + m_2 + \dots}{V_1 + V_2 + \dots}$$

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_1 + m_2 + \dots}{V_1 + V_2 + \dots}$$

اگر حجم مواد در اثر اختلاط تغییر نکند، می‌توان گفت:

**تست** جواهر فروشی در ساختن یک قطعه جواهر به جای طلای خالص، مقداری نقره نیز به کار برد است. اگر حجم قطعه ساخته شده ۵ سانتی‌متر مکعب و چگالی آن  $13/6 \text{ g/cm}^3$  باشد، جرم نقره به کار رفته چند گرم است؟ (چگالی نقره و طلا به ترتیب  $19 \text{ g/cm}^3$  و  $10 \text{ g/cm}^3$  فرض شود).

(سراسری ریاضی ■ ۹۵) (۳۸)

(۳۴)

(۳۰)

(۱)

ویژگی‌های طلا و نقره را به ترتیب با زیرنویس‌های ۱ و ۲ نشان می‌دهیم و می‌نویسیم:

$$\rho = \frac{m_1 + m_2}{V} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2}{V} \Rightarrow 13/6 = \frac{19V_1 + 10V_2}{5} \Rightarrow 19V_1 + 10V_2 = 68$$

$$\text{فرض تست: } V_1 + V_2 = 5 \Rightarrow V_1 = 5 - V_2 \Rightarrow 19(5 - V_2) + 10V_2 = 68 \Rightarrow 95 - 9V_2 = 68$$

$$\Rightarrow V_2 = 27 \Rightarrow V_2 = 3 \text{ cm}^3$$

$$m_2 = \rho_2 V_2 = 10 \times 3 = 30 \text{ g}$$

**پاسخ گزینه**

## پرسش‌های چهارگزینه‌ای

(سراسری تهری ■ ۷۵)

- کره توپری به شعاع ۱۰ سانتی‌متر، ۸ کیلوگرم جرم دارد. چگالی ماده سازنده این کره چند واحد SI است؟ (۳)

$$\frac{10000}{3}$$

$$2000$$

$$\frac{10}{3}$$

$$2$$

(سراسری ریاضی ■ ۹۶)



- می‌خواهیم از فلزی به چگالی  $6 \text{ g/cm}^3$ ، کره توپری به شعاع ۵ cm بسازیم. جرم این کره چند کیلوگرم می‌شود؟

$$4/21$$

$$3/14$$

$$2/36$$

$$1/57$$



- یک قطعه فلز به جرم  $90 \text{ g}$  را درون استوانه مدرجی می‌اندازیم. با این عمل فلز کاملاً در آب فرو می‌رود و سطح آب درون استوانه به اندازه  $1/5 \text{ cm}$  بالا می‌آید. اگر سطح مقطع استوانه  $12 \text{ cm}^2$  باشد، چگالی فلز چند واحد SI است؟ (سراسری ریاضی ■ ۸۲)


$$6000$$

$$5000$$

$$6$$

$$1$$

- مطابق شکل یک پرتقال با پوست و یک پرتقال بدون پوست را به درون ظرف محتوی آب می‌اندازیم. کدامیک به درون آب فرو می‌روند؟ چرا؟ (فعایل کتاب درس ■)



- کره توپری به شعاع R از ماده A داریم که جرمش ۲ برابر استوانه‌ای به شعاع داخلی  $\frac{R}{3}$  و شعاع خارجی R از ماده B است. اگر ارتفاع استوانه برابر  $\frac{R}{3}$  باشد، چگالی ماده A چند برابر چگالی ماده B است؟

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{2}{3}$$

$$\frac{4}{3}$$

$$\frac{3}{4}$$

- چگالی مایع A،  $\frac{4}{5}$  برابر چگالی مایع B است. اگر حجم ۸ کیلوگرم از مایع A برابر ۱۰ لیتر باشد، حجم ۵ کیلوگرم از مایع B چند لیتر است؟ (سراسری تهری ■ ۸۳)

$$6/4$$

$$5/3$$

$$4/2$$

$$3/2$$

- جرم یک ظرف فلزی توحالی  $300 \text{ g}$  است. اگر این ظرف را پر از مایعی به چگالی  $1/2 \text{ g/cm}^3$  نماییم، جرم مجموعه  $540 \text{ g}$  و در صورتی که پر از نوعی روغن نماییم، جرم مجموعه  $460 \text{ g}$  می‌شود. چگالی این روغن چند گرم بر لیتر است؟ (سراسری ریاضی ■ ۹۵)

$$800$$

$$850$$

$$900$$

$$950$$

**(تمرین فیزیک دانشگاهی)**

۶۵- چگالی متوسط زمین  $\text{cm}^3 / \text{g}$  ۵ و شعاع آن حدود  $6400 \text{ km}$  است. جرم زمین تقریباً چند کیلوگرم است؟

$$6 \times 10^{31}$$

$$6 \times 10^{37}$$

$$6 \times 10^{34}$$

$$6 \times 10^{21}$$

۶۶- ستاره‌های کوتوله سفید بسیار چگال هستند و چگالی آن‌ها در SI حدود  $100$  میلیون است. تخمين بزنید اگر شما یک قوطی کبریت از ماده تشکیل دهنده این ستاره‌ها در اختیار داشتید، جرم آن چند کیلوگرم می‌شد؟

**(تمرین کتاب درسی)**

$$20000$$

$$2000$$

$$200$$

$$20$$

۶۷- در یک روز بارانی،  $40$  میلی‌متر باران روی سطحی به مساحت  $2500$  کیلومتر مربع باریده است. اگر چگالی آب باران  $1000 \text{ kg/m}^3$  باشد، جرم این مقدار باران چند کیلوگرم است؟

$$10^{11}$$

$$10^1$$

$$10^9$$

$$10^8$$

۶۸- جرم یک گلوله آهنی  $3900$  گرم و چگالی آن  $7800 \text{ kg/m}^3$  است. اگر گلوله آهنی را به آرامی در ظرف پر از الكل فرو ببریم و چگالی الكل  $800$  گرم بر لیتر باشد، چند گرم الكل از ظرف خارج می‌شود؟

**(سراسری تهری  
۸۷ فارج)**

$$50000$$

$$40000$$

$$5000$$

$$400$$

۶۹- یک گلوله فلزی که  $800$  گرم جرم دارد را به آرامی داخل ظرفی پر از روغن مایع می‌اندازیم و  $16$  گرم روغن از ظرف بیرون می‌ریزد. اگر چگالی روغن باشد، چند گرم الكل از ظرف خارج می‌شود؟

$$50000$$

$$5$$

$$40000$$

$$4$$

۷۰- یک مکعب چوبی به ضلع  $4 \text{ cm}$  را به آرامی داخل ظرفی پر از آبی می‌اندازیم. اگر  $40$  سانتی‌متر مکعب آب از ظرف بیرون بریزد، چگالی چوب چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ ( $\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$ )

$$16000$$

$$6400$$

$$625$$

$$400$$

۷۱- با  $3$  لیتر مایع A به چگالی  $3 \text{ g/cm}^3$  و  $3$  لیتر مایع B به چگالی  $1 \text{ g/cm}^3$  محلولی می‌سازیم. اگر تغییر حجم ناچیز باشد، چگالی محلول چند واحد SI است؟

$$15000$$

$$2000$$

$$1/5$$

$$2$$

۷۲- با  $3$  کیلوگرم مایع A به چگالی  $3 \text{ g/cm}^3$  و  $3$  کیلوگرم مایع B به چگالی  $1 \text{ g/cm}^3$  محلولی می‌سازیم. اگر تغییر حجم ناچیز باشد، چگالی محلول چند واحد SI است؟

$$1500$$

$$2000$$

$$1/5$$

$$2$$

۷۳- مخلوطی از دو نوع مایع با چگالی‌های  $\rho_1$  و  $\rho_2$  درست شده است. اگر  $\frac{1}{3}$  حجم آن از مایعی با چگالی  $\rho_1$  بوده و  $\frac{2}{3}$  باقی‌مانده از مایعی با چگالی  $\rho_2$  باشد، چگالی مخلوط برابر با کدام است؟

**(سراسری ریاضی  
۹۶ فارج)**

$$\frac{3\rho_1\rho_2}{\rho_1+2\rho_2}$$

$$\frac{3\rho_1\rho_2}{\rho_2+2\rho_1}$$

$$\frac{\rho_2+2\rho_1}{3}$$

$$\frac{\rho_1+2\rho_2}{3}$$

۷۴- چگالی مخلوط دو مایع A و B با حجم‌های اولیه  $V_A$  و  $V_B$ ، برابر  $75 / 100$  گرم بر سانتی‌متر مکعب است. اگر چگالی مایع A برابر  $L / V_A$  و چگالی مایع B برابر  $L / V_B$  باشد،  $V_A$  چند برابر  $V_B$  است؟

**(سراسری ریاضی  
۹۷ فارج)**

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$4$$

$$3$$

۷۵- طول هر ضلع یک مکعب فلزی  $10 \text{ cm}$  و جرم آن  $6 \text{ kg}$  است. اگر چگالی فلز  $\text{g/cm}^3$   $8$  باشد، مکعب:

$2$  توپر و حجم آن  $1000 \text{ cm}^3$  است.

$1$  توپر و حجم آن  $750 \text{ cm}^3$  است.

$4$  حفره‌ای خالی دارد و حجم حفره  $750 \text{ cm}^3$  است.

$3$  حفره‌ای خالی دارد و حجم حفره  $250 \text{ cm}^3$  است.

۷۶- مکعبی به ضلع  $10 \text{ cm}$  داریم که جرم آن  $1800 \text{ g}$  است. اگر چگالی ماده سازنده این مکعب  $2000 \text{ kg/m}^3$  باشد، در حفره داخل این مکعب چند گرم آب جای می‌گیرد؟ ( $\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$ )

$$400$$

$$200$$

$$100$$

$$50$$

۷۷- شعاع یک کره فلزی  $5$  سانتی‌متر و جرم آن  $1080 \text{ g}$  است. درون این کره یک حفره وجود دارد. حجم این حفره چند درصد حجم کره را تشکیل می‌دهد؟ ( $\pi = 3$ )

**(سراسری ریاضی  
۹۸ فارج)**

$$25$$

$$20$$

$$15$$

$$10$$

۷۸- یک قطعه طلا که  $199 / 5$  گرم جرم دارد را درون ظرفی پر از روغن مایع می‌اندازیم و  $12$  گرم روغن از ظرف بیرون می‌ریزد. اگر چگالی روغن و طلا به ترتیب  $19 \text{ g/cm}^3$  و  $18 \text{ g/cm}^3$  باشد، حجم حفره خالی درون قطعه طلا چند سانتی‌متر مکعب است؟

**(سراسری ریاضی  
۸۷ فارج)**

$$4/5$$

$$4$$

$$2$$

$$1/5$$

۷۹- قطعه فلزی آلیاژی از طلا و مس است. این قطعه فلز  $30 \text{ cm}^3$  حجم و  $470 \text{ g}$  جرم دارد. اگر چگالی طلا و مس به ترتیب  $19 \text{ g/cm}^3$  و  $9 \text{ g/cm}^3$  باشد، این قطعه فلز چند گرم طلا دارد؟

$$380$$

$$285$$

$$235$$

$$190$$

## پاسخ نامه تشریحی

**۱- گزینه ۴** مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند و همواره این امکان وجود دارد که نتایج آزمایش‌های جدید منجر به بازنگری مدل یا نظریه‌ای شود. در حقیقت همین ویژگی آزمون‌پذیری و اصلاح نظریه‌های فیزیکی، نقطه قوت دانش فیزیک است. در ۲ جای قانون و اصل بر عکس بیان شده است. از طرف دیگر، هر چند آزمایش و مشاهده در فیزیک، اهمیت زیادی دارد، اما آن‌چه بیش از همه در پیشبرد و تکامل علم فیزیک نقش ایفا کرده و می‌کند، تفکر نقادانه و اندیشه‌ورزی فعال فیزیکدانان نسبت به پدیده‌هایی است که با آن‌ها مواجه می‌شوند.

**۲- گزینه ۲** برای مدل سازی در مکانیک، معمولاً با چشم‌پوشی از اندازه و شکل جسم، آن را به صورت یک جسم نقطه‌ای یا ذره در نظر می‌گیریم. اگر نیروی اصطکاک را نادیده بگیریم، شخص نمی‌تواند جعبه را هل بدهد. صرف‌نظر کردن از نیروی وزن هم موجب نادیده‌گرفتن نیروی اصطکاک می‌شود. هم‌چنین برای به دست آوردن شتاب و سرعت جسم نمی‌توان فرض کرد که همواره ساکن باقی می‌ماند.

**۳- گزینه ۴** برای مدل سازی ترمکردن خودرو، ابتدا از چرخ‌ها صرف‌نظر کرده و خودرو را مانند جسمی چلب (جسمی که اجزایش نسبت به هم حرکت ندارند) در نظر می‌گیریم که روی زمین می‌لغزند. برای ساده‌سازی همین جسم چلب را به صورت یک ذره در نظر می‌گیریم و از مقاومت‌ها که سبب پیچیده‌شدن مسئله می‌شود، صرف‌نظر می‌کنیم. همان‌طور که گفتیم در مدل سازی نمی‌توان اثرهای مهم و تعیین‌کننده را نادیده گرفت. اگر اصطکاک بین خودرو و زمین را نادیده بگیریم، مدل ما پیش‌بینی می‌کند که خودرو اصلاً متوقف نمی‌شود که نشان می‌دهد ۴ نادرست است.

**۴- گزینه ۴** برای مدل سازی نوسانات آونگ ساده، آن را به صورت یک ذره در نظر می‌گیریم که به وسیله نخ سبکی به یک نقطه آویخته شده است؛ به عبارت دیگر از نیروی وزن گلوله صرف‌نظر می‌کنیم. هم‌چنین نیروی مقاومت‌ها و اصطکاک که سبب پیچیده‌شدن مسئله می‌شوند را نادیده می‌گیریم. به منظور ساده‌سازی تحلیل حرکت گلوله آونگ، زاویه انحراف گلوله از وضع تعادل (θ) را به اندازه کافی کوچک در نظر می‌گیریم که در این صورت مسیر حرکت گلوله تقریباً یک پاره‌خط افقی است. اگر مسیر حرکت گلوله را قسمتی از یک دایره در نظر بگیریم، مسئله پیچیده و دشوار می‌شود که نشان می‌دهد این فرض برای ساده‌سازی این پدیده مناسب نیست.

**۵- گزینه ۲** برای مدل سازی تعادل گرمایی بین دو جسم، فرض می‌کنیم دو جسم هیچ گرمایی با محیط مبالغه نمی‌کنند؛ به عبارت دیگر تمام گرمایی که جسم گرم از دست می‌دهد، جذب جسم سرد می‌شود. به هنگام مبالغه گرمایی، ابتدا دمای نقاطی از جسم سرد که در تماس با جسم داغ قرار دارند، افزایش می‌یابند، سپس با گذشت زمان و انتقال گرمایی، دمای سایر نقاط آن بالا می‌رود، اما برای ساده‌سازی می‌توان دمای قسمت‌های مختلف جسم‌ها را یکسان در نظر گرفت و برای هر لحظه یک دما فرض کرد. لزومی ندارد گرمایی ویژه دو جسم یکسان باشد یا هر یک از آن‌ها را به صورت یک ذره در نظر گرفت.

**۶- گزینه ۴** همان‌طور که در علوم هشتم خواندیم، برای برسی انتشار نور، از مدل پرتوی نور استفاده می‌کنیم. در این مدل هر باریکه نور به صورت پرتوهای موازی نور در نظر گرفته می‌شود، هم‌چنین پرتوهایی که از یک چشمۀ نور خیلی دور مانند خورشید می‌آیند، با هم موازی هستند. این پرتوها پس از بازتاب از یک جسم حقیقی (مانند درخت) و اگرا می‌شوند و پس از شکست در عدسی دوربین عکاسی، به صورت پرتوهای همگرا درآمد و یک تصویر حقیقی تشکیل می‌دهند.

**۷- گزینه ۳** کمیت‌هایی مانند مزیت مکانیکی و ضریب اصطکاک وجود دارند که از نسبت دو کمیت هم‌جنس به دست می‌آیند. این کمیت‌ها بدون یکا (ای بعده) هستند. ۱، ۲ و ۴ تعریف‌های درستی از کمیت فیزیکی، یکای یک کمیت و کمیت‌های اصلی هستند.

**تعریف (الف)** یکای هر کمیت باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟ تغییر نکند و دارای قابلیت بازنویسی در مکان‌های مختلف باشند. ب) اگر یکای طول را به صورت فاصلۀ نوک بینی تا نوک انگشتان دست کشیده شده بگیریم، چه مزیت و چه عیبی دارد؟ مزیت: قابلیت بازنویسی است. عیب: تغییرپذیری بین اشخاص مختلف.

**۸- گزینه ۴** در عمل نیاز نیست برای همه کمیت‌های فیزیکی، یکای مستقلی تعریف شود و به کمک رابطه‌ها و تعریف‌های فیزیکی و کمیت‌های اصلی، برای کمیت‌های فرعی یکاهایی را در نظر می‌گیریم.

**۹- گزینه ۳** در ۱ حجم کمیتی فرعی و زمان کمیتی اصلی است. در ۲ طول کمیتی اصلی است. در ۳ همه چیز مرتب است، اما در ۴ نیرو کمیتی فرعی و شدت جریان کمیتی اصلی است.

**۱۰- گزینه ۳** آمپر یکای جریان الکتریکی، مول یکای مقدار ماده و گندلا (شمع) یکای شدت روشنایی می‌باشند که همگی از یکاهای اصلی در SI هستند. اما باید توجه کرد که یکای جرم در SI، کیلوگرم است نه گرم.

**۱۱- گزینه ۴** از میان کمیت‌های داده شده، دو کمیت مقدار ماده و شدت روشنایی جزو کمیت‌های اصلی هستند که یکای آن‌ها در SI به ترتیب مول و گندلا (شمع) می‌باشند.

**۱۲- گزینه ۳** برای به دست آوردن یکای هر کمیت، از یک رابطه فیزیکی استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} F = ma &\rightarrow N = \text{kg} \times \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \rightarrow N = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}, \quad P = \frac{F}{A} \rightarrow Pa = \frac{N}{\text{m}^2} \rightarrow Pa = \frac{\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}}{\text{m}^2} \rightarrow Pa = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2} \\ W = Fd &\rightarrow J = N \cdot m \rightarrow J = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} \times \text{m} \rightarrow J = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}, \quad P = \frac{W}{t} \rightarrow W = \frac{J}{s} \rightarrow W = \frac{\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}}{\text{s}} \rightarrow W = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3} \end{aligned}$$

**۱۳- گزینه ۲** مسافت پیموده شده کمیتی نرده‌ای است؛ پس تندی، یعنی نسبت مسافت به زمان هم کمیتی نرده‌ای است. هم‌چنین جابه‌جاویی کمیتی برداری است، پس سرعت یعنی نسبت جابه‌جاویی به زمان هم کمیتی برداری است. از طرف دیگر جرم کمیتی نرده‌ای است، در حالی که نیروی گرانشی زمین بر یک جرم، یعنی نیروی وزن، کمیتی برداری است.

**۱۴- گزینه ۲** سیاری از کمیت‌های حرکت‌شناسی مانند مکان، جای‌جایی، سرعت، اندازه حرکت، شتاب و نیرو ماهیت برداری دارند. هم‌چنین کار، انرژی و توان کمیت‌های نرده‌ای هستند.

**۱۵- گزینه‌های کمیتی** اگر کمیتی قابل اندازه‌گیری نباشد، کمیت فیزیکی به حساب نمی‌آید و بحث بر سر عددی یا برداری بودن آن کمیت، بیهوده است. برداری علاوه بر بزرگی، جهت هم دارند، اما هر کمیتی که بزرگی و جهت داشته باشد، الزاماً برداری نیست. مثلاً حریان الکتریکی گذرا ایک سیم راست، علاوه بر بزرگی جهت هم دارد، اما همان طور که خواهیم گفت، کمیتی برداری نباشد، آن است که از قاعده جمع برداری پیروی کند.

اگر کمیتی دارای جهت باشد، الزاماً کمیتی برداری به حساب نمی‌آید. اگر کمیتی بخواهد برداری باشد، الزاماً باید از قاعده جمع برداری پیروی کند. در مورد زمان باید گفت که ممکن نیست مجموع دو زمان با تفاضل آن دو زمان یکسان باشد در حالی که اگر دو بردار بر هم عمود باشند، بزرگی برایند و تفاضل بردارها یکسان است. این به آن معنا است که زمان از قاعده جمع برداری پیروی نمی‌کند و بنابراین زمان کمیتی عددی است. در مورد حریان الکتریکی، گره M در شکل مقابل را در نظر بگیرید. اگر حریان کمیتی برداری باشد، حریان‌های  $I_1$  و  $I_2$  یکدیگر را ختنی کرده و حریان  $I_4$  باید برابر با حریان  $I_2$  (یعنی ۱ A) باشد؛ در حالی که بنا بر قانون حریان‌ها (گره)، حریان  $\oplus I$  مجموع کل حریان‌های خروجی یعنی برابر  $A$  (به طرف راست) است، بنابراین حریان الکتریکی کمیتی عددی است، زیرا از قاعده جمع برداری تبعیت نمی‌کند.

۱۷- گزینهٔ ۲ با توجه به سازگاری یکاها، یکای جمله‌های مختلف یک رابطهٔ فیزیکی یکسان است، بنابراین یکای جملهٔ  $A$  با یکای جملهٔ  $X$  یعنی طول یکسان است. چون  $\Delta t$  معرف زمان است. می‌توان نتیجهٔ گرفت که یکای کمیت  $A$  طول بر زمان بوده است و می‌دانیم طول بر زمان معرف کمیت سرعت می‌باشد.

۱۸- کزینه اکسیژن واحد طول در معیاس انمی است و داریم:  $m = 10 \text{ A} = 10 \text{ l}$ , حالا به کم روش زنجیره‌ای داریم:

$$\text{شعاع اتم هیدروژن} = \frac{\sigma}{\lambda^2} \times \frac{m}{e^2} = \frac{5.67 \times 10^{-26}}{1.28 \times 10^{-16}} \text{ m} = 4.41 \times 10^{-11} \text{ m}$$

توجه کنید که در نمادگذاری علمی، قسمت اول باید عددی بین ۱ و ۱۰ باشد که در ۲ این گونه نیست.

**تمرین** یک میکرون چند آنگستروم است؟

**۱۹- گزینه ۶** هر دقیقه ۶ ثانیه و هر ثانیه  $10^6$  نانوثانیه است؛ پس هر دقیقه معادل  $10^6 \times 10^6 = 10^{12}$  نانوثانیه است. یک متر مربع، مربعی به ابعاد یک متر در یک متر است و از آن جا که هر متر  $10^6$  سانتیمتر است، یک متر مربع معادل  $10^6 \times 10^6 = 10^{12}$  سانتیمتر مربع می‌شود. لیتر واحد اندازه‌گیری حجم و برای با  $10^3$  متر مکعب است. از طرف دیگر دسی (d) پیشوندی معادل  $10^{-3}$  است؛ پس یک دسی متر مکعب معادل  $10^{-3} \times 10^{-3} = 10^{-6}$  متر مکعب است که نشان می‌دهد یک لیتر معادل یک دسی متر مکعب است. اما هکتار (هکتومتر مربع) واحد اندازه‌گیری مساحت معادل  $10^6$  متر مربع است. یک کیلومتر مربع  $10^6$  متر مربع است که نشان می‌دهد هر کیلومتر مربع معادل  $10^6$  هکتار است.

۲۰- گزینهٔ ۳ در هر مورد، برای تبدیل یکاهای از روش زنجیره‌ای استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \text{1. } \frac{\text{m}}{\text{s}} &= \left( \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \left( \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} \right) \left( \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) = 1/3600 \text{ km/h}, \quad \text{2. } \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = \left( \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \right) \left( \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \left( \frac{1 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} \right) = 1/1000 \text{ kg/m}^3 \\ \text{3. } \frac{\text{cm}^3}{\text{s}} &= \left( \frac{\text{cm}^3}{\text{s}} \right) \left( \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ cm}^3} \right) \left( \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right) = 1/60000 \text{ L/min}, \quad \text{4. } \frac{\text{g}}{\text{L}} = \left( \frac{\text{g}}{\text{L}} \right) \left( \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \left( \frac{1000 \text{ L}}{1 \text{ m}^3} \right) = 1 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

$$f\Delta \frac{mi}{h} = f\Delta \left(\frac{mi}{h}\right) \left(\frac{180^{\circ} m}{1 mi}\right) \left(\frac{1 h}{180^{\circ} s}\right) = f \cdot m / s$$

با توجه به تساوی های  $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$  و  $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$  نجحه ای استفاده م کنیم:

$$\nabla \Delta \frac{\text{cm}^r}{\text{s}} = \nabla \Delta \left( \frac{\text{cm}^r}{\text{s}} \right) \left( \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ cm}^r} \right) \left( \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \right) = \frac{\nabla \Delta \times 60}{1000} \left( \frac{\text{L}}{\text{min}} \right) = \nabla / \Delta \text{ L / min}$$

$$3000 \text{ ft} = 3000 \text{ (ft)} \left(\frac{12 \text{ in}}{1 \text{ ft}}\right) \left(\frac{2.5 \text{ cm}}{1 \text{ in}}\right) \left(\frac{1 \text{ km}}{100 \text{ cm}}\right) = 9 \text{ km}$$

۲۴- گزینه ۳ هر فرسنگ معادل  $6240 = 6000 \times 1/04$  متر است، پس یک فرسنگ مربع معادل  $A = a^2 = (6240)^2 = 39 \times 10^6$  متر مربع می‌شود.

از طرف دیگر هر هکتار (هکتومتر مربع) معادل  $10000 = 100 \times 100$  متر مربع است؛ پس هر فرسنگ مربع تقریباً معادل  $3900 = \frac{39 \times 10^6}{10000}$  هکتار می‌شود.

$$\text{مثقال } 7/78 = \frac{\text{گرم } 68}{\text{میلی گرم } 4} \times \frac{1}{\text{قیراط } 1} \times \frac{1}{\text{گرم } 1000} \times \frac{200}{(\text{قیراط } 1)} = \text{قیراط } 182$$

تمرين پا توجه به این که هر مقال متعادل ۲۴ نخود است، نشان دهید هر قیف اط تقریباً برابر با یک نخود است.

به کمک تساوی های داده شده، ضرب تبدیل های مناسب را نوشتیه و از روش تبدیل، نجیب های استفاده ممکن است:

$$\text{كيلوغرام} = \frac{\text{كيلوغرام}}{\text{متر}^3} = \frac{300}{52} = 5.76 \text{ كيلوغرام}$$

$$\frac{21/\circ}{\text{day}} \left( \frac{\text{cm}}{\text{day}} \right) = \frac{21/\circ}{\text{day}} \frac{\text{cm}}{\text{day}} \left( \frac{1^{\circ} \text{ } \mu\text{m}}{1 \text{ cm}} \right) \left( \frac{1 \text{ day}}{1440 \text{ s}} \right) = \circ/\text{day} \mu\text{m}/\text{s}$$

## ۲۸- گزینهٔ ۲

همان طور که گفتیم یکای نجومی (AU) و سال نوری (ly)، هر دو واحد اندازه‌گیری طول هستند که توسط اخترشناسان به کار می‌روند. یکای نجومی میانگین فاصله زمین تا خورشید است، پس با توجه به سرعت نور و زمان داده شده داریم:

$$x = vt \quad \frac{x=AU}{v=c} \rightarrow 1 AU = 3 \times 10^8 \times 500 \rightarrow AU \approx 1 / 5 \times 10^{11} \text{ m}$$

**تمرین** (الف) یک دقیقه نوری چند متر است؟  $m = 1 / 8 \times 10^{10} \text{ m} = 11 \text{ m}$  (ب) یک سال نوری چند برابر یکای نجومی است؟  $1 \text{ ly} \approx 63000 \text{ AU}$

$$\text{انتشار نور چند AU/s است؟} \quad AU/s = c = 0.02 \text{ AU/s}$$

به کمک روش زنجیره‌ای، مقدار مصرف سوخت اتومبیل را از گالن بر مایل به لیتر بر کیلومتر تبدیل می‌کنیم:

$$\frac{\frac{1}{100} \text{ gal}}{\text{mi}} = \frac{\frac{1}{300} \text{ gal}}{\text{mi}} \left( \frac{3/75 \text{ L}}{1 \text{ gal}} \right) \left( \frac{1 \text{ mi}}{1/6 \text{ km}} \right) = \frac{1}{16} \text{ L/km}$$

این اتومبیل برای پیمودن هر کیلومتر  $\frac{1}{16}$  لیتر سوخت مصرف می‌کند، پس با مصرف ۱ لیتر سوخت، می‌تواند ۱۶ کیلومتر را طی کند.

مایل در خشکی با مایل در دریا اندازه متفاوتی دارد، پس مسافت پیموده شده در دریا و خشکی را جداگانه حساب می‌کنیم:

$$\text{خشکی: } 50 \text{ mi} = 50 \left( \frac{1600 \text{ m}}{1 \text{ mi}} \right) \left( \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} \right) = 80 \text{ km} \quad \text{دریا: } 45 \text{ mi} = 45 \left( \frac{1800 \text{ m}}{1 \text{ mi}} \right) \left( \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} \right) = 81000 \text{ m}$$

حالا به کمک رابطه حرکت یکنواخت، زمان کل حمل کالا در خشکی و دریا را حساب می‌کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} \Delta x_1 = v_1 t_1 \rightarrow 80 \text{ km} = 40 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times t_1 \rightarrow t_1 = 2 \text{ h} \\ \Delta x_2 = v_2 t_2 \rightarrow 81000 \text{ m} = (15 \times 0.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}) \times t_2 \rightarrow t_2 = 10800 \text{ s} = 3 \text{ h} \end{array} \right\} \rightarrow t = t_1 + t_2 = 5 \text{ h}$$

**تمرین** نشان دهید هر گرده دریابی تقریباً معادل یک مایل دریابی بر ساعت است.

**۳۱- گزینهٔ ۳** انتهای چپ خطکش دقیقاً روی  $1/10 \text{ cm}$  قرار دارد و انتهای راست آن بین  $5/3 \text{ cm}$  و  $5/4 \text{ cm}$  قرار گرفته، پس می‌توان مکان

انتهای راست خطکش را  $5/32 \text{ cm}$  حدس زد. از طرف دیگر کمینه درجه‌بندی این خطکش برابر  $1 \text{ mm}$  است، بنابراین دقت آن نیز برابر  $a = 1 \text{ mm}$  است و خطای اندازه‌گیری برابر  $0.5 \text{ cm} = \pm 0.5 \text{ mm} = \pm 0.5 \text{ mm}$  می‌باشد. آن جا که موقعیت جسم نسبت به ابزار اندازه‌گیری تغییر نکرده است، کافی است

فقط یک بار این خط را گزارش کنیم: حالا می‌توان طول مداد را چنین اعلام کرد:  $4/22 \text{ cm} \pm 0.5 \text{ cm} = 4/22 \text{ cm} \pm 0.5 \text{ cm} = 0.5 \text{ cm} = 5/22 \text{ cm}$

**۳۲- گزینهٔ ۲** عددی که تندی سنج نشان می‌دهد، بین  $114 \text{ km}$  و  $116 \text{ km}$  است که می‌توان آن را  $115 \text{ km}$  حدس زد. کمینه درجه‌بندی سرعت سنج

$a = 2 \text{ km}$  است، بنابراین خطای اندازه‌گیری تندی سنج برابر  $e = \pm \frac{a}{2} = \pm 1 \text{ km}$  است و نتیجه اندازه‌گیری را می‌توان به صورت  $115 \text{ km} \pm 1 \text{ km}$  گزارش کرد.

**۳۳- گزینهٔ ۱** عددی که دما سنج نشان می‌دهد، بین  $20^\circ \text{ C}$  و  $25^\circ \text{ C}$  است که آن را  $22^\circ \text{ C}$  حدس می‌زنیم. کمینه درجه‌بندی دما سنج برابر

$5^\circ \text{ C}$  است، در نتیجه دقت اندازه‌گیری هم برابر  $5^\circ \text{ C}$  است و خطای اندازه‌گیری برابر  $0.5^\circ \text{ C} = \pm 0.5^\circ \text{ C}$  می‌شود. برای این که تعداد ارقام اعشاری

خطای اندازه‌گیری بیشتر از تعداد ارقام اعشاری عدد حاصل از اندازه‌گیری نشود، آن را به صورت  $22^\circ \text{ C} \pm 0.5^\circ \text{ C}$  گزارش می‌کنیم.

**۳۴- گزینهٔ ۲** طول جسم بین  $4 \text{ cm}$  و  $5 \text{ cm}$  است، پس می‌توان آن را به صورت  $4/2 \text{ cm} = 2 \text{ cm}$  حدس زد. کمینه درجه‌بندی خطکش برابر

$0.5 \text{ cm}$  است، پس دقت اندازه‌گیری آن هم برابر  $0.5 \text{ cm}$  است و خطای اندازه‌گیری توسط این خطکش به صورت  $e = \pm \frac{a}{2} = \pm 0.25 \text{ cm}$  بیان می‌شود. برای این که تعداد ارقام اعشاری خطای اندازه‌گیری حاصل از اندازه‌گیری نباشد، آن را به صورت  $2 \text{ cm} \pm 0.25 \text{ cm}$  نتیجه اندازه‌گیری را چنین اعلام می‌کنیم: طول جسم  $= 2 \text{ cm} \pm 0.25 \text{ cm}$ .

**۳۵- گزینهٔ ۴** کمینه درجه‌بندی خطکش برابر  $0.5 \text{ cm}$  است، پس خطای اندازه‌گیری برابر  $0.5 \text{ cm}$  می‌شود که باید به صورت  $e = \pm \frac{a}{2} = \pm 0.25 \text{ cm}$  گرد شود تا تعداد ارقام با معنای خطای اندازه‌گیری یکسان شود. در نهایت نتیجه اندازه‌گیری به صورت  $4/0 \text{ cm} \pm 0.25 \text{ cm}$  بیان می‌شود که دارای دو رقم با معنای  $0.25 \text{ cm}$  است که  $0.25 \text{ cm} = 0.25 \text{ cm} = 0.25 \text{ cm}$  رقمهای حدسی و غیرقطعی است.

**۳۶- گزینهٔ ۲** خطای اندازه‌گیری برابر  $0.5 \text{ cm}$  است، بنابراین دقت اندازه‌گیری برابر  $0.5 \text{ cm} = \pm 0.25 \text{ cm}$  است و کمینه درجه‌بندی

استوانه باید برابر  $0.5 \text{ cm}$  باشد که در هیچ‌کدام از گزینه‌ها این گونه نیست. از این‌جا معلوم می‌شود که خطای اندازه‌گیری گرد شده است و در حقیقت برابر  $0.5 \text{ cm}$  بوده است، پس داریم  $0.5 \text{ cm} = \pm 0.25 \text{ cm}$  و کمینه درجه‌بندی استوانه باید برابر  $0.5 \text{ cm}$  باشد که نشان می‌دهد درست است.

**تمرین** نتیجه اندازه‌گیری را برای سایر گزینه‌ها بنویسید. **۱**  $3 \text{ cm}^3 \pm 1 \text{ cm}^3$  **۲**  $3/7 \text{ cm}^3 \pm 0.5 \text{ cm}^3$  **۳**  $3/68 \text{ cm}^3 \pm 0.5 \text{ cm}^3$  **۴**  $3/5 \text{ cm}^3 \pm 0.5 \text{ cm}^3$

**۳۷- گزینهٔ ۴** کمینه درجه‌بندی خطکش میلی‌متری برابر  $1 \text{ mm}$  و در نتیجه دقت اندازه‌گیری آن نیز برابر  $a = 1 \text{ mm}$  است. بنابراین خطای

اندازه‌گیری با خطکش میلی‌متری برابر  $e = \pm \frac{a}{5} = \pm 0.2 \text{ mm}$  است. از طرف دیگر به کمک خطکش میلی‌متری عدد  $22 \text{ mm}$  را می‌خوانیم و رقم  $0.9 \text{ mm}$  را حدس می‌زنیم، یعنی در مجموع عددی که گزارش می‌کنیم به صورت  $22/9 \text{ mm} = 2.44 \text{ mm}$  است.

### ۳۸- گزینه ۲

خطای اندازه‌گیری برابر  $mm = \pm 0.5$  است و می‌دانیم خطای اندازه‌گیری با وسایل مدرج، برابر مثبت و منفی نصف دقت

$$e = \pm 0.5 mm = \pm \frac{a}{2} \rightarrow \frac{a}{2} = \pm 0.5 mm \rightarrow a = \pm 1 mm$$

اندازه‌گیری است، پس می‌توان نوشت:

يعني دقت اندازه‌گیری (a) وسیله اندازه‌گیری برابر  $1 mm = \pm 0.5 mm$  است و بنابراین ضخامت جسم را با کولیس اندازه‌گیری کرده‌ایم.

### ۳۹- گزینه ۱

خطای اندازه‌گیری برابر  $mm = \pm \frac{a}{2} = \pm 0.0005 m$  داده شده است، پس دقت اندازه‌گیری این ریزسنج برابر

$a = \pm 0.1 mm$  می‌باشد و از اینجا می‌توان دریافت کمینه تقسیم‌بندی این ریزسنج برای  $1 mm = \pm 0.0005 m$  است. می‌دانیم صفرهای سمت چپ قبل از اولین رقم غیرصفر، جزو رقم‌های بامعنای آیند، پس نتیجه این اندازه‌گیری دارای  $4$  رقم بامعنای  $5$ ،  $0$  و  $0$  (سمت راست) است.

### ۴۰- گزینه ۲

می‌دانیم دقت اندازه‌گیری با وسایل رقمی (دیجیتال) برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که آن وسیله می‌خواند، بنابراین دقت اندازه‌گیری آمپرسنج داده شده، برابر  $A = \pm 0.001 A$  است. از طرف دیگر، صفرهای سمت چپ اولین رقم غیرصفر بامعنای نیستند، اما صفرهای سمت راست بامعنای هستند، پس نتیجه این اندازه‌گیری دارای  $4$  رقم بامعنای  $6$ ،  $5$  و  $0$  (سمت راست) است.

**تمرين** در این اندازه‌گیری: (الف) رقم غیرقطعی (مشکوک) کدام است؟ صفر سمت راست (ب) خطای اندازه‌گیری چه قدر است؟  $e = \pm 1 mA$  (پ) نتیجه

این اندازه‌گیری را چگونه گزارش می‌کنید؟  $6450 mA \pm 1 mA$

### ۴۱- گزینه ۲

دقت اندازه‌گیری با وسایل رقمی (دیجیتال) برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که آن وسیله می‌خواند، پس دقت اندازه‌گیری دماسنج رقمی داده شده برابر  $C = \pm 0.1^\circ C$  است، پس  $\text{نادرست و جواب سؤال است. خطای اندازه‌گیری وسایل رقمی مثبت و منفی دقت اندازه‌گیری است، يعني داریم: } e = \pm a = \pm 0.1^\circ C$ ، از اینجا نتیجه می‌گیریم که دمای داخل گلخانه به صورت  $18^\circ C \pm 0.1^\circ C$  است، يعني دمای داخل گلخانه بین  $17.9^\circ C$  و  $18.1^\circ C$  است. به طریق مشابه دمای خارج گلخانه به صورت  $10^\circ C \pm 0.2^\circ C$  (یعنی بین  $9.8^\circ C$  و  $10.2^\circ C$ ) است. از اینجا نتیجه می‌شود حداقل اختلاف دمای گلخانه با بیرون برابر  $8^\circ C$  و حداقل اختلاف دما برابر  $\Delta\theta_{\min} = 18^\circ C - 10^\circ C = 8^\circ C$  است.

### ۴۲- گزینه ۲

دو عدد  $g = 464$  و  $476$  اختلاف زیادی با اندازه‌گیری‌های دیگر دارند، پس آنها را به حساب نمی‌آوریم و میانگین هشت اندازه‌گیری دیگر را به عنوان نتیجه اندازه‌گیری در نظر می‌گیریم. محاسبه نشان می‌دهد که میانگین این هشت اندازه‌گیری برابر  $g = 425$  است و درست است. برای ساده‌ترشدن محاسبات، فرض می‌کنیم درست باشد و جرم توب  $425 g$  باشد. اختلاف سایر آزمایش‌ها از  $425 g$  را حساب کرده و اصلاحات لازم را انجام می‌دهیم:

$$\frac{425 - 425}{8} = -5$$

این محاسبه نشان می‌دهد میانگین این هشت اندازه‌گیری،  $5$  گرم از  $425$  کمتر است و درست است.

**تمرين** دقت یک اندازه‌گیری به چه عواملی بستگی دارد؟ دقت وسیله اندازه‌گیری، مهارت شخص آزمایشگر و تعداد دفعات اندازه‌گیری

کمینه درجه‌بندی خطکش سانتی‌متری، برای  $1 cm$  و در نتیجه دقت آن نیز برابر  $a = 1 cm$  است، بنابراین خطای اندازه‌گیری توسط این خطکش برابر  $e = \pm \frac{a}{5} = \pm 0.2 cm$  است. از اینجا نتیجه می‌شود که طول هر ضلع این مربع  $cm = \pm 0.5 cm$  است و با کمک گرفتن از اتحادهای

$$S_{\max} - S_{\min} = (10 + 0.5)^2 - (10 - 0.5)^2 \xrightarrow{(a+b)^2 - (a-b)^2 = ab} S_{\max} - S_{\min} = 4 \times 10 \times 0.5 = 20 cm^2$$

جبهی داریم:

کف پای یک انسان بالغ را به صورت مستطیلی به ابعاد  $25 cm \times 10 cm$  در نظر می‌گیریم، پس مساحتی که فشار بر آن وارد می‌شود می‌شود. حالا اگر جرم یک انسان بالغ را برابر  $m = 60 kg$  فرض کنیم، با توجه به رابطه فشار داریم:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A} = \frac{60 \times 10}{0.5} = 12000 Pa \sim 10^4 Pa$$

طول عمر میانگین انسان‌ها حدود  $75$  سال است، پس مرتبه طول عمر انسان بر حسب دقیقه برابر است با:

$$\text{دقیقه} = 10^7 = 75 \times 365 \times 24 \times 60 \sim 100 \times 100 \times 100 = 10^7$$

می‌دانیم قلب یک انسان در هر دقیقه به طور متوسط  $75$  ضربان انجام می‌دهد و در هر ضربان  $3 cm^3$  خون را پمپ می‌کند، پس کل حجم خونی که قلب در طول عمرمان پمپ می‌کند، برابر است با:

$$10^8 L = 75 \times 10^7 \times 10^2 \times 10^3 \sim 10^8 L$$

### ۴۶- گزینه ۱

هر شخص به طور متوسط در هر  $4$  ثانیه یک بار نفس می‌کشد، به عبارت دیگر هر شخص به طور متوسط در یک دقیقه  $15$  بار نفس می‌کشد و اگر عمر هر شخص را  $75$  سال در نظر بگیریم، خواهیم داشت:

$$\text{نفس} = 10^9 \sim 10^8 = 5 \times 10^8 \times 15 = 75 \times 365 \times 24 \times 60$$

**تمرين** یک شخص در طول عمرش: (الف) چند ثانیه را سپری می‌کند؟  $S = 2 \times 10^9$  (ب) چند بار پلک می‌زند؟  $2 \times 10^8$  (پ) چه حجمی هوا تنفس می‌کند؟

$$L \approx 2 \times 10^8$$

### ۴۷- گزینه ۱

مساحت ایران  $km^2 = 1648195$  است و یک اسکناس  $10$  هزار تومانی مستطیلی به ابعاد  $cm \times 17 cm = 8 cm \times 12 cm$  است، پس می‌توان نوشت:

$$\text{اسکناس} \sim 10^{14} \sim \frac{\text{مساحت ایران}}{\text{مساحت یک اسکناس}} = \frac{1648195 km^2}{8 cm \times 17 cm} \sim \frac{1/6 \times 10^6 \times 10^6 m^2}{0.1 \times 0.2 m^2} = 8 \times 10^{13}$$

## ۴۸- گزینه ۲

مساحت شهر (A) برابر است با:

$$A = 180 \text{ km}^2 = 180 \times 10^6 \text{ m}^2 = 1/8 \times 10^8 \text{ m}^2 \sim 10^8 \text{ m}^2$$

$$V_1 = Ad \sim 10^8 \times 10^{-3} = 10^5 \text{ m}^3$$

ارتفاع باران برابر  $d = 10 \text{ mm} = 10^{-2} \text{ m}$  است، پس حجم باران باریده شده برابر است با:

هر قطره باران را به صورت کرهای به قطر  $4 \text{ mm}$  در نظر می‌گیریم، پس حجم هر قطره باران برابر است با:

$$V_r = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(2 \times 10^{-3})^3 \xrightarrow{\pi=3} V_r = 4 \times 2^3 \times 10^{-9} = 32 \times 10^{-9} \rightarrow V_r \sim 10^{-8} \text{ m}^3$$

$$N = \frac{V_1}{V_r} \sim \frac{10^6}{10^{-8}} = 10^{14}$$

بنابراین مرتبه بزرگی تعداد قطره‌های باران برابر است با:

ابتدا مرتبه بزرگی مساحت سطح زمین را تخمین می‌زنیم:

## ۴۹- گزینه ۲

$$A = 4\pi R^2 = 4\pi \times (6400 \times 10^3)^2 \sim 10 \times (6 \times 10^6)^2 \sim 10 \times 6^2 \times 10^{12} = 10 \times 10^{12} = 10^{14} \text{ m}^2$$

$$\text{حالا برای به دست آوردن جرم جو زمین، از رابطه } P = \frac{F}{A} \text{ استفاده می‌کنیم که در این رابطه به جای F، وزن جرم زمین (mg) و به جای A، مساحت سطح زمین را قرار می‌دهیم:}$$

می‌دانیم در حل مسئله‌ها به روش تخمین بزرگی، برخی اوقات ممکن است مرتبه بزرگی پاسخ، با پاسخ واقعی مسئله یک یا دو مرتبه بزرگی متفاوت باشد، پس ۲ که کمترین اختلاف را با جواب ما دارد، انتخاب می‌کنیم.

۵۰- گزینه ۲ جمعیت ایران حدود  $80$  میلیون نفر است و اگر فرض کنیم هر خانواده  $4$  نفره دارای یک خودرو است، تعداد کل خودروهای کشور در حدود  $20$  میلیون می‌شود. از طرف دیگر هر خودرو در هر روز به طور متوسط  $km$   $50$  را طی می‌کند. اگر مصرف میانگین خودرو را  $10$  لیتر به ازای هر  $100$  کیلومتر فرض کنیم، هر خودرو در هر روز حدود  $5$  لیتر بنزین مصرف می‌کند و داریم:

$$\text{لیتر} \sim 10^1 \sim 365 \times 10^6 \sim 365 \times 5 \times 10^6 \sim \text{تعداد روزها} \times \text{صرف هر خودرو در هر روز} \times \text{تعداد خودروها} = \text{حجم بنزین مصرفی}$$

۵۱- گزینه ۲ جمعیت شهر تهران حدود  $10$  میلیون نفر است. سرانه خودرو در تهران بیشتر از متوسط کل ایران است و اگر فرض کنیم در تهران به ازای هر  $2/5$  نفر، یک خودرو وجود دارد، تعداد کل خودروهای تهران در حدود  $4$  میلیون دستگاه می‌شود. وقتی بنزین خودرویی به تدریج مصرف می‌شود، بالای بنزین درون باک، بخار بنزین تشکیل می‌شود. وقتی خودرو برای سوخت‌گیری دوباره به جایگاه پمپ بنزین می‌رود، با ورود بنزین به باک، بخار بنزین از آن خارج و به هوای بیرون رانده می‌شود. حجم متوسط باک خودروها در حدود  $50$  لیتر است و حجم یک مول گاز کامل در روزهای عادی حدود  $25$  لیتر است، پس در بالای هر باک نزدیک به  $2$  مول بنزین وجود دارد که معادل  $160$  گرم بنزین یا تقریباً  $2/0$  لیتر بنزین است. حالا اگر فرض کنیم  $4$  میلیون خودروی موجود در تهران، در هر روز  $1$  میلیون خودرو سوخت‌گیری کنند، حجم بنزین بخارشده برابر  $L = 2 \times 10^5 = 2 \times 10^6 \text{ می‌شود}$  ۲ درست است.

## تمرين مرتبا مصرف روزانه بنزین خودروهای شهر تهران را تخمین بزنيد. $L = 10^7$

جرم یک انسان بالغ  $kg = 60$  در نظر بگیرید. بیش از  $70$  درصد بافت‌های بدن از آب تشکیل شده است و چگالی بدن انسان سیار

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V_1 = \frac{m}{\rho} = \frac{60}{1000} = 0.06 \text{ m}^3$$

نزدیک به چگالی آب ( $1000 \text{ kg/m}^3$ ) است. پس حجم بدن یک انسان برابر است با:

$$V_r = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \times (10 \times 10^{-6})^3 = 4 \times 10^{-15} \text{ m}^3$$

اگر سلول‌های بدن انسان را کروی در نظر بگیریم، حجم هر سلول برابر است با:

$$N = \frac{V_1}{V_r} \sim \frac{0.06}{4 \times 10^{-15}} = 1/5 \times 10^{13} \text{ (سلول)}$$

بنابراین مرتبه تعداد سلول‌های انسان برابر است با:

۵۳- گزینه ۴ جرم هر سکه  $50$  تومانی حدود  $10$  گرم است و اگر فرض کنیم از نیکل خالص ساخته شده است، هر سکه شامل  $2/0$  مول

نیکل است. می‌دانیم هر مول از یک ماده، شامل عدد آووگادرو ( $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ ) اتم یا مولکول از آن است، بنابراین تعداد اتم‌های موجود در سکه برابر است با:

۵۴- گزینه ۴ می‌دانیم در شرایط معمول، هر مول از یک گاز کامل حجمی در حدود  $m^3 = 25 L = 0.025 \text{ m}^3$  دارد، پس تعداد مول‌های گاز موجود در اتاق برابر است با:

$$V_r = 3 \times 8 \times 3 = 72 \text{ m}^3 \rightarrow n = \frac{V_r}{V_1} = \frac{72}{0.025} = 2880$$

هر مول از یک گاز شامل عدد آووگادرو مولکول از آن گاز است، پس داریم:

$$n = \frac{N}{N_A} \rightarrow N = n \times N_A \rightarrow N = 2880 \times 6 \times 10^{23} = 2/88 \times 6 \times 10^{23} \sim 10^{26} = 10^{27} \text{ مولکول}$$

تمرين با توجه به این که جرم مولکولی متوسط هوا  $mol/g = 29$  است، جرم هوای موجود در این اتاق را تخمین بزنید.

می‌دانیم اتم هیدروژن دارای یک الکترون و یک پروتون است. جرم الکترون خیلی کمتر از جرم پروتون است، پس می‌توان جرم اتم

هیدروژن را با جرم پروتون (و در نتیجه یکای جرم اتمی) برابر در نظر گرفت. جرم یک مول (عدد آووگادرو) اتم هیدروژن برابر  $1 \text{ g}$  است؛ پس جرم یک اتم

$$N_A m_H = 1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg} \rightarrow m_H = \frac{10^{-3}}{6 \times 10^{23}} = \frac{1}{6} \times 10^{-26} \text{ kg} \sim (0.1) \times 10^{-26} = 10^{-27} \text{ kg} \rightarrow u \approx m_H \sim 10^{-27} \text{ kg}$$

## ۵۵- گزینه ۴

هیدروژن برای این که جرم مولکولی متوسط هوا  $mol/g = 29$  است، جرم هوای موجود در این اتاق را تخمین بزنید.



پنجه  
پنجه  
پنجه  
پنجه  
پنجه  
پنجه

۳۹۶

### ۵۶- گزینه ۲

ما ساختار اتمی این فلز را نمی دانیم، بنابراین ساده‌ترین ساختار ممکن را در نظر می‌گیریم. فرض کنید مانند شکل مقابل، اتم‌های فلز دارای یک ساختار مکعبی باشند. فاصله متوسط بین اتم‌های مجاور در حقیقت طول ضلع این مربع است. حجم این ساختار برابر  $V_1 = a^3$  است. هر یک از اتم‌هایی که در گوشه مکعب قرار دارند، به ۸ مکعب که در کنار هم چیده شده باشند، تعلق دارند؛ بنابراین تعداد اتم‌های موجود در هر شبکه برابر  $\frac{1}{8} \times 8 = 1$  اتم است.

اکنون مکعبی به ضلع ۱ متر در نظر بگیرید. جرم این مکعب برابر  $g = \rho V = 8 \times 1^3 = 8 \text{ kg}$  است. با توجه به تعریف عدد آووگادرو، تعداد مول‌های این مکعب

$$\text{برابر } n = \frac{8 \times 1^3}{6.02 \times 10^{23}} = \frac{4}{3} \times 10^{-23} \text{ مول می‌شود و بنابراین تعداد اتم‌های موجود در این مکعب برابر است با:}$$

$$n = \frac{N}{N_A} \rightarrow N = n \times N_A \rightarrow N = \frac{4}{3} \times 10^{-23} \times 6 \times 10^{23} = 8 \times 10^{-28} \text{ اتم}$$

حجم مکعب برابر  $V_2 = 1^3 = 1 \text{ m}^3$  است و چون هر ساختار مکعبی حاوی یک اتم است، می‌توان نوشت:

$$V_2 = NV_1 \rightarrow 1 = 8 \times 10^{-28} \times a^3 \rightarrow a^3 = \frac{1}{8} \times 10^{-28} \sim 10^{-29} \rightarrow a \sim 10^{-10} \text{ m}$$

**تمرین** از حل این سؤال چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ چگالی یک ماده، معیاری از فاصله متوسط بین مولکول‌های آن ماده است.

با استفاده از روابط هندسی، حجم کره را به دست می‌آوریم، سپس از رابطه چگالی استفاده می‌کنیم:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \xrightarrow{\pi=3} V = \frac{4}{3} \pi \times 3 \times 10^{-3} = 4000 \text{ cm}^3, \rho = \frac{m}{V} \rightarrow \rho = \frac{8000}{4000} \Rightarrow \rho = 2 \text{ g/cm}^3 \rightarrow \rho = 2000 \text{ kg/m}^3$$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi \times 5^3 = \frac{500}{3} \pi \text{ cm}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = \rho V = 6 \times \frac{500}{3} \pi = 1000\pi(g) = \pi(\text{kg}) \approx 3/14 \text{ kg}$$

حجم جسم، اختلاف حجم مایع در دو حالت است، پس داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1/0.5}{4/6} = 1/75 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \xrightarrow{1\text{g}/\text{cm}^3=1000\text{kg}/\text{m}^3} \rho = 1/75 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$$

**تمرین** آیا درست بود که چگالی جسم را  $1750 \text{ kg/m}^3$  گزارش می‌کردیم؟ خیر، زیرا در این حالت تعداد ارقام با معنای چگالی بیشتر از تعداد ارقام با معنای جرم و حجم جسم می‌شد.

حجم آب درون استوانه مدرج به اندازه حجم قطعه فلز افزایش می‌یابد، بنابراین می‌توان نوشت:

$$V = Ah \rightarrow V = 12 \times 1/5 = 18 \text{ cm}^3, \rho = \frac{m}{V} \rightarrow \rho = 5 \text{ g/cm}^3 \xrightarrow{1\text{g}/\text{cm}^3=1000\text{kg}/\text{m}^3} \rho = 5000 \text{ kg/m}^3$$

شرط فرورفتگی جسم در آب، بیشتر بودن چگالی جسم از چگالی آب است. پرتفال با پوست جرم بیشتری از پرتفال بدون پوست دارد، اما چگالی پرتفال بدون پوست از چگالی آب و چگالی پرتفال با پوست کمتر از چگالی آب است، بنابراین پرتفال بدون پوست به درون آب فرو می‌رود، اما پرتفال با پوست در سطح آب شناور باقی می‌ماند.

**تمرین** چرا آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین شعله‌ور نیست؟ چون چگالی بنزین کمتر از چگالی آب است و بر سطح آب شناور مانده و همچنان شعله‌ور باقی می‌ماند.

ابتدا با استفاده از رابطه‌های هندسی، نسبت حجم دو ماده را پیدا می‌کنیم، سپس از رابطه چگالی استفاده می‌کنیم:

$$V_A = \frac{4}{3} \pi R^3, V_B = h \times (\pi R^2 - \pi (\frac{R}{2})^2) \xrightarrow{h=\frac{2}{3}R} V_B = \frac{1}{3} \pi R^3$$

$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{\frac{1}{3} \pi R^3}{\frac{4}{3} \pi R^3} = \frac{3}{4}, \rho = \frac{m}{V} \rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = \left( \frac{m_A}{m_B} \right) \times \left( \frac{V_B}{V_A} \right) \rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = 2 \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = \left( \frac{m_A}{m_B} \right) \times \left( \frac{V_B}{V_A} \right) \rightarrow \frac{3}{2} = \left( \frac{1}{1} \right) \times \left( \frac{V_B}{5} \right) \rightarrow V_B = 5L \quad \text{از فرم مقایسه‌ای رابطه چگالی استفاده می‌کنیم:}$$

در هر دو حالت حجم مایع و روغن برابر با حجم ظرف و مساوی است. از طرف دیگر در حالت اول جرم مایع برابر  $g = 240 \text{ g}$

و در حالت دوم جرم روغن برابر  $g = 160 \text{ g}$  است، پس با استفاده از رابطه چگالی داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow V = \frac{m}{\rho} \xrightarrow{V_2=V_1} \frac{m_2}{\rho_2} = \frac{m_1}{\rho_1} \rightarrow \frac{160}{\rho_2} = \frac{240}{1/2} \rightarrow \rho_2 = 0.1 \text{ g/cm}^3 = 100 \text{ kg/m}^3$$

زمین کروی شکل است، پس حجمش برابر است با:

حالا با استفاده از رابطه چگالی می‌توان نوشت:

قوطی کبریت را به صورت مکعب مستطیلی به ابعاد  $5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$  در نظر می‌گیریم. با توجه به رابطه چگالی داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = \rho V = 10^8 \times (0.05 \times 0.04 \times 0.01) = 10^8 \times 5 \times 4 \times 10^{-6} = 2000 \text{ kg}$$

**۶۷- گزینه ۴**

حجم آب باریده برابر است با:

$$V = Ah = (2500 \text{ km}^2)(40 \text{ mm}) = (2500 \times 10^6 \text{ m}^2)(40 \times 10^{-3} \text{ m}) = 10^8 \text{ m}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = \rho V \rightarrow m = (1000 \text{ kg/m}^3)(10^8 \text{ m}^3) \rightarrow m = 10^{11} \text{ kg}$$

اکنون از رابطه چگالی استفاده می کنیم:  
چون ظرف پر از الکل است، حجم الکلی که از ظرف بیرون می ریزد، با حجم گلوله برابر است. توجه می کنیم که گرم بر لیتر و کیلوگرم بر متر مکعب واحدهای یکسانی هستند. حالا از فرم مقابله ای رابطه چگالی داریم: (آهن: ۲ و الکل: ۱)

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \frac{\rho_2}{\rho_1} = \left( \frac{m_2}{m_1} \right) \times \left( \frac{V_1}{V_2} \right) \xrightarrow{V_1 = V_2} \frac{7800}{100} = \left( \frac{3900}{m_1} \right) \times 1 \Rightarrow m_1 = 400 \text{ g}$$

**تمرین** حجم الکلی که از ظرف بیرون ریخته است، چند سانتی متر مکعب است؟

دقیقاً مانند سؤال قبل، حجم گلوله با حجم روغنی که از ظرف بیرون می ریزد، برابر است و داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow \frac{\rho_{فرز}}{\rho_{روغن}} = \frac{m_{فرز}}{m_{روغن}} = \left( \frac{V_{فرز}}{V_{روغن}} \right) \times \left( \frac{\rho_{روغن}}{\rho_{فرز}} \right) = \left( \frac{100}{160} \right) \times 1 \rightarrow \rho_{فرز} = 4 \text{ g/cm}^3 = 4000 \text{ kg/m}^3$$

چون حجم مکعب چوبی ( $V = a^3 = 4^3 = 64 \text{ cm}^3$ ) بیش از حجم آبی است که از ظرف بیرون ریخته است، چگالی چوب کمتر از چگالی آب است و مکعب بر سطح آب شناور می ماند. در این حالت جرم آب بیرون ریخته از ظرف با جرم مکعب چوبی برابر است:

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow \frac{\rho_{چوب}}{\rho_{آب}} = \frac{m_{چوب}}{m_{آب}} = \left( \frac{V_{آب}}{V_{چوب}} \right) \times \left( \frac{\rho_{آب}}{\rho_{چوب}} \right) \rightarrow \frac{\rho_{چوب}}{1} = 1 \times \frac{4}{64} \rightarrow \rho_{چوب} = 0.0625 \text{ g/cm}^3 = 625 \text{ kg/m}^3$$

برای محاسبه چگالی محلول، مجموع جرم اجزای محلول را بر مجموع حجم آنها تقسیم می کنیم:

$$\rho = \frac{m_A + m_B}{V_A + V_B} \rightarrow \rho = \frac{\rho_A V_A + \rho_B V_B}{V_A + V_B} \rightarrow \rho_{ محلول} = \frac{3 \times 3 + 1 \times 3}{3+3} = 2 \text{ g/cm}^3 \rightarrow \rho_{ محلول} = 2000 \text{ kg/m}^3$$

**تمرین** نشان دهید اگر حجم اجزای تشکیل دهنده یک مخلوط مساوی باشد، چگالی مخلوط میانگین چگالی اجزای تشکیل دهنده آن است.

این بار جرم اجزا داده شده است، پس از رابطه چگالی مخلوط می توان نوشت:

$$\rho_{ محلول} = \frac{m_A + m_B}{V_A + V_B} \rightarrow \rho_{ محلول} = \frac{m_A + m_B}{\frac{m_A}{\rho_A} + \frac{m_B}{\rho_B}} \rightarrow \rho_{ محلول} = \frac{\frac{3000 + 3000}{3000} = \frac{6000}{4000}}{\frac{3}{3} + \frac{1}{1}} = 1/5 \text{ g/cm}^3 = 1500 \text{ kg/m}^3$$

اگر حجم کل مخلوط را  $V$  در نظر بگیریم، داریم:  $V_2 = \frac{2}{3}V$  و  $V_1 = \frac{1}{3}V$ ، پس از رابطه چگالی مخلوط داریم:

$$\rho_{ محلول} = \frac{m_1 + m_2}{V_1 + V_2} \xrightarrow{m = \rho V} \rho_{ محلول} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2}{V_1 + V_2} \xrightarrow{V_1 = \frac{1}{3}V \quad V_2 = \frac{2}{3}V} \rho_{ محلول} = \frac{\frac{1}{3}\rho_1 V + \frac{2}{3}\rho_2 V}{\frac{1}{3}V + \frac{2}{3}V} = \frac{\rho_1 + 2\rho_2}{3}$$

**تمرین** اگر  $\frac{1}{3}$  جرم مخلوط از مایع  $\rho_1$  و  $\frac{2}{3}$  جرم باقی مانده از مایع  $\rho_2$  باشد، چگالی مخلوط چه قدر است؟

چگالی مخلوط برابر  $75 \text{ g/cm}^3$  یا  $75 \text{ kg/m}^3$  برابر است. پس برای محاسبه چگالی مخلوط داریم:

$$\rho_{ محلول} = \frac{m_A + m_B}{V_A + V_B} \xrightarrow{m = \rho V} \rho_{ محلول} = \frac{\rho_A V_A + \rho_B V_B}{V_A + V_B} \rightarrow 75 = \frac{600 V_A + 800 V_B}{V_A + V_B}$$

$$\rightarrow 75(V_A + V_B) = 600 V_A + 800 V_B \rightarrow 15 V_A + 15 V_B = 12 V_A + 16 V_B \rightarrow 3 V_A = V_B \rightarrow \frac{V_A}{V_B} = \frac{1}{3}$$

حجم ظاهری را به کمک هندسه و حجم واقعی را از رابطه چگالی به دست می آوریم:

بنابراین این مکعب دارای حفره ای به حجم  $25 \text{ cm}^3$  واقعی  $V$  - ظاهری  $V$  - حفره  $V$  است.

حجم ظاهری جسم را با استفاده از رابطه های هندسی به دست می آوریم:

حجم واقعی جسم با استفاده از رابطه چگالی برابر است با:

بنابراین حجم حفره برابر  $100 \text{ cm}^3 = 1000 - 900 = 100 \text{ cm}^3$  است و درونش  $100 \text{ cm}^3$  آب جای می کیرد.

$$V_{ ظاهری} = \frac{4}{3} \pi r^3 \xrightarrow{r=5 \text{ cm}} V_{ ظاهری} = 4 \times 5^3 = 500 \text{ cm}^3$$

$$V_{ ظاهری} = \frac{m}{\rho} \rightarrow V_{ ظاهری} = \frac{1080}{2/7} = 400 \text{ cm}^3 \quad \text{واقعی } V_{ ظاهری} = V_{ حفره} = 100 \text{ cm}^3$$

بنابراین حفره  $20 \text{ cm}^3$  درصد از حجم کره را تشکیل می دهد.

۷۸- گزینه

ابتدا با استفاده از رابطه چگالی حجم واقعی را به دست می آوریم:

$$V_{\text{واقعی}} = \frac{m}{\rho} = \frac{199/5}{19} = 10/5 \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{ظاهری}} = \frac{m'}{\rho'} = \frac{12}{5/8} = 15 \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{حفره}} = V_{\text{واقعی}} - V_{\text{ظاهری}} = 15 - 10/5 = 4/5 \text{ cm}^3$$

$$V_1 + V_2 = 30 \rightarrow V_2 = 30 - V_1$$

اکنون با جرم روغن بیرون ریخته، حجم ظاهری قطعه طلا را حساب می کنیم:

حجم حفره، تفاضل حجم ظاهری از حجم واقعی است:

۷۹- گزینه حجم قطعه ۳۰ سانتی متر مکعب است، پس داریم: (طلا: ۱ و مس: ۲)

هم چنین جرم قطعه ۴۷۰ گرم است، پس با توجه به رابطه چگالی می توان نوشت:

$$470 = m_1 + m_2 \xrightarrow{m=\rho V} 470 = 19V_1 + 9V_2 \xrightarrow{V_2=30-V_1} 470 = 19V_1 + 9(30 - V_1)$$

$$\rightarrow 200 = 10V_1 \rightarrow V_1 = 20 \text{ cm}^3 \rightarrow m_1 = \rho_1 V_1 \rightarrow m_1 = 19 \times 20 = 380 \text{ g}$$

