

خرید کتاب های کنکور

با تخفیف ویژه

و
ارال رایگان

Medabook.com



مدابوک



پک جامه ناس تلفنی، رایگان

با مشاوران رتبه برتر

برای انتخاب بهترین منابع

دبیرستان و کنکور

۰۲۱ ۳۸۴۳۵۲۱۰



- ۷۲- عبارت $\frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{9}$ را به صورت $(3+2x)^2$ نوشتند. مقدار A به ازای $x=6$ کدام است؟
- ۱) ۳۶ ۲) ۳۶ ۳) ۱ ۴) $\frac{1}{6}$
- ۷۳- مجموع مربع عددی با ۴ برابر مربع عدد دیگر مساوی با ۴ برابر حاصل ضرب همان دو عدد است. نسبت این دو کدام می‌تواند باشد؟ **از این انتها**
- ۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱
- ۷۴- عددی دو رقمی وجود دارد که اگر مربع رقم دهگان آن را با ۲۵ برابر مربع یکان آن جمع کنیم، مساوی ده برابر حاصل ضرب این دو رقم می‌شود. این عدد همواره بر کدام یک از اعداد زیر قابل قسمت است؟ **مدارس هماهنگ**
- ۱) ۹ ۲) ۲۹ ۳) ۲۹ ۴) ۵۱
- ۷۵- اگر ضلع یک مربع $(a+b)$ و ضلع مربع دیگری $(a-b)$ باشد، تفاضل مساحت‌های این دو مربع عبارتست از:
- ۱) $2ab$ ۲) $4ab$ ۳) $4a^2b^2$ ۴) $a^2 - b^2$

درسنامه‌ی ۴

زدن تست‌های مربوط به تجزیه بدون معلومات!

تا حالا دیدی کسی تجزیه بلد نباشه ولی به راحتی تست تجزیه حل کنه! حتماً خودتان می‌گویید: «مگه می‌شه؟ مگه داریم؟» بله داریم! اگر شما هم دوست دارید بدون اطلاعات و بلد بودن تجزیه، سخت‌ترین تست‌های تجزیه را سه سوت! حل کنید، با ما همراه باشید.

دسته‌ی اول: در بعضی از تست‌ها، یک عبارت گنده وجود دارد و شما باید به کمک اتحاد یا تجزیه آن‌ها را ساده کنید و به یک عبارت کوچک برسید. در این تست‌ها کافی است به جای متغیر (متغیرها) عدد مناسب قرار دهید. سپس در گزینه‌ها هم همان عدد موردنظر را جای‌گذاری کرده و چک کنید که عبارت صورت سؤال با کدام گزینه برابر می‌شود. به تست زیر توجه کنید:

مثال: حاصل عبارت $1 + (a+1)(a+2)(a+3)$ کدام است؟

$$(a^2 + a + 1)^3 \quad (4) \qquad (a^2 + 3a + 1)^2 \quad (3) \qquad (a + 1)^4 \quad (2) \qquad (a^2 + 1)^3 \quad (1)$$

پاسخ: خب خیلی ریلکس و بدون استرس به جای a، عدد مناسب ۱ قرار می‌دهیم. در این صورت عبارت صورت سؤال برابر می‌شود با:
 $a(a+1)(a+2)(a+3) + 1 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 + 1 = 25$

حال در گزینه‌ها هم $a = 1$ را قرار می‌دهیم:

$$(a^2 + 1)^3 \stackrel{a=1}{=} (1+1)^3 = 4 \quad (1) : گزینه‌ی (۱) \qquad (a+1)^4 \stackrel{a=1}{=} (1+1)^4 = 16 \quad (2) : گزینه‌ی (۲)$$

$$(a^2 + 3a + 1)^2 \stackrel{a=1}{=} (1+3+1)^2 = 25 \quad \checkmark \quad (3) : گزینه‌ی (۳) \qquad (a^2 + a + 1)^2 \stackrel{a=1}{=} (1+1+1)^2 = 9 \quad (4) : گزینه‌ی (۴)$$

پس گزینه‌ی (۳) صحیح است. به همین سادگی!

هالا بپاره بغل تستیت داره خودشو می‌کشه که سؤال رو هل کنه! یه لبندی بزن و فوشمال باش و به اون هم کتاب مارو معرفی کن.

سوال: داش پژوه (آرمان آلب): آقا چرا a رو صفر ندادین، اون که خیلی راحت‌تر می‌کنه محاسبات تو؟

پاسخ: آرمان بیین آگه a رو صفر بدم هر پهوار گزینه برابر ۱ می‌شن! پس نمی‌تونیم گزینه‌ای رو به عنوان جواب انتساب کنیم. بنابراین درسته که مهاسبات با a = ۰ راهت‌تره ولی دردی رو از ما دوا نمی‌کنه. همیشه یادت باشه قبل از امتحان کردن یه عدد، هتماً نیم‌گناهی به گزینه‌ها هم داشته باش تا وقتی سر اعداد بیهوده تلف نشه!

دسته‌ی دوم: هر وقت صورت تستی به یکی از دو فرم زیر بود، برای حل باید به جای متغیر (متغیرها) عددی **مناسب** قرار دهید. سپس در گزینه‌ها هم همان اعداد را جای‌گذاری کرده و چک کنید عدد به دست آمده در صورت سؤال بر کدام عدد بخش‌بزیر است.

۱) در تجزیه‌ی عبارت داده شده کدام عامل وجود دارد یا وجود ندارد؟

۲) عبارت داده شده بر کدام عبارت بخش‌بزیر است یا بخش‌بزیر نمی‌باشد. برای درک بهتر روش گفته شده به تست زیر توجه کنید:

مثال: عبارت $4x^3 - 4x^2 - 2x^3 + 2x^2$ بر کدام دو جمله‌ای بخش‌بزیر نیست؟

$$x^2 - x \quad (4) \qquad x + 2 \quad (3) \qquad x - 1 \quad (2) \qquad x + 1 \quad (1)$$

پاسخ: به جای x عدد **مناسب** ۲ را قرار می‌دهیم. در این صورت عبارت صورت سؤال برابر می‌شود با:

$$2x^3 + 2x^2 - 4x \stackrel{x=2}{=} 2(2)^3 + 2(2)^2 - 4(2) = 16 + 8 - 8 = 16$$



$$\begin{array}{ll} \frac{x=2}{x+1=3}, & \text{حال در گزینه‌ها هم به جای } X, \text{ عدد } 2 \text{ قرار می‌دهیم:} \\ (1) & X-1=\underline{\underline{1}} \\ (2) & \text{گزینه‌ی } X-1=\underline{\underline{1}} \text{ (2)} \\ (3) & \text{گزینه‌ی } X+2=\underline{\underline{4}} \text{ (4)} \end{array}$$

خب همه می‌دونن که ۱۶ بر ۲، ۴ و ۳ بخش‌پذیر است ولی بر ۳ بخش‌پذیر نیست. پس گزینه‌ی (1) جواب است.

تذکر: انتخاب عدد مناسب در این قسمت فوق العاده مهم است و با تمرین زیاد این کار را به خوبی یاد می‌گیرید.

حال در گزینه‌ها هم به جای X , عدد 2 قرار می‌دهیم:

۷۶- تجزیه‌ی عبارت $(x+2y-z)^3 + z^3 + 2z(x+2y-z)$ به کدام صورت است؟

$$\begin{array}{ll} (x-2y)^3 & (z+2y)^3 \\ (1) & (2) \\ (x+2y)^3 & (2y-z)^3 \\ (4) & (3) \end{array}$$

۷۷- حاصل $(x^3+x+1)^3 + (x+1)^3 - 2(x+1)(x^3+x+1)$ کدام است؟

$$\begin{array}{ll} x^4+x^3+1 & x^4 \\ (4) & (2) \\ x^3-2x+1 & x^4-x^3+1 \\ (3) & (1) \end{array}$$

۷۸- حاصل عبارت $+1(a-2)(a-1)a(a+1)$ کدام است؟

$$\begin{array}{ll} (a^3+3a-1)^3 & (a^3-3a+1)^3 \\ (2) & (1) \\ (a^3+a+1)^3 & (a^3-a-1)^3 \\ (4) & (3) \end{array}$$

درسنامه‌ی ۵

تجزیه‌ی $(a+b \pm 2\sqrt{ab})$ به کمک اتحاد مربع دو جمله‌ای

عبارت‌هایی به فرم $(a+b \pm 2\sqrt{ab})$ را می‌توان با توجه به فرمول اتحاد مربع دو جمله‌ای به صورت $(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2$ نوشت. اجازه بدهید یک مثال برایتان بزنم:

مثال: عبارت $7+2\sqrt{12}$ را تجزیه کنید.

پاسخ: با مقایسه $7+2\sqrt{12}$ با عبارت $a+b+2\sqrt{ab}$, $a+b=7$ و $ab=12$ است. پس باید دنبال دو عدد a و b باشیم که جمعشان ۷ و ضربشان ۱۲ شود، با کمی دقت متوجه می‌شویم آن دو عدد ۳ و ۴ هستند. بنابراین داریم:

$$7+2\sqrt{12} = \frac{a=3}{b=4} (\sqrt{3} + \sqrt{4})^2$$

سوال: دانش‌پژوه (مونا هوانی): آقا اجازه‌ای حالا فرض کنید او مدیم و یادگرفتیم که چه جوری می‌شه این کار رو کرد، آخه به چه دردی می‌خوره؟ کجا لازمه این کارو کنیم؟

پاسخ: همسن دنبال اینی که آله یه پیز به دردت نمی‌فوره یادگیریا! بزار بعثت بگم، معمولاً وقتی عبارت $a+b \pm 2\sqrt{ab}$ زیر رادیکال قرار داشته باشه با این کار می‌تونیم رادیکال رو از بین ببریم. مثلاً:

$$\sqrt{7+2\sqrt{12}} = \sqrt{(\sqrt{3} + \sqrt{4})^2} = \underbrace{|\sqrt{3} + \sqrt{4}|}_{\oplus} = \sqrt{3} + \sqrt{4}$$

کنکور

۷۹- جذر $3+2\sqrt{2}$ کدام است؟

$$\begin{array}{ll} 1+2\sqrt{2} & \sqrt{3}+1 \\ (4) & (3) \\ \sqrt{3}+1 & 1+\sqrt{2} \\ (3) & (2) \\ 1+\sqrt{2} & \sqrt{2}-1 \\ (2) & (1) \end{array}$$

۸۰- حاصل $\sqrt{7-\sqrt{40}}$ کدام است؟

$$\begin{array}{ll} \sqrt{4}-\sqrt{3} & \sqrt{3}-\sqrt{2} \\ (2) & (1) \\ \sqrt{5}-\sqrt{3} & \sqrt{5}-\sqrt{2} \\ (4) & (3) \end{array}$$

۸۱- حاصل $\sqrt{9+4\sqrt{5}}$ کدام است؟

$$\begin{array}{ll} 5-\sqrt{2} & 2-\sqrt{5} \\ (4) & (2) \\ 5+\sqrt{2} & 2+\sqrt{5} \\ (3) & (1) \end{array}$$

۸۲- ساده شده‌ی عبارت $\sqrt{6-2\sqrt{3}+2\sqrt{8+2\sqrt{15}}}$ کدام است؟

$$\begin{array}{ll} \sqrt{5}-1 & \sqrt{5}+2 \\ (2) & (1) \\ \sqrt{5}-2 & \sqrt{5}+1 \\ (4) & (3) \end{array}$$

درسنامه‌ی ۶

اتحاد مریع سه‌جمله‌ای

اتحاد مریع سه‌جمله‌ای به صورت زیر است:

$$(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3ab + 3ac + 3bc$$

مثال: حاصل عبارات زیر را به کمک اتحاد مریع سه‌جمله‌ای بیابید.

$$(x^3 - x - 1)^3$$

$$(x - y + 2z)^3$$

پاسخ:

$$(x - y + 2z)^3 = (x)^3 + (-y)^3 + (2z)^3 + 3(x)(-y) + 3(x)(2z) + 3(-y)(2z) = x^3 + y^3 + 4z^3 - 3xy + 4xz - 4yz$$

$$(x^3 - x - 1)^3 = (x^3)^3 + (-x)^3 + (-1)^3 + 3(x^3)(-x) + 3(x^3)(-1) + 3(-x)(-1) = x^9 + x^3 + 1 - 3x^4 - 3x^3 + 2x$$

تجزیه به کمک اتحاد مریع سه‌جمله‌ای

اگر عبارتی بدھند که شش جمله داشته باشد و سه تا از جمله‌های آن مریع کامل باشند (سه جمله مثبت‌اند). آن‌گاه جذر آن سه جمله را a , b و c مینامیم. سپس بررسی می‌کنیم که آیا سه جمله‌ای دیگر $2ab$, $2ac$ و $2bc$ هستند یا خیر. اگر سه جمله‌ای دیگر $2ab$, $2ac$ و $2bc$ باشند، (البته با در نظر گرفتن علامت جملات) می‌توانیم آن شش جمله را به صورت اتحاد مریع سه‌جمله‌ای نمایش دهیم.

مثال: عبارات زیر را تجزیه کنید.

$$x^3 + 4y^3 - 4xy - 6xz + 12yz + 9z^3$$

$$x^3 + y^3 + 4z^3 + 2xy + 4xz + 4yz$$

پاسخ: (الف) عبارت داده شده دارای ۶ جمله است که سه جمله‌ای x^3 , y^3 و $4z^3$ مریع کامل‌اند. پس $x = b$, $y = a$ و $4z = c$ فرض کرده و $2ab = 2xy$, $2ac = 2x(2z) = 4xz$, $2bc = 2(y)(2z) = 4yz$ جملات $2ab$, $2ac$ و $2bc$ را می‌یابیم:

همان‌طور که دیدید، سه جمله‌ای دیگر همان جملاتی هستند که مابه دست آوردیم. پس عبارت داده شده را می‌توان به صورت $(x + y + 2z)^3 = (a + b + c)^3$ نوشت.

(ب) عبارت داده شده دارای ۶ جمله است که سه جمله‌ای x^3 , $4y^3$ و $9z^3$ مریع کامل‌اند. پس $x = b = 2y$, $a = x$ و $3z = c$ فرض کرده و $2ab = 2x(2y) = 4xy$, $2ac = 2(x)(3z) = 6xz$, $2bc = 2(2y)(3z) = 12yz$ جملات $2ab$, $2ac$ و $2bc$ را می‌یابیم:

اگر دقت کنید سه جمله‌ای دیگر همین جملات فوق هستند که ما به دست آوردیم (البته x باید علامت منفی داشته باشد). پس عبارت داده شده را می‌توان به صورت $(2y + 3z - x)^3 = (a + b - c)^3$ نوشت.

سؤال: داش پژوه (مودریه تنها): آقا اجازه! چرا x رو منفی گرفتین ولی $2y$ و $3z$ مثبت شدن؟

پاسخ: دفترم این هرفی که الان می‌فوازم بزنمه، بین فودمون نگهدار، یه رازه. تو این نوع سوالا برای پیدا کردن علامت‌ها فقط جمله‌ای که مریع کامل نیست و مثبته رو پیدا کن و بین از په متغیرهایی تشکیل شره. بعد علامت اون متغیرها رو در فرمول، مثبت بزار. مثلاً در این سوال $12yz$ مثبته و $2y$ و $3z$ و x وجود داره، به همین قاطر رر فرمول، علامت پهمله‌های دارای y و z رو مثبت گرفتیم.

۸۳- حاصل عبارت $(2x - 3y + 1)^3$ کدام است؟

$$4x^3 + 9y^3 + 1 - 12xy + 4x - 6y \quad (2)$$

$$4x^3 + 9y^3 + 1 \quad (1)$$

$$4x^3 + 9y^3 + 1 + 2x - 3y + 1 \quad (4)$$

$$4x^3 - 9y^3 + 1 - 6xy + 4x - 3y \quad (3)$$

۸۴- حاصل عبارت $(x^3 + x - x^{-3})^3$ کدام است؟

$$x^{-4} + x^{-3} + x^{-2} + 2x^3 + 1 - x^3 \quad (2)$$

$$x^{-4} - x^{-3} + 2x^3 + x^2 - 2x^{-1} \quad (1)$$

$$x^4 + x^3 + x^{-4} - 2x^{-1} + 2x^3 - 2 \quad (4)$$

$$x^4 + x^{-4} + 2x^3 + x - 2x^{-3} - 2 \quad (3)$$

۸۵- شرط برقراری $(a + b + c)^3 = (a + b)^3 + (a + c)^3$ چیست؟

$$a + b + c = abc \quad (4)$$

$$c^3 = 2ab \quad (3)$$

$$b^3 = 2ac \quad (2)$$

$$a^3 = 2bc \quad (1)$$

کنکور

($abc \neq 0$) (ا) باشد، کدام یک از روابط زیر درست است؟

$$c = \frac{ab}{a - b} \quad (4)$$

$$a = \frac{ac}{a - c} \quad (3)$$

$$a = \frac{bc}{b + c} \quad (2)$$

$$a = \frac{bc}{a - c} \quad (1)$$

۸۶- اگر $a^3 + b^3 + c^3 = a^3 + b^3 + c^3$ باشد، کدام یک از روابط زیر درست است؟

$$21 \quad (4)$$

$$14 \quad (3)$$

$$10 \quad (2)$$

$$7 \quad (1)$$



ازدئی اتمی

۸۸- در عبارت $[x+2b][x-2b]$ پس از ساده شدن، تعداد جمله‌ها برابر است با:

۷ (۴)

۶ (۳)

۴ (۱)

۸۹- تجزیه‌ی عبارت $x^3 + 4y^3 + z^3 - 4xyz + 2xz - 4yz$ کدام است؟ $(x - 2y - z)^3$ (۴) $(x - 2y + z)^3$ (۳) $(x + 2y + z)^3$ (۲) $(x + y + z)^3$ (۱)

درسنامه‌ی ۷

اتحاد مزدوج

اتحاد مزدوج به صورت زیر می‌باشد:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \quad \text{فارسی} \quad (جمله دوم) - (جمله اول) = (جمله دوم - جمله اول) (جمله دوم + جمله اول)$$

در اتحاد مزدوج دو تا پرانتز وجود دارد که جمله‌های داخل پرانتزها شبیه هم هستند، فقط علامت بین آن‌ها فرق دارد. در این صورت برای محاسبه‌ی جواب اتحاد، کافی است a و b را به توان دو برسانیم و بین آن‌ها علامت منفی قرار دهیم.

مثال: حاصل عبارت‌های زیر را بایابید.

$$(x^3y + z)(-z + x^3y) \quad \text{ب) (الف) } (2x - 3y)(2x + 3y)$$

پاسخ:

$$\text{جمله‌های داخل پرانتزها مثل} \quad (2x - 3y)(2x + 3y) = (2x)^3 - (3y)^3 = 4x^3 - 9y^3$$

هم هستند، فقط علامت‌ها فرق می‌کند

$$\text{جمله‌های داخل پرانتزها مثل} \quad (x^3y + z)(-z + x^3y) = (x^3y + z)(x^3y - z) = x^6y^3 - z^2$$

هم هستند، فقط علامت‌ها فرق می‌کند

سوال: (انش پژوه (مهتا عبدالحق)): آقا چرا حاصل اتحاد قسمت (ب) برابر $(x^3y)^3 - z^2$ نشد؟

پاسخ: بین بذار رازی رو و است خاش کنم! برای پیدا کردن جواب، بین توی پرانتزها کدام جمله یا جمله‌ها علامتشان ثابت مونده و جواب را به صورت زیر بنویس:

$$(ب) (جملاتی که علامتشان عوض شده) - (ب) (جملاتی که علامتشان ثابت مونده) = جواب اتحاد$$

مثال: توی این مثالی که پرسیدی جمله‌ی y^3 در هر دو پرانتز علامتش ثابت مونده و جمله‌ی Z علامتش تغییر کرده پس جواب اتحاد $(Z) - (x^3y)^3$ میشه.

تجزیه به کمک اتحاد مزدوج

اگر دو جمله‌ی مربع کامل به صورت $\Delta^2 - \square^2$ داشته باشیم، می‌توانیم از اتحاد مزدوج به صورت زیر برای تجزیه‌ی آن استفاده کنیم:

$$(جمله دوم + جمله اول)(جمله دوم - جمله اول) = (\square - \Delta)(\square + \Delta) \quad \text{فارسی}$$

سوال: (انش پژوه (آنلار هرقانی)): آقا میشه بیشتر توضیح بدین؟

پاسخ: بین وقتی دیدی دو تا جمله توان دو دارن که یکی مثبت و یکی منفی، سریع توان دوی اونارو فقط می‌زنیم و عبارت باقی مونده رو بیار با علامت مثبت و یه بار با علامت منفی نوشته و در هم ضرب می‌کنیم. به مثال‌ها نگاه کن:

$$1 \quad 4x^2 - 9y^2 = (2x)^2 - (3y)^2 = (2x - 3y) \times (2x + 3y)$$

مثال:

$$2 \quad (x+y)^2 - 9 = (x+y)^2 - 3^2 = (x+y - 3) \times (x+y + 3)$$

$$3 \quad x^6 - y^4 = (x^3)^2 - (y^2)^2 = (x^3 - y^2) \times (x^3 + y^2)$$

تذکره‌شنان

۹۰- حاصل $(-\sqrt{18} + 3)(-\sqrt{18} - 3)$ کدام است؟

۲۷ (۴)

۹ (۳)

-۹ (۲)

-۲۷ (۱)

۹۱- حاصل عبارت $(x^{\frac{m}{2}} - y^{\frac{m+1}{2}})(x^{\frac{m}{2}} + y^{\frac{m+1}{2}})$ کدام است؟ $x^m + y^{m+1}$ (۴) $x^{m-1} \cdot y^{m-1}$ (۳) $x^m - y^{m+1}$ (۲) $x^m - y^m$ (۱)۹۲- حاصل 9997×1000^3 شامل چند رقم ۹ است؟

۷ (۴)

۶ (۳)

۵ (۲)

۴ (۱)

۹۳- حاصل $6525^2 + 130 \cdot 50 \times 3475 - 9980 \times 10020 + 3475^2$ کدام است؟

۴۰۰ (۴)

۹۹۹۹۹۶۰۰ (۳)

-۴۰۰ (۲)

100000400 (۱)

آزمون‌های گنج

$$94 - \text{حاصل کدام است؟} \frac{205^2 - 195^2}{(\sqrt{125} + 5)(\sqrt{500} - 10)}$$

۲۰ (۴)

۴۰۰ (۳)

۲۰۰ (۲)

۴۰ (۱)

کنکور

$$95 - \text{حاصل عبارت } (x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2) \text{ برابر است با:}$$

$x^4 + x^2y^2 + y^4$

$(x^2 - y^2)^2$

$x^4 - x^2y^2 + y^4$

$x^4 + y^4$

$$96 - \text{ساده شده عبارت } (x+y+1)(x-y-1)+y(y+2) \text{ غیر صفر است?}$$

۵ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

از ریاضی اتمی

$$97 - \text{حاصل عبارت } (a^2 + 2b^2 - 2ab)(a^2 + 2b^2 + 2ab) \text{ بدهی ازای } b = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ کدام است؟}$$

$\frac{16}{9}$

$1(3)$

$\frac{9}{16}$

$\frac{25}{16}$

$$98 - \text{حاصل عبارت } (a+b-c+d)(a-b-c-d)+(b+d)^2 \text{ کدام است؟}$$

$b^2 + c^2 - 2bc$

$a^2 + d^2 + 2ad$

$a^2 + c^2 - 2ac$

$a^2 + b^2 - 2ab$

کنکور

$$99 - \text{حاصل } (8x^2 + 2)(x - \frac{1}{x})(2x + 1) \text{ کدام است؟}$$

$16x^4 - 1$

$64x^4 - 1$

$\frac{1}{2}(16x^4 - 1)$

$4x^2 - 1$

$$100 - \text{حاصل عبارت } (y^2 + yx)(zx - zy)(y^2 + x^2) \text{ کدام است؟}$$

$yzx^4 - zy^5$

$xy - zy^4 x$

$zy^5 - yzx^3$

$x^4 yz - zy^4$

آزمون‌های گنج

$$101 - \text{حاصل عبارت } (x^2 + y^2)^2 (x - y)^2 (x^2 + y^2 + 2xy) \text{ کدام است؟}$$

$(x^2 - y^2)^4$

$(x^2 - y^2)^2$

$(x^2 + y^2)^4$

$(x^2 + y^2)^2$

۱۰۲ - اگر $x^{-2}(A - C)B = -x^2 - 3x + 1$ باشد، حاصل عبارت $C = -x^2 - 3x + 1$ و $B = 2x^2 + 3x$ ، $A = 1 - 3x^2$ کدام است؟

$4x + 2$

$5 - 2x^2$

$8x + 1$

$9 - 4x^2$

$$103 - \text{حاصل عبارت } (2\sqrt{65} - 16)^2 (\sqrt{65} + 8)^2 \text{ کدام است؟}$$

41°

45°

82°

64°

$$104 - \text{حاصل عبارت } (\sqrt{2} - \sqrt{3})^1 (\sqrt{3} + \sqrt{2})^1 \text{ کدام است؟}$$

$(\sqrt{3} - \sqrt{2})^9$

$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^{19}$

$\sqrt{3} - \sqrt{2}$

$\sqrt{2} + \sqrt{3}$

$$105 - \text{حاصل } (2 + \sqrt{3})^{15} (7 - 4\sqrt{3})^3 \text{ کدام است؟}$$

315

$(2\sqrt{2})^{15}$

$1(2)$

$(\sqrt{3})^{15}$

$$106 - \text{حاصل عبارت } (2\sqrt{2} + \sqrt{50})^1 (3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})^1 \text{ کدام است؟}$$

510°

30°

150°

15°

آزمون‌های گنج

$$107 - \text{مقدار عبارت } (x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1) \text{ به ازای } x = 10 \text{ شامل چند رقم است؟}$$

32

15

31

16

کنکور

$$108 - \text{مقدار عددی عبارت } A = (2+1)(2^2+1)(2^4+1)\dots(2^{24}+1) \text{ برابر است با:}$$

$2^{256} - 1$

$2^{128} - 1$

$2^{128} + 1$

$2^{256} + 1$

کنکور

$$109 - \text{در تساوی } \frac{1-x^{16}}{A} = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8) \text{ عبارت } A \text{ کدام است؟}$$

$1 - x^8$

$1 - x^4$

$1 - x^2$

$1 - x$

مشابه از ریاضی اتمی

$$110 - \text{حاصل عبارت } (1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2})\dots(1 - \frac{1}{8^2})(1 - \frac{1}{9^2}) \text{ کدام است؟}$$

$\frac{2}{3}$

$\frac{1}{3}$

$\frac{7}{9}$

$\frac{5}{9}$

$$111 - \text{اگر } x + y = 14 \text{ و } y^2 - x^2 = 56 \text{ باشد، حاصل } (x - y)^3 \text{ کدام است؟}$$

-46

-64

64

46



کنکور

(۴) صفر

۱۱۲- اگر $x^3 + 4y^3 = 4xy^2 - 3x^2$ باشد، مقدار کدام است؟

۲ (۳)

۲ (۲)

۵ (۱)

از ریاضیات

-۴ (۴)

۱۱۳- حاصل عبارت $x^4y^5 + x^4y^5 - 2\sqrt{3}x^2y^4$ به ازای $x = 2 + \sqrt{3}$ و $y = 2 - \sqrt{3}$ کدام است؟

۴ (۳)

-۲۷۳ (۲)

۲۷۳ (۱)

آزمون‌های گامی

- $x + y$ (۴)

x + 2y (۳)

y + x (۲)

xy (۱)

کنکور

(a^۳ + x^۳)(b^۳ - y^۳) (۴)(a^۳ + b^۳)(x^۳ - y^۳) (۳)(a^۳ - x^۳)(b^۳ - y^۳) (۲)(a^۳ - b^۳)(x^۳ - y^۳) (۱)

کنکور

 $\frac{1}{b+a}$ (۴)۱۱۴- در تجزیه‌ی $xy^5 - yx^5$ کدام عامل وجود ندارد؟

b - a (۳)

b + a (۲)

b - a (۱)

۱۱۵- حاصل $(ax + by)^3 - (ay + bx)^3$ برابر است با: ۱۱۶- حاصل $(a > 0)$ a + $\frac{1}{a}$ کدام است؟ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (۳) $\sqrt{3}$ (۲)

۳ (۱)

۱۱۷- اگر $a - \frac{1}{a} = \sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}$ باشد، حاصل کدام است؟

۲x + y + 2z - 1 (۴)

x + 2y + 2z + 1 (۳)

x + y + z - 1 (۲)

x - y + z - 1 (۱)

۲x + y + z - 1 (۴)

x - y - 1 + z (۳)

x + 2y + 1 + z (۲)

x + y - 1 + z (۱)

درسنامه‌ی ۸

اتحاد جمله مشترک

اتحاد جمله مشترک به صورت زیر است:

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

جملات غیرمشترک

ضرب غیرمشترک‌ها + مشترک (جمع غیرمشترک‌ها) + مشترک (x + b)(a + c) = (a + c)(b + d)

مثال: حاصل عبارت زیر را به کمک اتحاد جمله مشترک بیابید.

$$(5x + 3)(5x - 2)$$

$$(-2x + y)(3x + y)$$

$$(3x + y - 2)(y - 5 + 3x)$$

پاسخ:

$$(5x + 3)(5x - 2) = (5x)^2 + (3 + (-2))(5x) + (3)(-2) = 25x^2 + 5x - 6$$

$$(-2x + y)(3x + y) = y^2 + (-2x + 3x)y + (-2x)(3x) = y^2 + xy - 6x^2$$

سوال: داش پژوه (سعیده آزاد): آقا اجازه! مگه جمله مشترک نباید اول هر پرانتز باشه؟

پاسخ: نه قائم، من کجا هنین هر فیو زدم. تو باید توی پرانتزها دنبال جمله‌ی مشترک توی فرمول و بقیه‌ی جمله‌ها در هر دو پرانتز میشن جمله‌ی غیر مشترک. به مثال بعدی فوب توجه کن تا مشکلت رفع شه.

$$(3x + y - 2)(y - 5 + 3x) = (3x + y)^2 + (-2 + (-5))(3x + y) + (-2)(-5) = 9x^2 + y^2 + 6xy - 21x - 7y + 10$$

اتحاد مریع دو جمله‌ای

جملات مشترک

(جملاتی که شبیه هم‌اند).

تجزیه به کمک اتحاد جمله مشترک

اگر یک عبارت سه جمله‌ای داده شود که یکی از جمله‌ها مربع کامل باشد، احتمالاً می‌توان آن را به کمک اتحاد جمله مشترک تجزیه نمود. اجازه بدھید

با یک مثال روش تجزیه را توضیح دهیم:

فرض کنید می‌خواهیم عبارت $x^2 + 5x + 6$ را تجزیه کنیم. جمله‌ی x^2 مربع کامل است، با مقایسه‌ی $x^2 + 5x + 6$ با اتحاد جمله مشترک. $ab = 6$ و $a + b = 5$ (x + a)(x + b) = $x^2 + (a + b)x + ab$ یعنی

۷۲ در عبارت داده شده دو تا جملهای $\frac{x^3}{4}$ و $\frac{x^4}{9}$ ، مربع کامل هستند. (یعنی $\frac{x^2}{2}$) حال چون جملهای $\frac{x^3}{3}$ را می‌توانیم به صورت $\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{x}{3}\right)^2$ بنویسیم، پس با توجه به فرمول اتحاد مربع دو جمله‌ای داریم:

$$\frac{x^3}{4} + \frac{x^4}{9} + \frac{x^3}{3} = \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{x}{3}\right)^2 + 2\left(\frac{x}{2}\right)\left(\frac{x}{3}\right) = \left(\frac{x}{2} + \frac{x}{3}\right)^2$$

حال قیافه‌ی عبارت حاصل را به گونه‌ای تغییر می‌دهیم تا شبیه $A(3+2x)^2$ شود:

$$\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{3}\right)^2 = \left(\frac{3x+2x^2}{6}\right)^2 = \frac{(3x+2x^2)^2}{36} = \frac{(x(3+2x))^2}{36} = \frac{x^2}{36}(3+2x)^2$$

پس $A = \frac{x^2}{36}$ است که اگر در آن $x = 6$ را قرار دهیم، حاصل برابر ۱ می‌شود.

۷۳ عدد اول را x و عدد دوم را y فرض می‌کنیم. در سؤال گفته شده که مجموع مربع عددی با ۴ برابر حاصل ضرب همان دو عدد است. په جمله‌ای بود! بزایرید اول به ریاضی این جمله را ترجمه کنیم تا یالیمون شه اصلن داره په میله؛

$$x^2 + 4y^2 = 4xy \Rightarrow x^2 + (2y)^2 - 2(2y)(x) = 0 \Rightarrow (x - 2y)^2 = 0 \Rightarrow x - 2y = 0 \Rightarrow x = 2y \quad (*)$$

بنابراین نسبت عدد اول (x) به عدد دوم (y) برابر می‌شود با:

$$\frac{x}{y} = \frac{2y}{y} = 2$$

۷۴ در عدد دو رقمی مورد نظر، رقم یکان را y و رقم دهگان را x فرض می‌کنیم. سؤال گفته که اگر مربع رقم دهگان آن را با ۲۵ برابر مربع یکان آن جمع کنیم، مساوی ده برابر حاصل ضرب این دو رقم می‌شود. این همه حرف را می‌شود با یک معادله نشان داد:

$$x^2 + 25y^2 = 10xy \Rightarrow x^2 + (5y)^2 - 2(5y)(x) = 0 \Rightarrow (x - 5y)^2 = 0 \Rightarrow x = 5y \quad (*)$$

از طرفی عدد دو رقمی مورد نظر را می‌توان به صورت $y = 10x + 1$ نوشت. پس:

$$y = 10(5y) + 1 = 50y + 1 \quad : \text{عدد دو رقمی}$$

 پس عدد دو رقمی موردنظر همواره مضرب ۵۱ بوده و در نتیجه بر ۵۱ قابل قسمت است.

۷۵ ضلع مربع اول ($a+b$) و ضلع مربع دوم ($a-b$) است. چون مساحت مربع، مجذور ضلع آن است، تفاصل مساحت‌ها برابر می‌شود با:

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab \quad \text{با توجه به فرمول درسنامه}$$

۷۶ **(۱)** در عبارت داده شده دو تا جملهای z^2 و $(x+2y-z)^2$ مربع کامل هستند، پس جذر آن‌ها را a و b فرض می‌کنیم. چون جمله‌ای دیگر

$$(x+2y-z)^2 + z^2 + 2z(x+2y-z) = ((x+2y-z) + z)^2 = (x+2y)^2$$

است. پس عبارت مورد نظر، اتحاد مربع دو جمله‌ای می‌باشد. داریم:

(۲) با فرض $x = 2$ ، $y = 3$ و $z = 1$ عبارت داده شده برابر می‌شود با:

$$(x+2y-z)^2 + z^2 + 2z(x+2y-z) = (1+4-3)^2 + 3^2 + 2(3)(1+4-3) = 4+9+12=25$$

حال در گزینه‌ها هم $x = 2$ ، $y = 2$ و $z = 3$ را جایگذاری می‌کنیم:

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab \quad (1) \quad \text{با توجه به فرمول درسنامه}$$

$$(x-2y)^2 - (1-4)^2 = 9 \quad (2) \quad \text{با گزینه‌ی (۲)}$$

$$(2y-z)^2 - (4-3)^2 = 1 \quad (3) \quad \text{با گزینه‌ی (۳)}$$

$$(x+2y)^2 - (1+4)^2 = 25 \quad (4) \quad \text{با گزینه‌ی (۴)}$$

پس گزینه‌ی (۴) صحیح است.

$$(x^3+x+1)^2 + (x+1)^2 - 2(x+1)(x^3+x+1) = x^6 + x^3 - 2(x^3+x+1) = 16$$

(۱) با فرض $x = 2$ داریم:

حال اگر $x = 2$ را در گزینه‌ها قرار دهیم، فقط گزینه‌ی (۲) برابر ۱۶ می‌شود. پس همین گزینه جواب است.

(۲) با کمی دقت متوجه می‌شویم که عبارت داده شده اتحاد مربع دو جمله‌ای است. یعنی با فرض $a = x^3+x+1$ و $b = x$. جواب کل عبارت

$$(x^3+x+1)^2 + (x+1)^2 - 2(x+1)(x^3+x+1) = (x^3+x+1 - (x+1))^2 = (x^3+x+1 - x - 1)^2 = x^4$$

سؤال برابر $(a-b)^2$ می‌شود:



۳ ۷۸ اد اول: a را عددی مناسب مانند ۴ انتخاب می‌کنیم، در این صورت عبارت $(a-2)(a+1) + 1 = 120 + 1 = 121$ برابر $(a-1)a(a+1) + 1 = 120 + 1 = 121$ است. حال در گزینه‌ها هم به جای a ، عدد ۴ قرار می‌دهیم:

$$(a-2)(a-1)^2 \stackrel{a=4}{=} (16-12+1)^2 = 25 \quad (1) \quad \text{گزینه} (۱)$$

$$(a^2 + 3a - 1)^2 \stackrel{a=4}{=} (16 + 12 - 1)^2 = 27^2 = 729 \quad (2) \quad \text{گزینه} (۲)$$

$$(a^2 - a - 1)^2 \stackrel{a=4}{=} (16 - 4 - 1)^2 = 121 \quad \checkmark \quad (3) \quad \text{گزینه} (۳)$$

$$(a^2 + a + 1)^2 \stackrel{a=4}{=} (16 + 4 + 1)^2 = 21^2 = 441 \quad (4) \quad \text{گزینه} (۴)$$

تابلویه که گزینه (۳) صحیح است.

اد دو: عبارات a و $-a$ را با هم و عبارات $(a-2)$ و $(a+1)$ را نیز با هم می‌گیریم.

$$\begin{aligned} & (a-2)(a-1)a(a+1) + 1 = ((a-1)a) \times ((a-2)(a+1)) + 1 = (a^2 - a)(a^2 + a - 2a - 2) = (a^2 - a)(a^2 - a - 2) + 1 \\ & = (a^2 - a)^2 - 2(a^2 - a) + 1 \xrightarrow[\substack{\text{را برای راحتی کار} \\ \text{برابر } t \text{ می‌گیریم}}]{\substack{a^2 - a \\ t^2 - 2t + 1}} = (t-1)^2 \xrightarrow[\substack{\text{اتحاد مربيع دوجمله‌ای}}]{\substack{t = a^2 - a}} (a^2 - a - 1)^2 \end{aligned}$$

۳ ۷۹ با توجه به درسنامه با مقایسه $3 + 2\sqrt{2}$ با $a + b + 2\sqrt{ab}$ ، متوجه می‌شویم که $a + b = 3$ و $ab = 2$. حال دو عدد پیدا می‌کنیم که جمعشان ۳ و ضربشان ۲ شود. خب خیلی راحت است. آن دو عدد ۱ و ۲ هستند. بنابراین:

$$3 + 2\sqrt{2} \xrightarrow[b=1]{\substack{a=2 \\ a+b=3}} (\sqrt{1} + \sqrt{2})^2 \xrightarrow{\text{حضر}} \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = \sqrt{(1 + \sqrt{2})^2} = |1 + \sqrt{2}| = 1 + \sqrt{2}$$

۳ ۸۰ ابتدا سعی می‌کنیم $\sqrt{40} - 7$ را به کمک اتحاد مربيع دوجمله‌ای به صورت مربيع کامل بنویسیم. با توجه به درسنامه ابتدا آن را به فرم $a + b - 2\sqrt{ab}$ می‌نویسیم. یعنی کاری می‌کنیم که پشت رادیکال عدد ۲ ایجاد شود:

$$\sqrt{7 - \sqrt{40}} = \sqrt{7 - \sqrt{4 \times 10}} = \sqrt{7 - 2\sqrt{10}} \xrightarrow[a+b-2\sqrt{ab}]{\substack{\text{مقایسه با} \\ a+b=7}} a + b = 7 \text{ و } ab = 10$$

دو عدد موردنظر ۲ و ۵ هستند که جمعشان ۷ و ضربشان ۱۰ می‌شود. پس $\sqrt{7 - 2\sqrt{10}} = \sqrt{(\sqrt{5} - \sqrt{2})^2}$ می‌نویسیم:

$$\sqrt{7 - \sqrt{40}} = \sqrt{(\sqrt{5} - \sqrt{2})^2} = |\sqrt{5} - \sqrt{2}| = \sqrt{5} - \sqrt{2}$$

سؤال: داش پژوه (الله گلش): آقا اجازه چرا $\sqrt{10} - 2\sqrt{5} - \sqrt{2}$ رو به صورت $(\sqrt{5} - \sqrt{2})^2$ ننوشتید. از کجا فهمیدین باید اول $\sqrt{5}$ رو بنویسین؟

پاسخ: اگر اونطوری که تو گفتی هم بنویسیم بواب آفر فرقی نمی‌کنه، گله کن:



$$\sqrt{(\sqrt{2} - \sqrt{5})^2} = |\sqrt{2} - \sqrt{5}| = -(\sqrt{2} - \sqrt{5}) = -\sqrt{2} + \sqrt{5} = \sqrt{5} - \sqrt{2}$$

ولی بهتره اگه بین دو بمله منفی وجود داشت، اول عدد بزرگ تر را بنویسی که فیالت از مثبت بودن عبارت داخل رادیکال راهت باشد.

۱ ۸۱ ابتدا $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}}$ را سعی می‌کنیم به فرم $a + b + 2\sqrt{ab}$ در بیاوریم. پس کاری می‌کنیم که پشت رادیکال عدد ۲ باشد.

$$9 + 4\sqrt{5} = 9 + 2 \times 2\sqrt{5} \xrightarrow[\substack{\text{زیر رادیکال می‌بریم} \\ \text{یکی از اعداد ۲ را}}]{\substack{\text{مقایسه با} \\ ۹ + 2\sqrt{2 \times 5}}} a + b = 9 \text{ و } ab = 20$$

دو عدد موردنظر ۴ و ۵ هستند که جمعشان ۹ و ضربشان ۲۰ می‌شود. پس $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} = \sqrt{(\sqrt{5} + \sqrt{4})^2} = |\sqrt{5} + \sqrt{4}| = \sqrt{5} + \sqrt{4} = \sqrt{5} + 2$ می‌نویسیم:

$$\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} = \sqrt{(\sqrt{5} + \sqrt{4})^2} = |\sqrt{5} + \sqrt{4}| = \sqrt{5} + \sqrt{4} = \sqrt{5} + 2$$

۳ ۸۲ از داخل عبارت شروع به حل می‌کنیم:

$$8 + 2\sqrt{15} \xrightarrow[a+b+2\sqrt{ab}]{\substack{\text{مقایسه با} \\ a+b=8}} a + b = 8 \text{ و } ab = 15 \xrightarrow[\substack{\text{دو عدد پیدا می‌کنیم که جمعشان} \\ \text{و ضربشان ۱۵ شود} \\ a=3 \text{ و } b=5}]{\substack{8 \\ 15}} a = 3 \text{ و } b = 5$$

پس $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2 = 8 + 2\sqrt{15}$ می‌شود که در عبارت داده شده جای‌گذاری می‌کنیم:

$$\begin{aligned}\sqrt{6 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{8 + 2\sqrt{15}}} &= \sqrt{6 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2}} = \sqrt{6 - 2\sqrt{3} + 2|\sqrt{5} + \sqrt{3}|} \\ &= \sqrt{6 - 2\sqrt{3} + 2(\sqrt{5} + \sqrt{3})} = \sqrt{6 - 2\cancel{\sqrt{3}} + 2\sqrt{5} + 2\cancel{\sqrt{3}}} = \sqrt{6 + 2\sqrt{5}}\end{aligned}$$

حال دوباره $6 + 2\sqrt{5}$ را به صورت $a + b + 2\sqrt{ab}$ می‌نویسیم. پس $a + b = 6$ و $ab = 5$. آن دو عدد خوششانس ما ۵ و ۱ هستند. بنابراین:

$$\sqrt{6 + 2\sqrt{5}} = \sqrt{(\sqrt{5} + \sqrt{1})^2} = |\sqrt{5} + 1| = \sqrt{5} + 1$$

$(2x - 3y + 1)^2 = (2x)^2 + (-3y)^2 + 1^2 + 2(2x)(-3y) + 2(2x)(1) + 2(-3y)(1) = 4x^2 + 9y^2 + 1 - 12xy + 4x - 6y$

۲ ۸۳

$(x^2 + x - x^{-2})^2 = (x^2)^2 + (x)^2 + (-x^{-2})^2 + 2(x^2)(x) + 2(x^2)(-x^{-2}) + 2(x)(-x^{-2}) = x^4 + x^2 + x^{-4} + 2x^3 - 2 - 2x^{-1}$

۴ ۸۴

در تساوی داده شده اتحاد مربيع دوجمله‌ای و مربيع سه‌جمله‌ای وجود دارد که سریع جواب آنها را می‌نویسیم و جملات را تا حد امکان با هم

ساده می‌کنیم: $(a+b+c)^2 = (a+b)^2 + (a+c)^2 \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac \Rightarrow 2bc = a^2$

۱ ۸۵

سمت چپ تساوی داده شده اتحاد مربيع سه‌جمله‌ای است. حاصل آن را نوشه و جمله‌ها را با هم ساده می‌کنیم:

$$(a-b-c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 \Rightarrow a^2 + (-b)^2 + (-c)^2 + 2a(-b) + 2a(-c) + 2(-b)(-c) = a^2 + b^2 + c^2$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2ac + 2bc = a^2 + b^2 + c^2 \Rightarrow 2bc = 2ab + 2ac \Rightarrow bc = a(b+c) \Rightarrow a = \frac{bc}{b+c}$$

سؤال: داش پژوه (نیره درفشان): آخه آقا از کجا باید از چی فاکتور بگیریم و کدام جمله رو ببریم اون ور تساوی؟



پاسخ: فب اولاً معلوم بود پهون $2ab$ و $2ac$ علامتشون منفیه بود برن اون ور تساوی، در این صورت عامل مشترک $2a$ هستش دیگه که فقط از اون می‌شه فاکتور گرفت! مگه پیز دیگه‌ای رو می‌شه فاکتور گرفت؟! دوماً پهون در گزینه‌ها a یا c رو برسیب بقیه داره می‌خویم که باید دنبال اونا بگردیم.

خب در عبارت خواسته شده، x , y و z توان ۲ دارند، پس طرفین تساوی $x + y + z = 6$ را به توان دو می‌رسانیم و از اتحاد مربيع سه‌جمله‌ای

$$x + y + z = 6 \xrightarrow{\text{توان ۲}} (x + y + z)^2 = 36 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz = 36$$

جواب را می‌یابیم:

$$\xrightarrow{xy+yz+xz=11} x^2 + y^2 + z^2 + 2(11) = 36 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 36 - 22 = 14$$

هل نشوید. از داخل شروع به حل کنید.

۲ ۸۷

$$[(x+2b)(x-2b)]^2 = [(x+2b)(x-2b)]^2 = ([x^2 - 2bx + 2bx - 4b^2])^2 = [(x^2 - 4b^2)]^2$$

$$= [x^2 + (4b^2) - 2(x^2)(4b^2)]^2 = [x^4 + 16b^4 - 8x^2b^2]^2$$

$$= (x^4 + (16b^4))^2 + (-8x^2b^2)^2 + 2(x^4)(16b^4) + 2(16b^4)(-8x^2b^2)$$

$$= x^8 + 256b^8 + 64x^4b^4 + 32x^4b^4 - 16x^6b^2 - 256x^2b^6$$

جملات مشابه

$$= x^8 + 256b^8 + 96x^4b^4 - 16x^6b^2 - 256x^2b^6 = 5$$

سؤال: داش پژوه (مهرداد هسینی): آقا اجازه! ما تویه جایی این سؤال رو دیدیم، فقط تا $(x^2 + 16b^4 - 8x^2b^2)^2$ رفته بود و بعدش گفته بود



چون اتحاد مربيع سه‌جمله‌ای هست پس با توجه به فرمول اون جواب ۶ جمله است؟

پاسخ: فب اشتباه کرده. تو سؤال گفته پس از ساده کردن! همون طور که دیری وقتی جمله‌ها رو ساده می‌کنیم ۵ تا جمله باقی می‌مانه، تو هم سعی

کن هر کتابی رو نبینی! فقط کتابی استاندارد و بیبن!



تعداد جمله‌ها ۶ تا بوده و سه تا از جمله‌ها مربع کامل هستند. جذر آن‌ها برابر $x - 2y$ و z می‌شود. اگر کمی دقت کنیم می‌توانیم آن‌ها را به صورت اتحاد مربع سه‌جمله‌ای بنویسیم:

$$x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy + 2xz + 2(-2y)z = (x - 2y + z)^2$$

ظاهر دو پرانتز به ما می‌گه که به احتمال زیاد، از اتحاد مزدوج می‌توانیم جواب را بیابیم. زیرا اعداد داخل پرانتزها عین هم هستند. پس:

$$\underbrace{(-\sqrt{18} - 3)(-\sqrt{18} + 3)}_{\text{فاکتور از منفی}} = -(\underbrace{3 + \sqrt{18}}_{\text{اتحاد مزدوج}})(\underbrace{3 - \sqrt{18}}_{}) = -(3^2 - (\sqrt{18})^2) = -(9 - 18) = -(-9) = 9$$

$$\underbrace{(x^{\frac{m}{2}} - y^{\frac{m+1}{2}})(x^{\frac{m}{2}} + y^{\frac{m+1}{2}})}_{\text{اتحاد مزدوج}} = (x^{\frac{m}{2}})^2 - (y^{\frac{m+1}{2}})^2 = x^m - y^{m+1}$$

$$\frac{x^{\frac{m}{2}}}{4} - \frac{y^{\frac{(m+1)}{2}}}{4}$$

۲ ۹۱



۹۰

سوال: رانش پژوهه (بهرام هشتگل): آقا مگه نباید جواب

پاسخ: بیان وقایی می‌گم در طول سال، درس رو بفون، مباهث به هم ربط داره اینه‌ها! تو مباهث توان رو نفوذی این‌جا می‌ای سوال تکراری می‌پرسی. وقتی یه عبارت توان دار مثل $(x^a)^b$ داریم، توان‌ها در هم ضرب می‌شن، یعنی میشه x^{ab} ، پس $(x^{\frac{m}{2}})^2$ میشه.

با استفاده از اتحاد مزدوج، حاصل را بدست می‌آوریم:
 $9997 \times 10003 = (10000 - 3)(10000 + 3) = (10000)^2 - 3^2 = 100000000 - 9 = 99999991$

پس عدد حاصل، شامل ۷ رقم ۹ است.

بهرام هشتگل! فکر کنم تو زیر لب داشتی هرفهایی نثار این سؤال می‌کردی؟ به های این کار به پیازی که می‌گم غوب گوش کن.
اگر به عبارت $6525^2 + 2 \times 6525 \times 3475 + 3475^2$ کمی دقت کنیم دو جمله‌ی 6525^2 و 3475^2 مربع کامل هستند، پس ممکن است بتوانیم اتحاد مربع دو جمله‌ای ایجاد کنیم که در این صورت نیاز به $2 \times 6525 \times 3475$ داریم که چه جالب، $130 \times 50 \times 3475$ برابر همان چیزی است که نیاز داشتیم. پس آن سه جمله، تشکیل اتحاد مربع دو جمله‌ای می‌دهند. فقط یک جمله‌ی 100^2 باقی می‌ماند که با دقت کردن به دو عدد 100^2 و 99^2 و متوجه می‌شویم که می‌توان آن‌ها را با استفاده از 10000 نوشت. داریم:

$$6525^2 + 2 \times 6525 \times 3475 + 3475^2 - 9980 \times 100^2 = (6525 + 3475)^2 - (10000 - 20) \times (10000 + 20)$$

$$= (10000)^2 - ((10000)^2 - 20^2) = 10000^2 - 20^2 + 20^2 = 400$$

عبارت صورت کسر تابلویه که اتحاد مزدوج است و در مخرج، قبل از هر کاری اعداد زیر رادیکال‌ها را تجزیه کرده و رادیکال‌ها را تا حد امکان ساده می‌کنیم. تجربه‌ی روزگار ثابت کرده که بعد از ساده‌سازی رادیکال‌ها معمولاً اعداد مشابهی در دو پرانتز ایجاد می‌گرددند:

$$205^2 - 195^2 = (205 - 195)(205 + 195) = 10 \times 400 = 4000$$

$$\frac{(\sqrt{4 \times 125} + 5)(\sqrt{4 \times 125} - 10)}{(\sqrt{125} + 5)(\sqrt{125} - 10)} = 2(\sqrt{125} + 5)(\sqrt{125} - 5) = 2(125 - 25) = 200$$

بنابراین حاصل کسر برابر 20 می‌شود.

دو تا پرانتز داریم که جملات داخل آن‌ها عین هم هستند، فقط علامت یکی از آن‌ها با هم فرق دارد. پس اتحاد مزدوج می‌باشد. حال کافی است جملاتی که علامتشان در دو پرانتز مثل هم هستند را با هم بگیریم و سپس حاصل را به کمک اتحاد مزدوج بیابیم:

$$(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2) = ((x^2 + y^2) + xy)((x^2 + y^2) - xy)$$

$$\frac{(x^2 + y^2)^2 - (xy)^2}{\text{اتحاد مزدوج}} = [(x^2)^2 + (y^2)^2 + 2(x^2)(y^2)] - x^2 y^2 = x^4 + y^4 + 2x^2 y^2 - x^2 y^2 = x^4 + y^4 + x^2 y^2$$

۳ ۹۶

$$\frac{(x+y+1)(x-y-1) + y(y+2)}{\text{اتحاد مزدوج}} = \frac{(x+(y+1))(x-(y+1)) + y(y+2)}{(x+(y+1))(x-(y+1)) + y(y+2)}$$

$$= x^2 - (y+1)^2 + y^2 + 2y = x^2 - (y^2 + 1 + 2y) + y^2 + 2y = x^2 - y^2 - 2y - 1 + y^2 + 2y = x^2 - 1$$

۱ ۹۷

۱

$$(a^2 + 2b^2 - 2ab)(a^2 + 2b^2 + 2ab) \stackrel{\text{اتحاد مزدوج}}{=} (a^2 + 2b^2)^2 - (2ab)^2$$

اتحاد مربع دو جمله‌ای

۲

$$= (a^2)^2 + (2b^2)^2 + 2(a^2)(2b^2) - 4a^2 b^2 = a^4 + 4b^4 + 4a^2 b^2 - 4a^2 b^2$$

$$\text{جواب} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4 + 4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 = \frac{9}{16} + 4\left(\frac{4}{16}\right) = \frac{9}{16} + \frac{16}{16} = \frac{25}{16}$$

 حال $b = \frac{\sqrt{2}}{2}$ و $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$ را جایگذاری می‌کنیم:

سوال: دانش پژوه (سara معلمی پور): آقا چه کاریه؟! ما از همون اول او مدیم به جای a , $\frac{\sqrt{2}}{2}$ و به جای b , $\frac{\sqrt{3}}{2}$ گذاشتیم و مسئله رو حل کردیم.


پاسخ: می‌شه بگی پند ساعت طول کشید! آره فب اونم می‌شه ولی زمان هاش زیاده و تو آزمون ورودی آله این تست بیار، شما مدرسه‌ی در پیت هم قبول نمی‌شی با این نوع راه هل هات!

۲ ۹۸

۲

چون جملات داخل دو پرانتز اول همه یکسان‌اند و فقط علامت‌های بعضی از آن‌ها فرق دارد، پس اتحاد مزدوج است. حال در دو پرانتز اول به دنبال جملاتی

$$(a+b-c+d)(a-b-c-d) + (b+d)^2 = \underbrace{(a-c+(b+d))(a-c-(b+d))}_{\text{اتحاد مزدوج}} + (b+d)^2$$

$$= (a-c)^2 - (b+d)^2 + (b+d)^2 = (a-c)^2 = a^2 + c^2 - 2ac$$

می‌گردیم که علامت آن‌ها در دو پرانتز عوض می‌شود:

۳ ۹۹

۳

(۱) اول: از بین سه پرانتز، فقط پرانتز وسط عدد کسری دارد. خب اول از همه در آن پرانتز مخرج مشترک می‌گیریم. داریم:

$$(8x^3 + 2)\left(x - \frac{1}{2}\right)(2x+1) = \cancel{2}(4x^3 + 1)\left(\cancel{2x-1}\right)(2x+1) = (4x^3 + 1)\underbrace{(2x-1)(2x+1)}_{\text{اتحاد مزدوج}}$$

$$= (4x^3 + 1)((2x)^2 - 1^2) = \underbrace{(4x^3 + 1)(4x^2 - 1)}_{\text{اتحاد مزدوج}} = (4x^3)^2 - 1^2 = 16x^6 - 1$$

 (۲) دو: با فرض $x = 1$ داریم:

$$(8x^3 + 2)\left(x - \frac{1}{2}\right)(2x+1) \stackrel{x=1}{=} (8+2)\left(1 - \frac{1}{2}\right)(2+1) = 10 \times \frac{1}{2} \times 3 = 15$$

 حال در گزینه‌ها هم به جای x ، عدد ۱ قرار می‌دهیم که فقط گزینه‌ی (۴) برابر ۱۵ می‌شود و جواب تست است.

۴ ۱۰۰

۴

ظاهر عبارت داده شده که برایمان آشنا نمی‌باشد. اجازه بدھید در دو پرانتز اول از فاکتورگیری استفاده کنیم. شاید بعد از آن کار، قیافه‌ی پرانتزها

آشنا شند:

$$\underbrace{(y^2 + yx)(zx - zy)}_{\substack{\text{فاکتور از } y \\ \text{فاکتور از } z}} (y^2 + x^2) = y \underbrace{(y+x)z(x-y)}_{\text{اتحاد مزدوج}} (y^2 + x^2) = yz \underbrace{(x^2 - y^2)(y^2 + x^2)}_{\text{اتحاد مزدوج}} = yzx^4 - zy^5$$

۳ ۱۰۱

۳

$$(x^2 + y^2)(x-y)^2 \underbrace{(x^2 + y^2 + 2xy)}_{\text{اتحاد مربع دو جمله‌ای}} = (x^2 + y^2)^2 (x-y)^2 (x+y)^2$$

$$= (x^2 + y^2)^2 \underbrace{((x-y)(x+y))^2}_{\text{اتحاد مزدوج}} = (x^2 + y^2)^2 (x^2 - y^2)^2 = ((x^2 + y^2)(x^2 - y^2))^2 = (x^4 - y^4)^2$$

۱ ۱۰۲

۱

 اگه اجازه بدین برای محاسبه $(A-C)B$ را حساب کرده و سپس $B(A-C)$ را پیدا کنیم و در انتهای عبارت حاصل را

 در x^{-2} ضرب کنیم:

$$A - C = (1 - 3x^2) - (-x^2 - 3x + 1) = 1 - 3x^2 + x^2 + 3x - 1 = -2x^2 + 3x$$

$$\Rightarrow (A-C)B = (-2x^2 + 3x)(2x^2 + 3x) = \underbrace{(-2x^2 + 3x)(3x + 2x^2)}_{\text{اتحاد مزدوج}} = (3x)^2 - (2x^2)^2 = \underbrace{9x^2 - 4x^4}_{\substack{\text{فاکتور از } x^2 \\ \text{فکتور از } x^4}} = x^2(9 - 4x^2)$$

بنابراین:

$$x^{-2}(A-C)B = \underbrace{x^{-2} \times x^2}_{1} (9 - 4x^2) = 9 - 4x^2$$



۱۰۳ اگر از عدد ۲ در پرانتز اول فاکتور بگیریم، جملاتی حاصل می‌شوند که خیلی خوبند. یعنی با فاکتورگیری به $-8 - \sqrt{65} + 8$ می‌رسیم که با کمک $(\sqrt{65} + 8)^2 = (\sqrt{65} - 8)^2 = 2^2$ تشکیل اتحاد مزدوج می‌دهند. بنابراین:

$$\begin{aligned} & (\sqrt{65} + 8)^2 = (\sqrt{65} - 8)^2 \\ & = 2^2 ((\sqrt{65} - 8)(\sqrt{65} + 8))^{2^2} = 2^2 (\sqrt{65}^2 - 8^2) = 2^2 \times 1^2 = 2^2 \end{aligned}$$

اتحاد مزدوج

اما 2^2 در گزینه‌ها نیست.

سوال: داشت پژوه (اکبر شمس‌الریاضی): آقا عیب نداره. بالاخره معلم‌ها هم گاهی اشتباه می‌کنن!
پاسخ: اکبر! هیف‌گچ که به سمت تو پرتاب بشه! یکم صبر داشته باش آقنه! ادامه‌ی حل رو بین.

- اکبر چک کنم فمایع شد!

۱۰۴ خوب دقت کنید. می‌خواهیم ماهیگیری یادتان دهیم! در این سؤال اگر کاری کنیم که توان‌ها شبیه هم شود آن‌گاه عبارت‌های $\sqrt{2} - \sqrt{3}$ و $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ در کنار هم می‌توانند تشکیل اتحاد مزدوج بدهند. پس توان 1° را به صورت توان ۹ و توان ۱ می‌شکنیم. ببینید:

$$\begin{aligned} & (\sqrt{2} - \sqrt{3})^{1^{\circ}} (\sqrt{3} + \sqrt{2})^9 = (\sqrt{2} - \sqrt{3}) (\sqrt{2} - \sqrt{3})^9 (\sqrt{2} + \sqrt{3})^9 = (\sqrt{2} - \sqrt{3}) [(\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{3})]^9 \\ & = (\sqrt{2} - \sqrt{3}) ((\sqrt{2})^2 - (\sqrt{3})^2)^9 = (\sqrt{2} - \sqrt{3}) (\underbrace{2 - 3}_{-1})^9 = (\sqrt{2} - \sqrt{3})(-1) = \sqrt{3} - \sqrt{2} \end{aligned}$$

اتحاد مزدوج

۱۰۵ توان عبارت $(2 + \sqrt{3})^2$ ، دو برابر توان عبارت $(4\sqrt{3} - 7)$ است. پس برای آن که توان‌ها یکی شود، آن را به صورت $(2 + \sqrt{3})^{2 \times 1^{\circ}}$ نوشته و حاصل $(2 + \sqrt{3})^2$ را به دست می‌آوریم که برابر $7 + 4\sqrt{3}$ می‌شود. چه جالب! حالا به دو عبارت $7 + 4\sqrt{3}$ و $7 - 4\sqrt{3}$ رسیدیم که در کنار هم می‌توانند اتحاد مزدوج بسازند:

$$\begin{aligned} & (2 + \sqrt{3})^{2 \times 1^{\circ}} \times (7 - 4\sqrt{3})^{1^{\circ}} = ((2 + \sqrt{3})^2)^{1^{\circ}} \times (7 - 4\sqrt{3})^{1^{\circ}} = (\underbrace{2 + (\sqrt{3})^2 + 2(2)(\sqrt{3})}_{7})^{1^{\circ}} (7 - 4\sqrt{3})^{1^{\circ}} \\ & = (7 + 4\sqrt{3})^{1^{\circ}} (7 - 4\sqrt{3})^{1^{\circ}} = ((\underbrace{7 + 4\sqrt{3}}_{\text{اتحاد مزدوج}})(7 - 4\sqrt{3}))^{1^{\circ}} = (7^2 - (4\sqrt{3})^2)^{1^{\circ}} = (49 - 48)^{1^{\circ}} = 1 \end{aligned}$$

۱۰۶ توان‌های یکسان 1° و علامت‌های $+$ و $-$ در دو پرانتز دارد به ما اشاره می‌کند که شاید اتحاد مزدوج حاصل شود. پس باید خودمان را به در و دیوار بزنیم تا جملات داخل پرانتزها لیاقت اتحاد مزدوج شدن را پیدا کنند. شما هم دعا کنید:

$$\begin{aligned} & (\sqrt{75} + \sqrt{5})^{1^{\circ}} (3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})^{1^{\circ}} \xrightarrow[2=\sqrt{2^2}]{3=\sqrt{3^2}} (\sqrt{5^2 \times 3} + \sqrt{5^2 \times 2})^{1^{\circ}} (\underbrace{\sqrt{3^2} \sqrt{2} - \sqrt{2^2} \sqrt{3}}_{\text{فاکتور از } \sqrt{3}\sqrt{2}})^{1^{\circ}} \\ & = (\underbrace{5\sqrt{3} + 5\sqrt{2}}_{\text{فاکتور از } 5})^{1^{\circ}} (\sqrt{3}\sqrt{2}(\sqrt{3} - \sqrt{2}))^{1^{\circ}} = 5^{1^{\circ}} (\sqrt{3} + \sqrt{2})^{1^{\circ}} (\sqrt{3}\sqrt{2})^{1^{\circ}} (\sqrt{3} - \sqrt{2})^{1^{\circ}} \\ & = 5^{1^{\circ}} \times 3^5 \times 2^5 \times [(\underbrace{\sqrt{3} + \sqrt{2}}_{\text{اتحاد مزدوج}})(\underbrace{\sqrt{3} - \sqrt{2}}_{1})]^{1^{\circ}} = 5^{1^{\circ}} \times 6^5 (3 - 2)^{1^{\circ}} = (5^2)^5 \times 6^5 = (25 \times 6)^5 = 15^5 \end{aligned}$$

۱۰۷ من که به هیچ عنوان از همان اول $= 1^{\circ}$ را در عبارتی به آن بزرگی جای‌گذاری نمی‌کنم. چون بعدش محاسبه‌ی آن‌ها کلی زمان می‌گیرد. پس ابتدا عبارت داده شده را ساده می‌کنم. همان‌طور که می‌بینید دو پرانتز $(x+1)$ و $(1-x)$ تشکیل اتحاد مزدوج می‌دهند و چون توان‌ها در پرانتزها به طور مداموم ۲ برابر می‌شوند، چند تا اتحاد مزدوج در پیش خواهیم داشت. حال آستین‌ها را بالا زده و صبور باشید:

$$\begin{aligned} & \underbrace{(x-1)(x+1)}_{\text{اتحاد مزدوج}} (x^2 + 1)(x^4 + 1)(x^8 + 1)(x^{16} + 1) = \underbrace{(x^2 - 1)(x^2 + 1)}_{\text{اتحاد مزدوج}} (x^4 + 1)(x^8 + 1)(x^{16} + 1) \\ & = \underbrace{(x^4 - 1)(x^4 + 1)}_{\text{اتحاد مزدوج}} (x^8 + 1)(x^{16} + 1) = \underbrace{(x^8 - 1)(x^8 + 1)}_{\text{اتحاد مزدوج}} (x^{16} + 1) = x^{32} - 1 \end{aligned}$$

حال در عبارت حاصل، x را برابر 1° قرار می‌دهیم:

$$x^{32} - 1 = 1^{\circ} - 1 = \underbrace{999\dots99}_{\text{تا } 32}$$

سوال: داشن پژوهه (اکبر بکلار): آقا چرا ۳۲ تا؟


پاسخ: بین مثلاً $(1 - 10^3)$ که برابر ۹۹ میشود، دو تا ۹ داره. همچنان $(1 - 10^0) = 1$ یعنی ۱۰۰۰ - ۱ = ۹۹۹ داره. به همین ترتیب که جلو بیرم می‌توانیم بگوییم $1 - 10^{-3}$ سی و دو تا ۹ داره.

۱۰۸ چون توان‌های ۲ در پرانتزها به‌طور مداوم ۲ برابر می‌شود، احتمالاً باید دنبال اتحاد مزدوج باشیم. پس طرفین تساوی داده شده در صورت سؤال را در $(1 - 2)$ ضرب می‌کنیم. دقت کنید این یک کار معمول در حل این نوع مسائل می‌باشد و شما باید آن را بدلاً باشید:

$$\underbrace{(2-1)}_1 A = \underbrace{(2-1)(2+1)(2^2+1)(2^4+1)\dots(2^{64}+1)}_{\text{اتحاد مزدوج}} \Rightarrow A = \underbrace{(2^2-1)(2^2+1)(2^4+1)\dots(2^{64}+1)}_{\text{اتحاد مزدوج}}$$

اگر همین کار را ادامه دهیم، جمله‌ها مرتبًا با هم تشکیل اتحاد مزدوج می‌دهند و در آخر به جمله‌های زیر می‌رسیم:

$$\underbrace{A = (2^{32}-1)(2^{32}+1)(2^{64}+1)}_{\text{اتحاد مزدوج}} = \underbrace{(2^{32})^2 - 1^2}_{\text{اتحاد مزدوج}} = 2^{128} - 1$$

سوال: داشن پژوهه (صهیبا امینی فرد): آقا مگه ریاضی کشکه؟ همین طوری طرفین تساوی رو در $(1 - 2)$ ضرب کردین؟


پاسخ: کشک که نیست ولی یادت باشه طرفین تساوی رو می‌توانیم در هر عبارت لفواهی (غیر از صفر) که لازم داشته باشیم ضرب کنیم. پس نکران به فطر اختادن ریاضی نباش، تو نکران نمره‌ی امتحان پایان ترمیت باش!

۱۱۰ در این سؤال چندتا پرانتز داریم که علامت‌ها در هر پرانتز مثبت بوده و توان x به‌طور مداوم، ۲ برابر می‌شود. پس قابلیت ایجاد چندتا اتحاد مزدوج در آن‌ها وجود دارد. برای حل از پرانتزی شروع می‌کنیم که کمترین توان را دارد و کل تساوی را در $(x - 1)$ ضرب می‌کنیم تا اتحاد مزدوج حاصل شود و به همین ترتیب مجددًا اتحاد مزدوج می‌شود و کار ادامه می‌یابد:

$$(1-x) \left[\frac{1-x^{16}}{A} = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8) \right] \Rightarrow \frac{(1-x)(1-x^{16})}{A} = \underbrace{(1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)}_{\text{اتحاد مزدوج}}$$

$$\Rightarrow \frac{(1-x)(1-x^{16})}{A} = \underbrace{(1-x^2)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)}_{\text{اتحاد مزدوج}} \Rightarrow \frac{(1-x)(1-x^{16})}{A} = \underbrace{(1-x^4)(1+x^4)(1+x^8)}_{\text{اتحاد مزدوج}}$$

$$\Rightarrow \frac{(1-x)(1-x^{16})}{A} = \underbrace{(1-x^8)(1+x^8)}_{\text{اتحاد مزدوج}} \Rightarrow \frac{(1-x)(1-x^{16})}{A} = (1-x^{16}) \Rightarrow \frac{1-x}{A} = 1 \Rightarrow A = 1-x$$

۱۱۱ تو رو خدا می‌بینید که چندتا اتحاد مزدوج دنبال هم ردیف شده‌اند. آخه این همه می‌خواهند کجا بروند! خب تک‌تک پرانتزها را به کمک اتحاد مزدوج

تجزیه کرده و در نهایت اعداد حاصل را با هم ساده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} & (1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{4})(1 - \frac{1}{5})(1 - \frac{1}{6})(1 - \frac{1}{7})(1 - \frac{1}{8})(1 - \frac{1}{9}) \\ &= (1 - \frac{1}{2})(1 + \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3})(1 + \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{4})(1 + \frac{1}{4})(1 - \frac{1}{5})(1 + \frac{1}{5})(1 - \frac{1}{6})(1 + \frac{1}{6})(1 - \frac{1}{7})(1 + \frac{1}{7})(1 - \frac{1}{8})(1 + \frac{1}{8})(1 - \frac{1}{9})(1 + \frac{1}{9}) \\ &= \frac{1}{2} \times \underbrace{\frac{2}{2} \times \frac{3}{3} \times \frac{4}{4} \times \frac{3}{3} \times \frac{5}{5} \times \frac{4}{4} \times \frac{6}{6} \times \frac{5}{5} \times \frac{7}{7} \times \frac{6}{6} \times \frac{8}{8} \times \frac{7}{7} \times \frac{9}{9} \times \frac{8}{8} \times \frac{10}{10}}_{1 \quad 1 \quad 1} = \frac{1}{2} \times \frac{10}{9} = \frac{5}{9} \end{aligned}$$

$$y^r - x^r = 56 \Rightarrow (y - x)(y + x) = 56 \xrightarrow{x+y=14} (y - x) \times 14 = 56 \Rightarrow y - x = \frac{56}{14} = 4$$

۱۱۱

بنابراین:

$$(x - y)^r = (-y - x)^r = (-4)^r = -64$$

$$x^r + 4y^r = 4xy \Rightarrow \underbrace{x^r + (2y)^r - 2(x)(2y)}_{\text{اتحاد مزدوج دو جمله‌ای}} = 0 \Rightarrow (x - 2y)^r = 0 \Rightarrow x - 2y = 0 \quad (*)$$

۱۱۲ راه اول:

بنابراین:

$$\underbrace{x^r - 4y^r}_{\text{اتحاد مزدوج}} = x^r - (2y)^r = (x - 2y)(x + 2y) \xrightarrow{(*)} 0 \times (x + 2y) = 0$$

(۱۵) دو: قرار دادن $x = y = 0$ و رسیدن به گزینه‌ی (۴)



$$A = x^{\Delta} y^{\delta} + x^{\delta} y^{\Delta} \xrightarrow{\text{فاکتورگیری}} x^{\Delta} y^{\delta} (x+y) = (xy)^{\Delta} (x+y)$$

قبل از دست زدن به هر کاری عبارت داده شده را ساده‌تر می‌کنیم:

حال با خیال راحت به جای x و y به ترتیب $\sqrt{3} + 2$ و $\sqrt{3} - 2$ را قرار می‌دهیم:

$$A = [(\underline{2 + \sqrt{3}})(\underline{2 - \sqrt{3}})]^{\Delta} (\underline{2 + \sqrt{3}} + \underline{2 - \sqrt{3}}) = (\underline{2 + \sqrt{3}})^{\Delta} (\underline{2 - \sqrt{3}})^{\Delta} = (4 - 3)^{\Delta} (4) = 1 \times 4 = 4$$

اتحاد مزدوج

$$xy^{\Delta} - yx^{\Delta} \xrightarrow[\text{xy}]{\text{فاکتور از}} xy(y^{\Delta} - x^{\Delta}) = xy(\underline{y^{\Delta} - x^{\Delta}})(y^{\Delta} + x^{\Delta}) = xy(y-x)(y+x)(y^{\Delta} + x^{\Delta})$$

اتحاد مزدوج

۱۱۴

$$(x+b)^{\Delta} - (x-a)^{\Delta} \xrightarrow{\text{اتحاد مزدوج}} ((x+b) + (x-a))((x+b) - (x-a)) = (\underline{2x} + b - a)(b+a) = 2x(b+a) + (b-a)(b+a) = 2Ax + B$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = b+a \\ B = (b-a)(b+a) \end{cases} \Rightarrow \frac{B}{A} = \frac{(b+a)(b-a)}{b+a} = b-a$$

۱۱۵ دو:

$$(x+b)^{\Delta} - (x-a)^{\Delta} = (\underline{x^{\Delta} + b^{\Delta} + 2bx}) - (\underline{x^{\Delta} + a^{\Delta} - 2ax}) = \underline{2bx} + 2ax + b^{\Delta} - a^{\Delta} = 2(a+b)x + b^{\Delta} - a^{\Delta} = 2Ax + B \Rightarrow A = a+b, B = b^{\Delta} - a^{\Delta}$$

ادامه حل مثل راه اول است.

$$(ax+by)^{\Delta} - (ay+bx)^{\Delta} = (1 \times 1 + 2 \times 2)^{\Delta} - (1 \times 2 + 2 \times 1)^{\Delta} = 5^{\Delta} - 4^{\Delta} = 25 - 16 = 9$$

حال اگر در گزینه‌ها به جای a و x عدد ۱ و به جای b و y عدد ۲ قرار دهیم، فقط گزینه‌ی (۱) برابر ۹ می‌شود.

۱۱۶ دو: خب خیلی شبیک و مجلسی چون دو تا جمله‌ی مربع کامل داریم که بین آن‌ها علامت منفی وجود دارد، از اتحاد مزدوج استفاده می‌کنیم. بسم...

$$(ax+by)^{\Delta} - (ay+bx)^{\Delta} = ((ax+by) - (ay+bx))((ax+by) + (ay+bx)) = (ax+by - ay - bx)(ax+by + ay + bx)$$

اما می‌بینید که در گزینه‌ها خبری از عبارت‌های بالا نیست. پس عمل تجزیه را باید ادامه بدهیم. در هر کدام از پرانتزها به‌گونه‌ای دسته‌بندی را انجام می‌دهیم که در جملات، قسمت‌های یکسانی برای فاکتورگیری ایجاد شود:

$$= ((ax - bx) + (by - ay))((ax + bx) + (by + ay)) = \underbrace{(x(a-b) - y(a-b))}_{\text{اتحاد مزدوج}} \underbrace{(x(a+b) + y(a+b))}_{\text{فاکتور از } a-b} \underbrace{(x(a+b) + y(a+b))}_{\text{فاکتور از } a+b}$$

$$= (a-b)(\underline{x-y})(a-b)(\underline{x+y}) = (a^{\Delta} - b^{\Delta})(x^{\Delta} - y^{\Delta})$$

اتحاد مزدوج

حتماً در این مسئله به اهمیت و کارایی ویژه‌ی روش عددگذاری پی برده‌اید.

۱۱۶ سه:

$$(ax+by)^{\Delta} - (ay+bx)^{\Delta} = \underline{a^{\Delta}x^{\Delta} + b^{\Delta}y^{\Delta}} + \underline{2abxy} - (\underline{a^{\Delta}y^{\Delta} + b^{\Delta}x^{\Delta}} + \underline{2abxy})$$

$$= (\underbrace{a^{\Delta}x^{\Delta} - b^{\Delta}x^{\Delta}}_{x^{\Delta} \text{ فاکتور از } y^{\Delta}}) + (\underbrace{b^{\Delta}y^{\Delta} - a^{\Delta}y^{\Delta}}_{y^{\Delta} \text{ فاکتور از } x^{\Delta}}) = (\underline{a^{\Delta} - b^{\Delta}})x^{\Delta} - (\underline{a^{\Delta} - b^{\Delta}})y^{\Delta} = (a^{\Delta} - b^{\Delta})(x^{\Delta} - y^{\Delta})$$

$$a - \frac{1}{a} = \frac{a = (\sqrt{a})^{\Delta}}{a} (\sqrt{a})^{\Delta} - \frac{1}{(\sqrt{a})^{\Delta}} = (\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}}) \times (\sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}) \quad (*)$$

با به اتحاد مزدوج داریم:

از طرفی بنا به فرض داریم $a - \frac{1}{a} = \sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}$ ، بنابراین:

$$a - \frac{1}{a} = \sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}} \xrightarrow{(*)} (\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}})(\sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}) = \sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}} \Rightarrow \sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}} = 1$$

حال برای آن‌که حاصل $a + \frac{1}{a}$ را بیابیم، کافی است طرفین تساوی به دست آمده را به توان ۲ برسانیم:

$$(\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}})^{\Delta} = 1^{\Delta} \Rightarrow a + \frac{1}{a} - 2(\sqrt{a})(\frac{1}{\sqrt{a}}) = 1 \Rightarrow a + \frac{1}{a} = 1 + 2 = 3$$

$$x^3 + y^3 + z^3 + 2(xy + xz + yz) - 1 = \underbrace{x^3 + y^3 + z^3 + 2xy + 2xz + 2yz}_\text{اتحاد مربع سه جمله‌ای} - 1 = (x+y+z)^3 - 1^3 = (x+y+z-1)(x+y+z+1)$$

۱۱۸

$$x^3 - z^3 + y^3 + 1 + 2xy - 2x - 2y = (x^3 + y^3 + 1 + 2xy - 2x - 2y) - z^3 = \underbrace{(x+y-1-z)}_\text{اتحاد مزدوج}^3 = (x+y-1-z)(x+y-1+z)$$

۱۱۹



سؤال: داشت پژوه (مهدی هسینی): آقا از کجا فهمیدین که باید $-z^3$ رو جدا بگیرین؟

پاسخ: آنکه در اتحاد مربع سه جمله‌ای سه تا مربع کامل لازم داریم و می‌دونیم مربع کامل در اون اتحاد، پیشش منفی نداره، پس $-z^3$ نمی‌توانه همراه اتحاد ما باشد، پس اونو بی‌فیال می‌شیم و روی بقیه کار می‌کنیم که توی اونا سه تا جمله‌ی مربع کامل x^3 , y^3 و z^3 رو پیدا کردیم.

۱۲۰ باز هم یک تست طولانی و هوصله سربر! بیشتر به دید تمرین تشرییحی به اون گله‌کنید!

بررسی گزینه‌ها:

$$(x - \frac{3}{x})(x + \frac{1}{x}) = \frac{\text{جمله‌ی مشترک}}{x} x^2 + \left(-\frac{3}{x} + \frac{1}{x}\right)(x) + \left(-\frac{3}{x}\right)\left(\frac{1}{x}\right) = x^2 - \frac{2}{x} \times x - \frac{3}{x^2} = x^2 - 2 - 3x^{-2} \quad \checkmark$$

گزینه‌ی (۱):

$$(4 - 3x)(5x + 4) = \frac{\text{جمله‌ی مشترک}}{4x} 4^2 + (-3x + 5x)(4) + (-3x \times 5x) = 16 + 8x - 15x^2 \quad \checkmark$$

گزینه‌ی (۲):

$$(x - c)(b + x) = \frac{\text{جمله‌ی مشترک}}{x} x^2 + (b - c)x - bc \quad \checkmark$$

گزینه‌ی (۳):

$$(2x - y)(2x + 2y) = \frac{\text{جمله‌ی مشترک}}{2x} (2x)^2 + (-y + 2y)(2x) + (-y) \times 2y = 4x^2 + 2yx - 2y^2 \quad \times$$

گزینه‌ی (۴):

$$x^2 - x - 36 = \frac{\text{دو عدد پیدا می‌کنیم که ضربشان } -21 \text{ و جمعشان } -1 \text{ شود.}}{(x - 0/7)(x - 0/3)} \quad \checkmark$$

گزینه‌ی (۱):

$$3x^2 + 3x - 36 = 3(x^2 + x - 12) = \frac{\text{دو عدد پیدا می‌کنیم که ضربشان } -12 \text{ و جمعشان } +1 \text{ شود.}}{3(x + 4)(x - 3)} \quad \times$$

گزینه‌ی (۲):

$$x^2y^2 + 16xy - 36 = (xy)^2 + 16(xy) - 36 = \frac{\text{دو عدد پیدا می‌کنیم که ضربشان } -36 \text{ و جمعشان } 16 \text{ شود.}}{(xy + 18)(xy - 2)} \quad \checkmark$$

گزینه‌ی (۳):

$$9x^2 - 21x + 10 = (3x - 5)(3x - 2) = \frac{\text{دو عدد پیدا می‌کنیم که ضربشان } 15 \text{ و جمعشان } -7 \text{ شود.}}{(3x - 5)(3x - 2)} \quad \checkmark$$

گزینه‌ی (۴):

البته کار راحت‌تر برای حل تست این است که سمت راست تساوی‌ها را در هم ضرب کرده و با سمت چپ آن‌ها مقایسه کنیم. گرچه هدف این تست تجزیه کردن است!

۱۲۲ (ا) اول: با استفاده از اتحاد جمله مشترک داریم: $(x+a)(x+b) - (x-a)(x-b) = (x^2 + (a+b)x + ab) - (x^2 + (-a-b)x + (-a)(-b))$

$$= x^2 + (a+b)x + ab - x^2 - (-a-b)x - ab = (a+b)x + (a+b)x = 2(a+b)x$$

(ب) دو: با فرض $x = a = b = 1$ داریم:

$$(x+a)(x+b) - (x-a)(x-b) = (1+1)(1+1) - (1-1)(1-1) = 4$$

حال اگر در گزینه‌ها هم a , b و x را برابر یک قرار دهیم، فقط گزینه‌ی (۴) برابر ۴ می‌شود و جواب است.

۱۲۳ در دو پرانتز (۲) و $(x - 5 + y)$ و $(x + y)$ دو جمله‌ی x و y تکرار شده‌اند، پس $y + x$ حاصل ضرب پرانتزها را

به کمک اتحاد جمله مشترک به دست آورد:

$$(x + y - 2)(x - 5 + y) - (x + y)^2 = \frac{\text{جمله مشترک}}{\text{اتحاد جمله مشترک}} ((x + y) - 2)((x + y) - 5) - (x + y)^2$$

$$= (x + y)^2 + (-2 - 5)(x + y) + (-2)(-5) - (x + y)^2 = -7(x + y) + 10 = -7x - 7y + 10$$