

خرید کتاب های کنکور

با تخفیف ویژه

و
ارال رایگان

Medabook.com



مدابوک



پک جامه ناس تلفنی، رایگان

با هشاوران رتبه برتر

برای انتخاب بهترین منابع

دبیرستان و کنکور

۰۲۱ ۳۸۴۳۵۲۱۰





پادآوری از اتحادها

مقدمات: اتحادهای معروف که در سال‌های قبل خوانده‌اید عبارتند از:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{: اتحاد مربع مجموع دو جمله‌ای}$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad \text{: اتحاد مربع تفاضل دو جمله‌ای}$$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \quad \text{: اتحاد مزدوج}$$

$$(\square + a)(\square + b) = \square^2 + (a+b) \times \square + ab \quad \text{: اتحاد یک جمله مشترک}$$

هر عبارتی می‌تواند باشد.

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad \text{: اتحاد مکعب مجموع دو جمله‌ای}$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \quad \text{: اتحاد مکعب تفاضل دو جمله‌ای}$$

$$(a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3 \quad \text{: اتحاد چاق‌ولاغر (۱)}$$

$$(a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3 \quad \text{: اتحاد چاق‌ولاغر (۲)}$$

مثال: حاصل عبارت‌های زیر را به کمک اتحادها می‌نویسیم:

$$1) \left(\frac{1}{3} + \frac{x}{3} \right)^2 = \left(\frac{1}{3} \right)^2 + 2 \left(\frac{1}{3} \right) \left(\frac{x}{3} \right) + \left(\frac{x}{3} \right)^2 = \frac{1}{9} + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{9}$$

$$2) (2x-1)^2 = (2x)^2 - 2(2x)(1) + 1^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

$$3) (\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3}) = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2 = 5 - 3 = 2$$

$$4) \underbrace{(5x-1)(5x+6)}_{\text{جمله مشترک است}} = (5x)^2 + (-1+6)(5x) + (-1)(6) = 25x^2 + 25x - 6$$

$$5) \left(\frac{1}{3} + \frac{m}{3} \right)^3 = \left(\frac{1}{3} \right)^3 + 3 \left(\frac{1}{3} \right)^2 \left(\frac{m}{3} \right) + 3 \left(\frac{1}{3} \right) \left(\frac{m}{3} \right)^2 + \left(\frac{m}{3} \right)^3 = \frac{1}{27} + \frac{m}{9} + \frac{m^2}{9} + \frac{m^3}{27}$$

$$6) (z-1)^3 = z^3 - 3(z)^2(1) + 3(z)(1)^2 - 1^3 = z^3 - 3z^2 + 3z - 1$$

$$7) (2x-1)(4x^2 + 2x + 1) = (2x)^3 - 1^3 = 8x^3 - 1$$

در فصل اول کتاب امسال، لازم است برخی عبارت‌ها را تجزیه کنیم. در تجزیه می‌خواهیم عبارت‌ها را به شکل حاصل ضرب دو یا چند عامل با درجه کمتر درآوریم، به همین منظور مختصری در مورد تجزیه صحبت می‌کنیم:

۱- روش فاکتورگیری: در این روش از ب.م. جملات، فاکتور می‌گیریم (منظور از ب.م. همان بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک است). مثلاً داریم:

$$1) 10x^2y^4 - 30x^4yz = 10x^2y(y^3 - 3x^2z)$$

$$2) 20x^5(x^2 + 1)^3 - 10x^3(x^2 + 1)^4 = 10x^3(x^2 + 1)^3[2x^2 - (x^2 + 1)] = 10x^3(x^2 + 1)^3(x^2 - 1)$$

۲- استفاده از اتحادها: به کمک اتحادهای خوانده‌شده می‌توانیم عبارت‌های جبری را تجزیه کنیم فقط کافی است ۶ اتحادی را که کمی قبل برایتان نوشتیم از راست به چپ بخوانید، یعنی مثلاً داریم:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$$

$$3) 4x^2 + 4x + 1 = (2x+1)^2$$

حالا چند عبارت دیگر را تجزیه می‌کنیم:

$$\text{مثال ۱} \quad x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$$

دوباره مزدوج تجزیه به کمک اتحاد مزدوج

$$\text{مثال ۲} \quad 2x^3 + 6x^2 - 8x = 2x(x^2 + 3x - 4) = 2x(x + 4)(x - 1)$$

تجزیه به کمک اتحاد یک جمله مشترک فاکتور از ۲x

$$\text{مثال ۳} \quad 8x^3 - 27 = (2x)^3 - 3^3 = (2x - 3)(4x^2 + 6x + 9)$$

۱۱

معادله درجه اول و حل آن

معادله، یک تساوی شامل یک یا چند متغیر است که به ازای بعضی از مقادیر برای متغیرها، این تساوی برقرار است. حل یک معادله به دست آوردن همه این مقادیری است که به ازای آن‌ها تساوی برقرار باشد، این مقادیر را جواب‌های معادله می‌گویند.

معادله‌ای که پس از ساده شدن به صورت $ax + b = 0$ درآید که در آن $a, b \in \mathbb{R}$ ، یک معادله درجه اول نامیده می‌شود.

قبل‌باً هل این بحث معادله‌ها آشنا شیر، همون که معلوم‌ها رو یه طرف و مجهول‌ها رو یه طرف دیگه می‌بریم و در نهایت بواب می‌شون، طرف معلوم، تقسیم بر ضریب مجهول.

مثال: معادله‌های زیر را حل کنید.

$$\text{پ) } 2x(x - 4) = (2x - 1)(x + 2) \quad \text{ب) } \frac{x+1}{3} - \frac{x-1}{2} = \frac{x}{4} \quad \text{آ) } 2x + 12 = 3x + 2$$

پاسخ: آ) معلوم‌ها رو یه طرف و مجهول‌ها رو هم طرف دیگه می‌بریم و با هم بمعنی هم‌بُری می‌کنیم، فقط به این تکه توبه می‌کنیم که هر عبارتی رو $2x + 12 = 3x + 2 \Rightarrow 2x - 3x = 2 - 12 \Rightarrow -x = -10$ باشه می‌کنیم، قرینه می‌شون:

حالا مقدار x برابر است با طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول:

$$x = \frac{-10}{-1} = 10$$

$$\text{ب) روش اول: } \frac{x+1}{3} - \frac{x-1}{2} = \frac{x}{4} \Rightarrow \frac{2(x+1) - 3(x-1)}{6} = \frac{x}{4} \Rightarrow \frac{2x + 2 - 3x + 3}{6} = \frac{x}{4}$$

خرج مشترک می‌گیریم.

$$\Rightarrow \frac{-x + 5}{6} = \frac{x}{4} \xrightarrow{\text{طرفین وسطین}} 6x = 4(-x + 5) \Rightarrow 6x = -4x + 20 \Rightarrow 6x + 4x = 20 \Rightarrow 10x = 20 \Rightarrow x = \frac{20}{10} = 2$$

روش دوم: می‌توانیم از همان اول دو طرف معادله را در مخرج مشترک کسرها ضرب کنیم: (خرج مشترک، همان ک.م.م مخرج هاست).

$$\frac{x+1}{3} - \frac{x-1}{2} = \frac{x}{4} \xrightarrow{\times 12} 4\left(\frac{x+1}{3}\right) - 12\left(\frac{x-1}{2}\right) = 4\left(\frac{x}{4}\right) \Rightarrow 4(x+1) - 6(x-1) = 3x \Rightarrow 4x + 4 - 6x + 6 = 3x$$

$$\Rightarrow 4x - 6x - 3x = -4 - 6 \Rightarrow -5x = -10 \Rightarrow x = \frac{-10}{-5} = 2$$

$$\text{پ) } 2x(x - 4) = (2x - 1)(x + 2) \Rightarrow 2x^2 - 8x = 2x^2 + 4x - x - 2 \Rightarrow 2x^2 - 8x - 2x^2 - 4x + x = -2$$

$$\Rightarrow -11x = -2 \Rightarrow x = \frac{-2}{-11} = \frac{2}{11}$$

$$\text{تست: جواب معادله } \frac{4x}{3} - \frac{7x}{12} = \frac{2x+1}{4} + \frac{1}{4} \text{ کدام است؟}$$

۳) ۴

۳) صفر

۲) ۲

۱) ۱

پاسخ: ک.م.م مخرج‌ها ۱۲ است، یعنی کوچک‌ترین عددی که بر تمام مخرج‌ها بخش‌پذیر باشد ۱۲ است، لذا تمام جملات را در ۱۲ ضرب می‌کنیم:

$$\frac{4x}{3} - \frac{7x}{12} = \frac{2x+1}{4} + \frac{1}{4} \xrightarrow{\times 12} 4(4x) - 7x = 3(2x+1) + 3$$

$$\Rightarrow 16x - 7x = 6x + 3 + 3 \Rightarrow 16x - 7x - 6x = 6 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = \frac{6}{3} = 2 \Rightarrow \text{گزینه (۲) صحیح است.}$$

نکته: جواب‌های یک معادله در آن معادله صدق می‌کنند. یعنی اگر جواب (ریشه) یک معادله (درجه اول) داده شود، آن جواب را به جای متغیر معادله قرار می‌دهیم تا مجھول خواسته شده بهدست آید.

مثال: اگر $x = 3k + 2$ ، جواب معادله $3 - 2k + 4 = \frac{x-k}{2}$ باشد، مقدار k و x را بیابید.

پاسخ: جواب معادله در معادله صدق می‌کند:

$$\begin{aligned} \frac{x-k}{2} + 4 &= 2k - 3 \xrightarrow{x=3k+2} \frac{3k+2-k}{2} + 4 = 2k - 3 \Rightarrow \frac{2k+2}{2} + 4 = 2k - 3 \\ \Rightarrow \frac{k(k+1)}{k} + 4 &= 2k - 3 \Rightarrow k+1+4 = 2k-3 \Rightarrow k-2k = -3-5 \Rightarrow -k = -8 \Rightarrow k = \frac{-8}{-1} = 8 \Rightarrow x = 3k+2 = 3(8)+2 = 26 \end{aligned}$$

تست: اگر $-2 = x$ جواب معادله $\frac{m+x}{2} = m+5$ باشد، مقدار m کدام است؟

۱۲ (۴)

-۸ (۳)

۸ (۲)

-۱۲ (۱)

پاسخ: جواب معادله در معادله صدق می‌کند:

$$\frac{m+x}{2} = m+5 \xrightarrow{x=-2} \frac{m-2}{2} = \frac{m+5}{1} \xrightarrow{\text{طرفین وسطین}} m-2 = 2(m+5)$$

گزینه (۱) صحیح است. $\Rightarrow m-2 = 2m+10 \Rightarrow m-2m = 10+2 \Rightarrow -m = 12 \Rightarrow m = -12$

کاربرد معادله درجه اول در حل مسائل توصیفی

از معادله درجه اول در حل بسیاری از مسائل ریاضی استفاده می‌شود. به این شکل که مجھول مسئله را یک متغیر مثل x , y , t , ... در نظر می‌گیریم و با توجه به صورت مسئله یک معادله درجه اول برای مسئله می‌نویسیم و با حل این معادله، مجھول مسئله بهدست می‌آید. در انتها باید جواب بهدست آمده را امتحان کنیم که آیا در شرایط اولیه مسئله صدق می‌کند یا خیر؟ اگر صدق نکرد آن را قبول نمی‌کنیم.

مثال: عددی را بیابید که:

آ) اگر از دو برابر آن سه واحد کم کنیم، حاصل برابر با ۲۵ گردد.

ب) اگر به دو برابر آن سه واحد اضافه کنیم، حاصل برابر ۱۵ گردد.

$$2x - 3 = 25 \Rightarrow 2x = 25 + 3 \Rightarrow 2x = 28 \Rightarrow x = \frac{28}{2} = 14$$

$$2x + 3 = 15 \Rightarrow 2x = 15 - 3 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = \frac{12}{2} = 6$$

پاسخ: آ) آن عدد را x در نظر می‌گیریم، لذا خواهیم داشت:

ب) آن عدد را x در نظر می‌گیریم، پس خواهیم نوشت:

تست: طول و عرض یک مستطیل به نسبت ۳ به ۱ می‌باشند. اگر محیط این مستطیل ۵۶ واحد باشد، مساحت آن کدام است؟

۷۰ (۴)

۱۴۷ (۳)

۲۴۳ (۲)

۱۷۵ (۱)

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{1} \Rightarrow x = 3y$$

پاسخ: اگر طول و عرض را به ترتیب x و y بنامیم آن‌گاه طبق فرض سوال خواهیم داشت:

$$2(x+y) \Rightarrow 56 = 2(3y+y) \Rightarrow 56 = 2(4y) \Rightarrow 56 = 8y \Rightarrow y = \frac{56}{8} = 7 \Rightarrow x = 3y = 3 \times 7 = 21$$

گزینه (۳) صحیح است. $\Rightarrow x \cdot y = 21 \times 7 = 147$

تست: مجموع سه عدد زوج متوالی برابر با ۴۲ می‌باشد، یکان عدد کوچک‌تر کدام است؟

۲ (۴)

۴ (۳)

۶ (۲)

۸ (۱)

پاسخ: آن سه عدد زوج را x , $x+2$ و $x+4$ در نظر می‌گیریم، داریم:

$$x + x + 2 + x + 4 = 42 \Rightarrow 3x + 6 = 42 \Rightarrow 3x = 42 - 6 \Rightarrow 3x = 36 \Rightarrow x = \frac{36}{3} = 12$$

گزینه (۴) صحیح است. \Rightarrow عدد کوچک‌تر $x = 12$



بیشتر، مگه گفته اعداد متوالین؟ پس نباید اونها را به صورت $x + 2, x + 4, x + 6$ فرض کنیم؟

دیگر، بله گفته زوج متوالین! یعنی فاصله اونها از هم دوتا دوتاست. آگه، در متن سوال، می‌گفت سه عدد طبیعی متوالی، هر ف شما درست بود.



[معادله درجه دوم]

هر معادله که پس از ساده کردن به شکل $ax^2 + bx + c = 0$ باشد، یک معادله درجه دوم نام دارد. مانند:

$$3x^2 - x + 1 = 0, \quad 2x^2 = 1, \quad x^2 - x = 0.$$

یک معادله درجه دوم می‌تواند حداکثر ۲ تا جواب داشته باشد، یعنی می‌تواند اصلاً جواب نداشته باشد یا یک جواب داشته باشد و یا ۲ تا جواب.

تست: به ازای کدام مقدار $m = 1$, $x = 2x^2 - mx = m$ جوابی برای معادله است؟

-۱ (۴)

۲ (۳)

 $\frac{1}{2}$

۱ (۱)

پاسخ: جواب معادله در معادله صدق می‌کند: (معادله په در په اول باشه په در په دو، این موضوع براش درسته).

$$2x^2 - mx = m \xrightarrow{x=1} 2(1)^2 - m(1) = m \Rightarrow 2 - m = m \Rightarrow 2 = m + m \Rightarrow 2m = 2 \Rightarrow m = \frac{2}{2} = 1 \Rightarrow \text{گزینه (۱) صحیح است.}$$

[روش‌های حل معادله درجه دوم]

برای حل معادله درجه دوم روش‌های مختلفی وجود دارد.

(۱) روش تجزیه: در این روش از فاکتورگیری یا اتحادها کمک می‌گیریم تا معادله را به صورت حاصل ضرب دو یا چند عبارت تبدیل کنیم. در اینجا از خاصیت عامل صفر استفاده می‌کنیم و تک‌تک عبارت‌ها را برابر صفر قرار داده و جواب‌های (ریشه‌های) معادله را به دست می‌آوریم.

خاصیت عامل صفر: $A \times B = 0 \Rightarrow A = 0 \text{ یا } B = 0$.

مثال: معادلات زیر را به روش تجزیه حل کنید.

x² + x - 56 = 0 (پ)

(x-1)² = 16 (ب)

x(x-1) = 2(x-1) (آ)

x² + x + 1 = 0 (ث)

x(x-4) = -4 (ج)

پاسخ:

$$x(x-1) - 2(x-1) = 0 \xrightarrow{\text{فاکتور از (x-1)}} (x-1)(x-2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x-1 = 0 \Rightarrow x = 1 \\ x-2 = 0 \Rightarrow x = 2 \end{cases} \quad (\alpha)$$

$$(x-1)^2 - 16 = 0 \Rightarrow (x-1)^2 - 4^2 = 0 \xrightarrow{\text{اتحاد مزدوج}} (x-1-4)(x-1+4) = 0 \Rightarrow (x-5)(x+3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x-5 = 0 \Rightarrow x = 5 \\ x+3 = 0 \Rightarrow x = -3 \end{cases} \quad (\beta)$$

$$x^2 + x - 56 = 0 \xrightarrow{\text{اتحاد جمله مشترک}} (x+\lambda)(x-\gamma) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x+\lambda = 0 \Rightarrow x = -\lambda \\ x-\gamma = 0 \Rightarrow x = \gamma \end{cases} \quad (\gamma)$$

$$x(x-4) = -4 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 0 \xrightarrow{\text{اتحاد مریع دو جمله‌ای}} (x-2)^2 = 0 \Rightarrow x-2 = 0 \Rightarrow x = 2 \quad (\delta)$$

وقتی معادله درجه دوم فقط یک جواب داشته باشد، به آن جواب، ریشه مضاعف می‌گوییم.

$x^2 + x + 1 = 0 \Rightarrow$ تجزیه نشدنی ریشه ندارد.

وقتی یک معادله درجه دوم قبل تجزیه نباشد، می‌گوییم معادله ریشه ندارد.

۵)

(۲) صفر

۱ (۳)

۳ (۴)

تست: ریشه بزرگ‌تر معادله $x^3 + 3(x+1)^2 - 4 = 0$ کدام است؟

پاسخ: از تجزیه عبارت برای حل معادله کمک می‌گیریم: در این معادله $(x+1)^2$ و $x+1$ مشاهده می‌شوند پس $(x+1)$ جمله مشترک خواهد بود. حال دو عدد می‌خواهیم که ضربشان -4 و جمعشان 3 باشد که این دو عدد عبارتند از $+4$ و -1 حالا ادامه حل را ببینید.

$$(x+1)^2 + 3(x+1) - 4 = 0 \xrightarrow{\text{اتحاد جمله مشترک}} [(x+1)-1][(x+1)+4] = 0$$

$$\Rightarrow (x+1-1)(x+1+4) = 0 \Rightarrow x(x+5) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x+5 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -5$$

۱۴



معززت میفوا™ روش ساده‌تری برای حل این پور معارله‌ها و هبور نداره؟

دیر: پور و هبور نداره. یه روش هست به نام روش تغییر متغیر، البته در کتاب درسی به اون اشاره‌ای نشده ولی سرعت حل بعضی معادلات رو سریع‌تر میکنه پس یار بگیری فهر نداره. در این معادله $(x+1)^2 + 3(x+1) - 4 = 0$ مشاهده می‌شے یعنی یک عبارت، دو بار تکرار شده هال $x+1$ رو مساوی با t در نظر می‌گیریم $t = x+1$ پس در معادله اصلی، هد با $(x+1)^2 + 3(x+1) - 4 = 0$ دیریم به باش t قرار می‌دیم تا معادله‌ای بدست یاد که راهت‌تر حل بشه:

$$(x+1)^2 + 3(x+1) - 4 = 0 \xrightarrow{x+1=t} t^2 + 3t - 4 = 0$$

$$\xrightarrow{\text{اتحاد جمله مشترک}} (t-1)(t+4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -4 \end{cases} \xrightarrow{t=x+1} \begin{cases} x+1 = 1 \\ x+1 = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1-1 = 0 \\ x = -4-1 = -5 \end{cases}$$

۲) روش ریشه‌گیری: بیان ساده این روش به این صورت است که اگر در یک معادله، دو طرف یا یک طرف معادله‌ای توان ۲ داشت (مانند $x^2 = 25$)

یا $x^2 = 25$ یا $x^2 = 6$ یا $x^2 = 3$ (امثال آنها) کافی است از دو طرف تساوی، جذر گرفته و به سمت راست، علامت‌های \pm بدهیم.

$$A^2 = B^2 \Rightarrow A = \pm B \quad A^2 = B \Rightarrow A = \pm \sqrt{B}$$

مثال: معادلات زیر را به کمک ریشه‌گیری حل کنید.

$$(x-1)^2 = 4(x+1)^2 \quad \text{(ت)}$$

$$3x^2 + 27 = 0 \quad \text{(پ)}$$

$$4(x+1)^2 = 25 \quad \text{(ج)}$$

$$x^2 - 9 = 0 \quad \text{(د)}$$


پاسخ:

$$x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x^2 = 9 \xrightarrow{\text{از دو طرف جذر می‌گیریم}} \sqrt{x^2} = \pm \sqrt{9} \Rightarrow x = \pm 3 \quad \text{(د)}$$

$$(x+1)^2 = \frac{25}{4} \Rightarrow (x+1) = \pm \sqrt{\frac{25}{4}} \Rightarrow x+1 = \pm \frac{5}{2} \Rightarrow \begin{cases} x+1 = \frac{5}{2} \Rightarrow x = \frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2} \\ x+1 = -\frac{5}{2} \Rightarrow x = -\frac{5}{2} - 1 = -\frac{7}{2} \end{cases} \quad \text{(ج)}$$

$$3x^2 + 27 = 0 \Rightarrow 3x^2 = -27 \Rightarrow x^2 = \frac{-27}{3} \xrightarrow{\text{نماینده نامنفی}} \text{جواب ندارد.} \quad \text{(پ)}$$

توجه کنید که در روش ریشه‌گیری (جذرگیری) باید طرف دوم تساوی هم نامنفی باشد. به عبارت دیگر داریم:



$$(x-1)^2 = 4(x+1)^2 \Rightarrow (x-1)^2 = (2(x+1))^2 \xrightarrow{\text{ریشه‌گیری}} x-1 = \pm 2(x+1) \Rightarrow x-1 = \pm (2x+2) \quad \text{(ت)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x-1 = 2x+2 \Rightarrow x-2x = 2+1 \Rightarrow -x = 3 \Rightarrow x = -3 \\ x-1 = -2x-2 \Rightarrow x+2x = -2+1 \Rightarrow 3x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

تست: در معادله درجه دوم $x^2 + bx + c = 0$ اگر $b = 0$ و $c < 0$ باشد، یکی از جواب‌های معادله کدام است؟

(۴) جواب ندارد.

 $\sqrt{-c}$ (۳) $-\sqrt{-c}$ (۲) \sqrt{c} (۱)

$$x^2 + bx + c = 0 \xrightarrow{b=0} x^2 + c = 0 \Rightarrow x^2 = -c$$

پاسخ:

چون $c < 0$ ، پس $-c > 0$ و می‌توان از ریشه‌گیری کمک گرفت:

$$x^2 = -c \xrightarrow{\text{ریشه‌گیری}} x = \pm\sqrt{-c} \Rightarrow \text{گزینه (۳) صحیح است.}$$

اما همیشه هم کار به این راهی نیست و به این سرعت نمی‌شود از ریشه‌گیری جواب‌های معادله را پیدا کنیم. بعضی وقت‌ها باید اول عبارتی با توان ۲ (مربع کامل) بسازیم تا بعد بتونیم از ریشه‌گیری کمک بگیریم. به این کار، روش مربع کامل کردن می‌کیم که آن باهاش آشنا می‌شود.

(۳) روش مربع کامل: در این روش برای حل معادله $ax^2 + bx + c = 0$ مراحل زیر را طی می‌کنیم:

مثال: $3x^2 - 6x - 1 = 0$

$$\xrightarrow{\div 3} x^2 - 2x - \frac{1}{3} = 0$$

(A) اگر ضریب x^2 یک نبود، دو طرف معادله را بر ضریب x^2 تقسیم می‌کنیم:

$$x^2 - 2x = \frac{1}{3}$$

(B) عدد ثابت را به سمت راست تساوی می‌بریم:

$$\xrightarrow{+(\frac{-2}{2})^2 = 1} x^2 - 2x + 1 = \frac{1}{3} + 1$$

(C) نصف ضریب x را به توان ۲ می‌رسانیم و به طرفین معادله اضافه می‌کنیم:

(D) در این مرحله سمت چپ تساوی را به کمک اتحاد مربع دوجمله‌ای، به صورت یک عبارت مربع کامل می‌نویسیم و سمت راست معادله، یک عدد است. حال از ریشه‌گیری برای محاسبه ریشه‌ها (جواب‌ها) استفاده می‌کنیم: (البته آنکه عدد سمت راست، منفی شد معادله جواب نداره.)

$$(x - 1)^2 = \frac{4}{3} \xrightarrow{\text{ریشه‌گیری}} x - 1 = \pm\sqrt{\frac{4}{3}} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \\ x = 1 - \frac{2}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

مثال: معادلات زیر را با روش مربع کامل کردن حل کنید.

$$2x^2 + 2x + \frac{1}{2} = 0$$

$$2x^2 - x - 2 = 0$$

$$x^2 + 2x + 3 = 0$$

پاسخ:

$$x^2 + 2x + 3 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x = -3 \xrightarrow{+(\frac{2}{2})^2 = 1} x^2 + 2x + 1 = -3 + 1 \xrightarrow{\text{اتحاد مربع دوجمله‌ای}} (x + 1)^2 = -2 \xrightarrow{\text{معادله ریشه ندارد.}} \text{منفی}$$



ابهاد! پس باید هتماً تو مرحله آخر اون طرف تساوی مثبت باشه تا بتونیم از طرفین ریشه بگیریم؟
دیگر؛ آفرین یا نم! اما آنکه صفرم باشه قبوله. تو این شرایط ریشه‌مون مغایعه می‌شون. (مثال پ رو بین)

$$2x^2 - x - 2 = 0 \xrightarrow{\div 2} x^2 - \frac{1}{2}x - 1 = 0 \Rightarrow x^2 - \frac{1}{2}x = 1 \xrightarrow{+(\frac{-1}{2})^2 = \frac{1}{16}} x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{16} = 1 + \frac{1}{16}$$

$$\Rightarrow (x - \frac{1}{4})^2 = \frac{17}{16} \xrightarrow{\text{جذر}} (x - \frac{1}{4}) = \pm\sqrt{\frac{17}{16}} \Rightarrow \begin{cases} x - \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{17}}{4} \Rightarrow x = \frac{\sqrt{17}}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1 + \sqrt{17}}{4} \\ x - \frac{1}{4} = -\frac{\sqrt{17}}{4} \Rightarrow x = -\frac{\sqrt{17}}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1 - \sqrt{17}}{4} \end{cases}$$

$$2x^2 + 2x + \frac{1}{2} = 0 \xrightarrow{\div 2} x^2 + x + \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow x^2 + x = -\frac{1}{4} \xrightarrow{+(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}} x^2 + x + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow (x + \frac{1}{2})^2 = 0 \xrightarrow{\text{جذر}} x + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

ریشه مضاعف:

تست: در حل معادله $3x^3 + 9x - 1 = 0$ به روش مربع کامل، کدام عدد را به طرفین معادله اضافه می‌کنیم؟

۹) ۴

۹) ۳

۹) ۲

۹) ۱

پاسخ:

$$3x^3 + 9x - 1 = 0 \xrightarrow{\div 3} x^3 + 3x - \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow x^3 + 3x = \frac{1}{3}$$

پس عدد $\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$ را باید به طرفین معادله اضافه کنیم، بنابراین گزینه (۲) صحیح است.

۱۶

(۴) حل معادله درجه دوم به روش کلی (Δ)

در این روش از یک مبین به نام Δ استفاده می‌کنیم به این صورت که در معادله $ax^2 + bx + c = 0$ ، عبارت Δ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

حال با توجه به علامت Δ حالت‌های زیر را داریم:

۱) $\Delta > 0$: معادله دو ریشه متمایز دارد. $\Rightarrow x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$

۲) $\Delta = 0$: معادله یک ریشه (ریشه مضاعف) دارد.

۳) $\Delta < 0$: معادله ریشه ندارد.

مثال: معادلات زیر را به روش کلی حل کنید.

۱) $4x(x-1) = -1$

۲) $3x^2 - x + 2 = 0$

۳) $2x^2 - 3x + 1 = 0$

پاسخ:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4(1)(-1) = 1 + 4 = 5 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{5}}{2(1)} \Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \\ x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

معادله ریشه ندارد.

$$4) 4x(x-1) = -1 \Rightarrow 4x^2 - 4x + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4(4)(1) = 16 - 16 = 0 \Rightarrow x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{2(4)} = \frac{1}{2}$$

تست: مقدار m به طوری که معادله $4x^3 - 12x + m = 0$ دارای ریشه مضاعف باشد، کدام است؟

۹) ۴

۳) ۳

۶) ۲

۱) صفر

پاسخ:

$$4x^3 - 12x + m = 0$$

$$\Delta = 0 \Rightarrow (-12)^2 - 4(4)(m) = 0 \Rightarrow 144 - 16m = 0 \Rightarrow 16m = 144 \Rightarrow m = \frac{144}{16} = 9 \Rightarrow 9$$

تست: اگر معادله $mx^2 - 4x + 1 = 0$ دارای دو ریشه حقیقی متمایز باشد، بیشترین مقدار صحیح برای m کدام است؟

۵) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

پاسخ:

$$mx^2 - 4x + 1 = 0 \quad \begin{array}{l} \text{دو ریشه متمایز} \\ \Delta > 0 \end{array} \Rightarrow \Delta = b^2 - 4ac > 0 \Rightarrow (-4)^2 - 4m(1) > 0 \Rightarrow 16 - 4m > 0 \Rightarrow 4m < 16$$

گزینه (۲) صحیح است. $\Rightarrow 3 =$ بیشترین مقدار صحیح m

۱۷

مجموع و حاصل ضرب ریشه ها

در معادله $ax^2 + bx + c = 0$ می توان بدون حل معادله، مجموع و حاصل ضرب ریشه های احتمالی را بیابیم:

نکته: توجه کنید باید بررسی کنیم که معادله اصلاً جواب دارد یا نه، اگر جواب داشت می توانیم مجموع و حاصل ضرب ریشه ها را پیدا کنیم. یعنی دلتا نباید منفی باشد. ضمناً $x_1 + x_2$ را با S و $x_1 \cdot x_2$ را با P هم نمایش می دهند.

مثال: مجموع و حاصل ضرب ریشه های معادلات را به دست آورید. (در صورت وجود)

$$3x^2 + 2x + 8 = 0$$

$$3x^2 + 2x - 8 = 0$$

پاسخ:

$$\Delta = 2^2 - 4(3)(-8) = 4 + 96 = 100 > 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{2}{3} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-8}{3} \end{cases} \quad (آ)$$

معادله ریشه ندارد. \Rightarrow معادله ریشه ندارد. (ب)

تست: اگر x_1 و x_2 ریشه های معادله $x^2 - x - 4 = 0$ باشند، مجموع معکوس ریشه ها کدام است؟

-۱) ۴

-۴) ۳

۴) ۲

۱) ۱

پاسخ:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{-b}{a} = \frac{-(-1)}{-4} = -\frac{1}{4} \Rightarrow \text{گزینه (۴) صحیح است.}$$

تست: در معادله $mx^2 - (4m-1)x - 4m^2 = 0$ اگر مجموع ریشه ها برابر ۳ باشد، حاصل ضرب ریشه ها کدام است؟

-۲) ۴

۲) ۳

۴) ۲

-۱) ۱

پاسخ:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = -\frac{-(4m-1)}{m} = \frac{4m-1}{m} \Rightarrow \frac{4m-1}{m} = 3 \Rightarrow 4m-1 = 3m \Rightarrow 4m-3m = 1 \Rightarrow m = 1$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-4m^2}{m} = -4m \Rightarrow \text{گزینه (۱) صحیح است.}$$

نکته تستی: در معادله $ax^2 + bx + c = 0$

$\frac{c}{a}, 1$

$-\frac{c}{a}, -1$

(آ) اگر مجموع ضرایب برابر صفر باشد (یعنی $a+b+c=0$)، آنگاه ریشه های معادله عبارتند از:

(ب) اگر $b=a+c$ باشد، آنگاه ریشه های معادله عبارتند از:

تست: یکی از جواب‌های معادله $kx^2 - x - k + 1 = 0$ کدام است؟

$$\frac{k+1}{k} \quad (۱)$$

$$\frac{1-k}{k} \quad (۲)$$

$$\frac{k-1}{k} \quad (۳)$$

-۱()

پاسخ:

$$kx^2 - x - k + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{c}{a} = \frac{-k+1}{k} = \frac{1-k}{k} \end{cases} \text{ گزینه (۳) صحیح است. مجموع ضرایب}$$

۱۸

نوشتمن معادله درجه دوم با ریشه‌های α و β

اگر α و β ریشه‌های یک معادله درجه دوم باشند، آن‌گاه معادله مربوط به آن‌ها می‌تواند به شکل $(x-\alpha)(x-\beta) = 0$ یا هر ضریبی از آن نوشته شود. یعنی بی‌شمار معادله به فرم زیر داریم که α و β ریشه‌های آن‌هاست:

$$k(x-\alpha)(x-\beta) = 0 ; (k \neq 0)$$

بیشید من نمی‌فهمم هر ضریبی از اون یعنی چی؟

دیر: بین مثلاً هم ریشه‌های معادله $(x-1)(x-2) = 0$ ، اعداد ۱ و ۲ اند و هم ریشه‌های معادله $(x-1)^2 = 0$ برابر ۱ و ۱ اند و هم ریشه‌های معادله $(x-1)^3 = 0$ برابر ۱ و ۱ و ۱ هستند. یعنی با تغییر k معادلات بدیری برسن میان ولی ریشه‌های همه اون‌ها ۱ و ۱ است. فرمula آن فقط به معادله آزت فواسته شد می‌توانی k رو ننویسی.

مثال: با داشتن جواب‌های هر معادله، یک معادله برای آن‌ها بنویسید.

$$x_1 = x_2 = 2 \quad (۱)$$

$$x_1 = 0, x_2 = \frac{1}{2} \quad (۲)$$

$$x_1 = -1, x_2 = 2 \quad (۳)$$

پاسخ:

$$(x-(-1))(x-2) = 0 \Rightarrow (x+1)(x-2) = 0 \xrightarrow{\text{پرانترها را در هم ضرب می‌کنیم}} x^2 - x - 2 = 0 \quad (۱)$$

$$(x-0)(x-\frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow x(x-\frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow x^2 - \frac{1}{2}x = 0 \xrightarrow{\substack{\text{ضرب جملات در} \\ \text{برای حذف مخرج}}} 2x^2 - x = 0 \quad (۲)$$

$$(x-2)(x-2) = 0 \Rightarrow (x-2)^2 = 0 \xrightarrow{\text{اتحاد مربع دو جمله‌ای}} x^2 - 4x + 4 = 0 \quad (۳)$$

تست: کدام گزینه می‌تواند معادله درجه دوم با ریشه‌های ۳ و $-\frac{1}{3}$ باشد؟

$$3x^2 + 10x - 3 = 0 \quad (۱)$$

$$3x^2 - 8x - 3 = 0 \quad (۲)$$

$$3x^2 + 8x - 3 = 0 \quad (۳)$$

$$3x^2 - 10x - 3 = 0 \quad (۴)$$

$$(x-3)(x-(-\frac{1}{3})) = 0 \Rightarrow (x-3)(x+\frac{1}{3}) = 0 \xrightarrow{\text{پرانترها را در هم ضرب می‌کنیم}} x^2 + \frac{1}{3}x - 3x - 3(-\frac{1}{3}) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \frac{8}{3}x - 1 = 0 \xrightarrow{\text{اتحاد مزدوج}} 3x^2 - 8x - 3 = 0 \Rightarrow \text{صحیح است. گزینه (۲)}$$

پاسخ:

استاد! پرا تمام جملات $-1 - \frac{8}{3}x$ رو در عدد ۳ ضرب کردین؟

دیر: چون دیرم این معادله، توی گزینه‌ها وجود نداره، پس اومدم معادله رو در ۳ ضرب کردم تا مخرج ۳ از بین پره.



نکته‌تستی: اگر ریشه‌های معادله درجه دوم داده شده باشند، روش دیگر پیدا کردن معادله مربوط به این دو ریشه این است که S و P را پیدا کرده S یعنی جمع ریشه‌ها و P یعنی ضرب آن‌ها) و سپس در رابطه $x^2 - Sx + P = 0$ جایگذاری کنیم. مثلاً اگر ریشه‌های معادله درجه دومی $1 + \sqrt{3}$ و $1 - \sqrt{3}$ باشند، آن‌گاه:

$$\left\{ \begin{array}{l} S = x_1 + x_2 = (1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3}) = 2 \\ P = x_1 \cdot x_2 = (1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) = 1^2 - \sqrt{3}^2 = 1 - 3 = -2 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} S = x_1 + x_2 = (1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3}) = 2 \\ P = x_1 \cdot x_2 = \underbrace{(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})}_{\text{اتحاد مزدوج}} = 1^2 - \sqrt{3}^2 = 1 - 3 = -2 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow x^2 - Sx + P = 0 \Rightarrow x^2 - 2x + (-2) = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 2 = 0$$

معادله درجه دوم

فصل


قسمت اول: معادله درجه اول و روش‌های حل آن

حل معادله درجه اول - مصدق کردن جواب معادله در خود معادله

- ۱.۱ ☆ مقدار x از تساوی $(x+1)^3 + (x+2)^3 = 2x(x-1) + 3$ کدام است؟
- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $-\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) $-\frac{1}{4}$
- ۱.۲ ☆ معادله $x(x^2 - 2) - (x^2 + x + 1) = x$ دارای چند جواب است؟
- (۱) صفر (۲) یک (۳) دو (۴) سه
- ۱.۳ ☆ اگر $2x + m - 1 = 1 + \frac{x}{m}$ باشد، مقدار m کدام است؟
- (۱) $-\frac{1}{2}$ (۲) $-\frac{1}{3}$ (۳) 1 (۴) $-\frac{1}{4}$
- ۱.۴ ☆ اگر $a \neq 2b$ باشد، جواب معادله $a(x-1) - 2bx + 2b = 0$ کدام است؟ (a و b را عدد فرض کنید).
- (۱) 1 (۲) b (۳) a (۴) -1

کاربرد معادله درجه اول در حل مسائل توصیفی

- ۱.۵ ☆ عرض یک مستطیل، نصف طول آن است. اگر محیط مستطیل ۱۵ واحد باشد، اختلاف طول و عرض آن چند واحد است؟
- (۱) $\frac{2}{5}$ (۲) $\frac{5}{5}$ (۳) 2 (۴) 4
- ۱.۶ ☆ اضلاع یک مثلث به صورت $1 - 2x$, $x + 4$ و x می‌باشند. اگر محیط این مثلث ۳۵ باشد، طول بزرگ‌ترین ضلع آن کدام است؟
- (۱) 12 (۲) 13 (۳) 15 (۴) 16
- ۱.۷ ☆ طول اضلاع یک مثلث، سه عدد زوج متولی می‌باشند. اگر محیط این مثلث ۲۴ واحد باشد، مساحت آن کدام است؟
- (۱) 6 (۲) 12 (۳) 48 (۴) 24
- ۱.۸ ☆ اندازه زوایای مثلثی متناسب با اعداد ۷ و ۱۱ و ۱۸ می‌باشد. نوع مثلث کدام است؟
- (۱) متساوی الساقین (۲) قائم الزاویه (۳) قائم الزاویه متساوی الساقین (۴) نامشخص
- ۱.۹ ☆ اگر مساحت قسمت رنگی ۸ واحد مربع باشد، شعاع دایره کدام است؟
- (۱) $\frac{2}{\pi}$ (۲) $\frac{4}{\sqrt{4 - \pi}}$ (۳) $\frac{2}{\sqrt{4 - \pi}}$ (۴) $\frac{4}{2 - \pi}$



- ۱.۱۰ ☆ نقطه A روی خط $y = -2x + 1$, $m + 3 = A$ در کدام ربع مختصاتی قرار دارد؟
- (۱) اول (۲) دوم (۳) سوم (۴) چهارم
- ۱.۱۱ ☆ نگین ۸ سال بزرگ‌تر از دو خواهر دو قلویش است. اگر مجموع سن هر سه دختر ۳۲ سال باشد، نگین چند سال سن دارد؟
- (۱) 12 (۲) 18 (۳) 16 (۴) 20
- ۱.۱۲ ☆ وقتی سیامک به دنیا آمد، پدرشن ۳۰ ساله بود. اگر ۵ سال دیگر سن پدر سیامک سه برابر سن سیامک باشد، سیامک چند سال دارد؟
- (۱) 25 (۲) 15 (۳) 10 (۴) 15
- ۱.۱۳ ☆ هنگام تولد ندا، پدرشن ۲۶ ساله بوده است. اگر در سال ۱۳۷۵، مجموع سن آن‌ها ۴۲ سال بوده باشد، سال تولد ندا کدام است؟
- (۱) 1367 (۲) 1366 (۳) 1365 (۴) 1364

- ۱۴.** ۵ سال دیگر مجموع سن رضا و مجید ۳۰ سال خواهد شد. اگر سال گذشته سن رضا دو برابر سن مجید بوده باشد، اختلاف سن آنها کدام است؟
 ۵ (۴) ۶ (۳) ۴ (۲) ۷ (۱)
- ۱۵★.** نیکا تعدادی شکلات داشت که ثلث آن را به مادرش و نیمی از بقیه را به پدرش داد. اگر برای نیکا ۱۵ شکلات باقیمانده باشد، تعداد شکلات های اولیه نیکا چند تا بوده است؟
 ۲۰ (۴) ۱۸ (۳) ۱۵ (۲) ۱۲ (۱)
- ۱۶★.** نصف $\frac{3}{4}$ زمینی برای ساخت ساختمان مسکونی و $\frac{1}{3}$ باقیمانده برای حیاط و پارکینگ و بقیه به عنوان باعچه در نظر گرفته شده است. اگر مساحت باعچه ۴۰۰ متر مربع باشد، مساحت زمین چه قدر بوده است؟
 ۵۴۰ (۴) ۶۰۰ (۳) ۷۲۰ (۲) ۹۶۰ (۱)
- ۱۷.** سه شریک از یک پروژه ۹۰ میلیون تومان سود کسب می کنند. اگر سرمایه نفر اول سه برابر نفر دوم و سرمایه نفر دوم نصف نفر سوم بوده باشد، بیشترین سود مربوط به نفر چندم است و چقدر است؟
 ۴۵ (۴) ۴۵ (۳) ۳۰ - (۲) ۳۰ - (۱)
- ۱۸★.** قیمت هر دفتر ۴ برابر قیمت هر مداد و قیمت هر مداد $\frac{5}{3}$ قیمت هر پاکن است. اگر مجموع بهای ۴ دفتر، ۳ مداد و ۵ پاکن ۵۵ هزار تومان (آزمون های گاج) باشد، قیمت هر مداد چند تومان است؟
 ۲۰۰۰ (۴) ۲۵۰۰ (۳) ۳۰۰۰ (۲) ۱۵۰۰ (۱)
- ۱۹.** قیمت کالایی پس از ۶۵ درصد تخفیف برابر ۷ هزار تومان است. قیمت این کالا پس از ۷۰ درصد تخفیف چقدر است؟
 ۶۰۰۰ (۴) ۵۵۰۰ (۳) ۶۵۰۰ (۲) ۵۰۰۰ (۱)
- ۲۰.** ۱۴ برابر عددی از ۸ برابر آن، ۴۵ واحد بیشتر است. آن عدد کدام است؟
 ۸/۵ (۴) ۸ (۳) ۷/۵ (۲) ۷ (۱)
- ۲۱.** اگر از سه برابر عددی ۴ واحد کم شود، سپس به حاصل، نصف همان عدد اضافه گردد، عدد به دست آمده برابر با ۱۰ میگردد. آن عدد کدام است؟
 ۱۴ (۴) ۴ (۳) ۱۲ (۲) ۲ (۱)
- ۲۲.** ۵۵ درصد از ثلث عددی، ۷ واحد از $\frac{5}{12}$ آن عدد کمتر است. آن عدد کدام است؟
 ۲۵ (۴) ۲۰ (۳) ۲۵ (۲) ۳۰ (۱)
- ۲۳★.** یک عدد، همان مقدار از ۵ کمتر است که از ۲ بیشتر است. آن عدد کدام است؟
 ۳/۵ (۴) ۳ (۳) ۲/۵ (۲) ۲ (۱)
- ۲۴★.** مجموع سه عدد طبیعی فرد متولی برابر ۱۵ است. یکان عدد وسطی کدام است؟
 ۹ (۴) ۷ (۳) ۵ (۲) ۳ (۱)
- ۲۵.** مجموع چهار عدد فرد متولی برابر ۵۶ می باشد. حاصل ضرب بزرگ ترین آنها در کوچک ترین آنها کدام است؟
 ۸۷۱ (۴) ۷۸۱ (۳) ۱۸۷ (۲) ۱۷۸ (۱)

◀ قسمت دوم: معادله درجه دوم و روش های حل آن ▶

حل معادله درجه دوم - صدق کردن جواب معادله در خود معادله

- ۲۶★.** به ازای کدام مقدار m ، یکی از جواب های معادله $1 - mx - m = x^2$ برابر با ۴ است؟
 -۳ (۴) -۲ (۳) ۲ (۲) ۳ (۱)
- ۲۷★.** اگر m جواب معادله $0 = x^2 + 3x + 5$ باشد، حاصل $1 + m - 3m^2$ کدام است؟
 ۸ (۴) ۷ (۳) ۶ (۲) ۵ (۱)
- ۲۸.** در معادله درجه دومی که مجموع ضرایب آن صفر است، کدام عدد همواره جواب معادله است؟
 ۴ صفر ۲ (۳) -۱ (۲) ۱ (۱)
- ۲۹★.** اگر x_1 و x_2 جواب های معادله $(x+3)^3 - x^3 = 7$ باشد، حاصل $x_2 - x_1$ با فرض $x_2 > x_1$ کدام است؟
 $\frac{3}{2}$ (۴) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{2}{3}$ (۲) ۳ (۱)

۳۰. جواب کوچک تر معادله $(x-1)(x+2) = 0$ کدام است؟
- ۱) (۴) ۲) (۳) ۳) (۲) ۴) (۱)
- ۳۱★. مجموع ریشه‌های حقیقی معادله $x^3 + x^2 - 18(x^3 + x) + 72 = 0$ کدام است؟
- ۱) (۴) ۲) (۳) ۳) (۲) ۴) (۱)
- ۳۲★. تفاضل جواب‌های معادله $25(x-1)^2 = 9$ کدام است؟
- ۱) $\frac{1}{3}$ ۲) $\frac{6}{3}$ ۳) $\frac{8}{3}$ ۴) $\frac{4}{3}$
- ۳۳★. در معادله $ax^3 + bx^2 + cx = 0$ ، اگر $b = 0$ باشد، کدام گزینه همواره صحیح است؟
- ۱) اگر $a < 0$ ، آنگاه معادله دارای دو جواب قرینه است.
۲) اگر $a > 0$ ، آنگاه معادله دارای دو جواب قرینه است.
۳) اگر $a > 0$ ، آنگاه معادله دارای یک جواب دارد.
- ۳۴★. برای حل معادله درجه دوم $x^2 - 3x - 8 = 0$ به روش مربع کامل‌کردن، در مرحله استفاده از خاصیت ریشه زوج، از کدام عدد جذر می‌گیریم؟
- ۱) ۱۷ ۲) $\frac{23}{6}$ ۳) $\frac{41}{4}$ ۴) $\frac{19}{2}$
- ۳۵★. برای حل معادله درجه دوم $2x(x-2) = 0$ به روش مربع کامل، کدام مقدار را باید به طرفین تساوی اضافه کنیم؟
- ۱) صفر ۲) (۱) ۳) (۴) ۴) (۲)
- (سراسری فارج از کشون - ۹۴)
- ۳۶★. تعداد جواب‌های معادله $x^4 + 10x^3 + 9 = 0$ کدام است؟
- ۱) صفر ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۱)
- ۳۷★. به ازای کدام مقدار a ، معادله $a(3x+4) = x$ دارای ریشه مضاعف است؟
- ۱) $-\frac{3}{4}$ ۲) $\frac{3}{4}$ ۳) $\frac{4}{3}$ ۴) $-\frac{4}{3}$
- (سراسری فارج از کشون - ۸۶)
- ۳۸★. اگر در معادله درجه دوم $ax^2 - 12x + 9 = 0$ ، تفاضل دو جواب برابر صفر باشد، یک جواب این معادله کدام است؟
- ۱) $\frac{3}{2}$ ۲) (۲) ۳) $-\frac{3}{2}$ ۴) $-\frac{1}{2}$
۳۹. ریشه مضاعف معادله $mx^2 + mx + 1 = 0$ کدام است؟
- ۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)
- (سراسری - ۹۱)
- ۴۰★. معادله درجه دوم $x(2x-5) = a$ ، به ازای یک مقدار a دارای جواب مضاعف است. مقدار این جواب کدام است؟
- ۱) $\frac{5}{2}$ ۲) $\frac{5}{4}$ ۳) $-\frac{5}{4}$ ۴) $-\frac{5}{2}$
۴۱. تفاضل ریشه‌های معادله $ax^2 + 6x + 1 = 0$ برابر صفر است. ریشه بزرگ تر معادله $x^2 - ax + 20 = 0$ کدام است؟
- ۱) (۵) ۲) (۴) ۳) (۳) ۴) (۲)
- ۴۲★. به ازای چه مقدار n ، معادله درجه دوم $m^2x^2 - 6mx + 2m + n = 0$ دارای ریشه مضاعف $\frac{3}{4}$ است؟
- ۱) (۱) ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) (۴)
- (سراسری فارج از کشون - ۹۱)
- ۴۳★. به ازای کدام مقدار a ، معادله درجه دوم $3x^2 + ax - 3 = 0$ دو جواب حقیقی متمایز دارد؟
- ۱) هر مقدار a ۲) هیچ مقدار a ۳) (۲) ۴) (۱)
- ۴۴★. تعداد جواب‌های کدام معادله، از بقیه کمتر است؟
- ۱) $2x^2 + 200 = 0$ ۲) $(3x-4)^2 - 16 = 0$ ۳) $2x^2 - 32 = 0$ ۴) $\frac{x^2}{5} = x$
۴۵. بزرگ‌ترین جواب معادله $x(2x+5)+2=0$ کدام است؟
- ۱) $-\frac{1}{2}$ ۲) (۲) ۳) $-\frac{1}{2}$ ۴) $\frac{1}{2}$
- ۴۶★. معادله $x^3 - x - 1 = 0$ دارای چند جواب گویا است؟
- ۱) صفر ۲) (۲) ۳) (۳) ۴) حداقل یکی

(سپاسی - ۸۷)

$$2\sqrt{3} \quad (4)$$

در معادله درجه دوم $(x-1)^2 + 2\sqrt{3}(x-1) = 6$ ، بزرگ‌ترین جواب x کدام است؟

$$\sqrt{3} \quad (3)$$

$$-2\sqrt{3} \quad (2)$$

$$4 - \sqrt{3} \quad (1)$$

$$2 \quad (4)$$

اگر یکی از ریشه‌های معادله $a^2x^2 - 4ax + 4 = 0$ برابر ۱ باشد، ریشه دیگر کدام است؟

$$-1 \quad (3)$$

$$2 \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

$$\frac{b}{a} \quad (4)$$

$$-\frac{b}{a} \quad (3)$$

$$\frac{a+b}{a} \quad (2)$$

$$\frac{a-b}{a} \quad (1)$$

$$2 \quad (4)$$

$$\frac{5}{9} \quad (3)$$

$$-1 \quad (2)$$

$$-\frac{5}{9} \quad (1)$$

(آزمون‌های گنج)

اگر در معادله $ax^2 - bx + c = 0$ ، رابطه $c = a + b$ برقرار باشد. کدام گزینه همواره ریشه‌ای برای معادله است؟

$$1 \quad (4)$$

$$-1 \quad (3)$$

$$-\frac{c}{a} \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

(سپاسی - ۸۱۴)

در معادله درجه دوم $x^2 - (b-2)x + 2b = 0$ مجموع ریشه‌ها برابر ۱۰ است. ریشه بزرگ‌تر کدام است؟

$$8 \quad (4)$$

$$7 \quad (3)$$

$$6 \quad (2)$$

$$5 \quad (1)$$

در معادله درجه دوم $2x^2 + ax + 4 = 0$ ، به ازای یک مقدار a ، مجموع دو ریشه حقیقی برابر $\frac{9}{2}$ است، ریشه بزرگ‌تر کدام است؟

$$\frac{3}{2} \quad (4)$$

$$\frac{1}{2} \quad (3)$$

$$-\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$-\frac{3}{2} \quad (1)$$

(سپاسی فارج از کشوار - ۹۰)

در معادله درجه دوم $21 + 4x^2 + kx = 0$ ، اگر مجموع دو ریشه برابر (۲) باشد، ریشه بزرگ‌تر کدام است؟

$$\frac{7}{2} \quad (4)$$

$$\frac{7}{4} \quad (3)$$

$$\frac{3}{2} \quad (2)$$

$$\frac{3}{4} \quad (1)$$

(سپاسی فارج از کشوار - ۹۱)

در معادله درجه دوم $6x^2 + (k+1)x + k = 0$ ، اگر مجموع دو ریشه حقیقی برابر $\frac{1}{6}$ باشد، ریشه مثبت آن کدام است؟

$$\frac{4}{3} \quad (4)$$

$$1 \quad (3)$$

$$\frac{2}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

(سپاسی فارج از کشوار - ۹۲)

در معادله درجه دوم $2x^2 + kx + 1 - k = 0$ ، اگر حاصل ضرب دو ریشه برابر ۵ باشد، ریشه بزرگ‌تر کدام است؟

$$5 \quad (4)$$

$$4 \quad (3)$$

$$3 \quad (2)$$

$$2/5 \quad (1)$$

به ازای کدام مقدار m ، ریشه‌های حقیقی معادله $mx^2 + 3x + m^2 = 2$ معکوس یک‌دیگرند؟

$$2 \quad (4)$$

$$1 \quad (3)$$

$$-1 \quad (2)$$

$$-2 \quad (1)$$

مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های $2x^2 + (m-1)x + 2m = 0$ با هم برابرند. مقدار m کدام است؟

$$-1 \quad (4)$$

$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$1 \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

یکی از جواب‌های معادله $x^2 + 7x + 2m = 0$ برابر -۲ است. جواب دیگر کدام است؟

$$\frac{17}{2} \quad (4)$$

$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$-\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$-\frac{17}{2} \quad (1)$$

یکی از جواب‌های معادله $2x^2 - kx + 5 = 0$ برابر ۵ است. k و جواب دیگر معادله به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟

$$2 \text{ و } 11 \quad (4)$$

$$2 \text{ و } 9 \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

(سپاسی - ۸۳)

اگر $x = 1$ یکی از ریشه‌های معادله درجه دوم $5x^2 - 3x + k = 0$ باشد، ریشه دیگر کدام است؟

$$0/4 \quad (4)$$

$$0/3 \quad (3)$$

$$-0/3 \quad (2)$$

$$-0/4 \quad (1)$$

۶۴. اگر یکی از جواب‌های معادله درجه دوم $ax^2 + x - 2 = 0$ برابر (۱) می‌باشد، جواب دیگر معادله کدام است؟

$$-\frac{3}{2} \quad (۴)$$

$$-\frac{2}{3} \quad (۳)$$

$$\frac{2}{3} \quad (۲)$$

$$\frac{3}{2} \quad (۱)$$

در معادله $x^2 - 8x + m = 0$ یکی از ریشه‌ها، از نصف ریشه دیگر ۵ واحد بیشتر است. m کدام است؟

$$15 \quad (۴)$$

$$14 \quad (۳)$$

$$12 \quad (۲)$$

$$10 \quad (۱)$$

اگر یک ریشه معادله $2x^2 + 9x + a = 0$ دو برابر ریشه دیگر باشد، مقدار a کدام است؟

$$-3 \quad (۴)$$

$$\frac{9}{2} \quad (۳)$$

$$3 \quad (۲)$$

$$9 \quad (۱)$$

(سراسری - ۸۶) در معادله درجه دوم $4x^2 - 4x + a = 0$ ، به ازای کدام مقدار a ، یکی از جواب‌ها ۲ واحد بیشتر از جواب دیگر است؟

$$3 \quad (۴)$$

$$1 \quad (۳)$$

$$-2 \quad (۲)$$

$$-3 \quad (۱)$$

(سراسری فارغ از کشور - ۹۵) به ازای یک مقدار m ریشه‌های معادله $2x^2 + 3mx + 2m + 6 = 0$ معکوس یکدیگرند. مجموع این دو ریشه کدام است؟

$$3 \quad (۴)$$

$$2 \quad (۳)$$

$$1/5 \quad (۲)$$

$$-1/5 \quad (۱)$$

نوشتمن معادله با داشتن ریشه‌ها

۶۹. در کدام معادله مجموعه جواب‌ها به صورت $\{-3, 0\}$ است؟

$$2x^2 + 5x - 3 = 0 \quad (۴)$$

$$2x^2 - 5x - 3 = 0 \quad (۳)$$

$$2x^2 + 5x + 3 = 0 \quad (۲)$$

$$2x^2 - 5x + 3 = 0 \quad (۱)$$

(سراسری - ۹۱)

$$4x^2 - 2x + 1 = 0 \quad (۴)$$

$$2x^2 - 2x + 1 = 0 \quad (۳)$$

۷۰. جواب‌های کدام معادله به صورت $\frac{2 \pm \sqrt{3}}{2}$ است؟

$$x^2 - 2x + \frac{1}{4} = 0 \quad (۲)$$

$$x^2 + 2x - 1 = 0 \quad (۱)$$

قسمت سوم: کاربردهای معادله درجه دوم

کاربرد معادله درجه دوم در حل مسائل توصیفی

۷۱. حاصل ضرب اعداد طبیعی قبل و بعد عددی طبیعی برابر ۱۲۰ است. مجموع ارقام این عدد کدام است؟

$$9 \quad (۴)$$

$$3 \quad (۳)$$

$$2 \quad (۲)$$

$$8 \quad (۱)$$

۷۲. چند عدد صحیح وجود دارد که با قرینهٔ مربع آن برابر باشد؟

$$4 \quad (\text{بی‌شمار})$$

$$2 \quad (۳)$$

$$1 \quad (۲)$$

$$0 \quad (\text{صفر})$$

۷۳. مربع تفاضل نصف عددی از ۳، برابر ۹ است. آن عدد کدام می‌تواند باشد؟

$$12 \quad (۴)$$

$$6 \quad (۳)$$

$$4 \quad (۲)$$

$$3 \quad (۱)$$

۷۴. مربع عددی طبیعی از دو برابر آن عدد ۱۵ واحد بیشتر است. آن عدد کدام است؟

$$5 \quad (۴)$$

$$10 \quad (۳)$$

$$3 \quad (۲)$$

$$6 \quad (۱)$$

۷۵. تفاضل ۳ برابر کدام عدد حقیقی از مربع آن، برابر ۴ است؟

$$2 \quad (۴)$$

$$1 \quad (۳)$$

$$4 \quad (۲)$$

$$-4 \quad (۱)$$

۷۶. چهار برابر مربع عددی از ۱۲ برابر آن ۹ واحد کمتر است. معکوس آن عدد کدام است؟

$$\frac{5}{6} \quad (۴)$$

$$\frac{4}{3} \quad (۳)$$

$$\frac{3}{4} \quad (۲)$$

$$\frac{2}{3} \quad (۱)$$

۷۷. کدام عدد طبیعی از سه برابر معکوسش، دو واحد بزرگ‌تر است؟

$$9 \quad (۴)$$

$$7 \quad (۳)$$

$$5 \quad (۲)$$

$$3 \quad (۱)$$

۷۸. عددی، ربع عدد دیگر است. اگر حاصل ضرب این دو عدد متمایز دو برابر مجموع آن‌ها باشد، تفاضل آن‌ها چه قدر است؟

$$6/5 \quad (۴)$$

$$6 \quad (۳)$$

$$7/5 \quad (۲)$$

$$7 \quad (۱)$$

۷۹. حاصل ضرب دو عدد طبیعی متولی از ۵ برابر عدد کوچک‌تر ۱۲ واحد بیشتر است. مجموع آن دو عدد کدام است؟

$$15 \quad (۴)$$

$$17 \quad (۳)$$

$$11 \quad (۲)$$

$$13 \quad (۱)$$



۸۹


۱ ۲ ۳ ۴

۷

 $x, x+2, x+4$: اضلاع مثلث

$$\text{محیط} = x + x + 2 + x + 4 = 2x + 6 = 24 \Rightarrow 3x + 6 = 24$$

$$\Rightarrow 3x = 24 - 6 \Rightarrow 3x = 18 \Rightarrow x = \frac{18}{3} = 6$$

مثلث قائم‌الزاویه است. $\frac{10^{\circ}+90^{\circ}}{10^{\circ}+90^{\circ}+6^{\circ}}=6,8,10$: اضلاع مثلث

$$\Rightarrow \frac{6 \times 8}{2} = \frac{48}{2} = 24$$

من فهمیدم پرآگفتین مثلث، قائم‌الزاویه است؟

دیر: کلا آنکه x, y, z سه ضلع یه مثلث دلفواه باشند و بزرگترین ضلع باشه اون وقت اگه رابطه فیثاغورث یعنی $y^2 + z^2 = x^2$ برقرار باشه می‌فهمیم که مثلث، قائم‌الزاویه است فهمت‌اگه این مثلث، قائم‌الزاویه باشه مساحتش برابر با $\frac{x \times y}{2}$ است.

۱ ۲ ۳ ۴

زوایای مثلث را $7x, 11x$ و $18x$ در نظر می‌گیریم. از آن جا که مجموع زوایای داخلی مثلث برابر 180° است، داریم:

$$7x + 11x + 18x = 180^{\circ} \Rightarrow 36x = 180^{\circ} \Rightarrow x = \frac{180^{\circ}}{36} = 5^{\circ}$$

مثلث قائم‌الزاویه است. $\frac{18(5)}{90}, \frac{11(5)}{90}, \frac{7(5)}{90}$: اندازه زوایا

اما چون زاویه‌های برابر وجود ندارد، لذا متساوی‌الساقین نیست.

۱ ۲ ۳ ۴

اگر شعاع دایره را r در نظر بگیریم، ضلع مربع برابر با قطر دایره یعنی $2r$ است و داریم:

نصف مساحت بین مربع و دایره = مساحت رنگی

$$\Rightarrow \frac{1}{2}((2r)^2 - \pi r^2) = 8$$

مساحت دایره مساحت مربع

$$\Rightarrow \frac{1}{2}(4r^2 - \pi r^2) = 8 \xrightarrow{x=2} (4r^2 - \pi r^2) = 16$$

$$\Rightarrow (4 - \pi)r^2 = 16 \Rightarrow r^2 = \frac{16}{4 - \pi} \Rightarrow r = \sqrt{\frac{16}{4 - \pi}} = \frac{4}{\sqrt{4 - \pi}}$$

۱

پاسخ فصل

۱ ۲ ۳ ۴

ابتدا معادله را تا حد امکان ساده می‌کنیم:

$$(x+1)^3 + (x+2)^3 = 2x(x-1) + 3$$

$$\Rightarrow x^3 + 3x^2 + 3x + 1 + x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = 2x^3 - 2x + 3$$

$$\Rightarrow 2x^3 + 6x^2 + 15x + 9 = 2x^3 - 2x + 3$$

$$\Rightarrow 8x^2 + 17x + 6 = 0 \Rightarrow 8x = -6 \Rightarrow x = -\frac{6}{8} = -\frac{3}{4}$$

۱ ۲ ۳ ۴

انجام چاق و لاغر
 $(x-1)(x^2 + x + 1) = x(x^2 - 2) \Rightarrow x^3 - 1 = x^3 - 2x$

$$\Rightarrow x^4 - x^4 + 2x = 1 \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

۱ ۲ ۳ ۴

جواب معادله در معادله صدق می‌کند:

$$mx + m - 1 = 1 + \frac{x}{2} \xrightarrow{x=2} 2m + m - 1 = 1 + \frac{2}{2}$$

$$\Rightarrow 3m - 1 = 2 \Rightarrow 3m = 2 + 1 \Rightarrow 3m = 3 \Rightarrow m = \frac{3}{3} = 1$$

۱ ۲ ۳ ۴

$$a(x-1) - 2bx + 2b = 0 \Rightarrow ax - a - 2bx + 2b = 0$$

$$\Rightarrow ax - 2bx = a - 2b \Rightarrow (a - 2b)x = a - 2b$$

فاکتور از

$$\xrightarrow{a-2b \neq 0} x = \frac{a - 2b}{a - 2b} = 1$$

۱ ۲ ۳ ۴

طول مستطیل را x در نظر می‌گیریم، بنابراین عرض مستطیل برابر با $\frac{x}{2}$ است و داریم:

$$\text{محیط} = 2\left(x + \frac{x}{2}\right) = 2 \times \frac{3}{2}x = 3x$$

$$\xrightarrow{\text{محیط}=15} 3x = 15 \Rightarrow \text{طول} : x = \frac{15}{3} = 5$$

$$\Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{5}{2} = 2.5$$

$$\Rightarrow 5 - 2.5 = 2.5$$

۱ ۲ ۳ ۴

$$\text{محیط} = (x+4) + x + (2x-1) = 3x + 3 = 3x + 3 = 3x$$

$$\Rightarrow 4x = 3x + 3 \Rightarrow 4x = 32 \Rightarrow x = \frac{32}{4} = 8$$

$$\xrightarrow{\text{بزرگ‌ترین ضلع}} 12 = 1, 8, 8 + 4 = 15 : \text{اضلاع مثلث}$$



معادله درجه دوم

قسمت اول: معادله درجه اول و روش‌های حل آن

هر یک از معادلات زیر را حل کنید.

$$\frac{2x - 3}{3} + \frac{2x + 1}{4} = \frac{1}{6}$$

پ)

$$\frac{3}{5}(3x - 2) = x + 1$$

ب)

$$\frac{2x + 1}{x - 1} = 0/1$$

آ)

اگر $x = 1$ جواب معادله $3 - ax = x + a$ باشد،آ) مقدار a را بیابید.

$$ax + 3a = 1 - \frac{x}{2}$$

ب)

نصف دانشآموزان سال دهم یک دبیرستان انسانی و $\frac{5}{8}$ باقی‌مانده تجربی‌اند. اگر ۱۵ دانشآموز رشتۀ ریاضی باشند آن‌گاه:

آ) تعداد کل دانشآموزان را بیابید.

ب) چند نفر انسانی‌اند؟

پ) چند نفر تجربی‌اند؟

(برگرفته از کتاب درسی) یک واحد بیشتر از ثلث عددی، با نصف آن عدد برابر است. آن عدد را بیابید.

نصف ثلث عددی را از آن عدد کم می‌کنیم، سپس ۲ واحد به آن اضافه می‌کنیم. حاصل برابر با ۷۷ می‌گردد، آن عدد کدام است؟

(برگرفته از کتاب درسی)

(برگرفته از کتاب درسی) اگر محیط مثلث و مستطیل مقابل با هم برابر باشند آن‌گاه:

آ) مقدار x را بیابید.

ب) مساحت مثلث و مستطیل را به دست آورید.

علی از محمد پرسید که تعداد بچه‌های کلاس شما چند تاست؟ محمد جواب داد:

علی و ما و نصف ما و نیمه‌ای از نصف ما، گر تو هم با ما شوی جملگی ۱۲۲ شویم. دانشآموزان کلاس محمد چند نفر هستند؟

سن شخصی $\frac{2}{3}$ تعداد سال‌هایی است که تا ۱۲۰ سالگی او مانده است. سن شخص را بیابید.

در یک امتحان اگر هر سؤال در ۹ دقیقه حل شود، ۱۰ دقیقه زمان، اضافه می‌آید و اگر هر سؤال در ۱۱ دقیقه حل شود، ۱۰ دقیقه وقت کم می‌آید. تعداد سوالات و زمان امتحان را بیابید.

در یک صندوق مقداری پول موجود است. روز اول مقداری از آن را بر می‌داریم. روز دوم، نصف روز اول، روز سوم نصف روز دوم و روز چهارم

(برگرفته از کتاب درسی) نصف روز سوم بر می‌داریم و پول صندوق تمام می‌شود.

آ) اگر پول اولیه صندوق ۱۵۰ هزار تومان باشد، روز اول چقدر برداشته‌ایم؟

ب) اگر روز اول ۷۰۰۰ تومان بیشتر از روز چهارم برداشته باشیم، پول اولیه صندوق چقدر بوده است؟

قیمت هر دفتر سه برابر قیمت هر مداد و $\frac{4}{3}$ قیمت هر خودکار است. علی برای خرید ۳ دفتر، ۴ مداد و ۵ خودکار ۹۷ هزار تومان پرداخت می‌کند.

(برگرفته از کتاب درسی) قیمت هر دفتر، هر مداد و هر خودکار چند تومان است؟

سارا از اول ماه شروع به دویدن کردۀ به طوری که هر روز دو برابر روز قبل دویده است. اگر سارا در روز هشتم، ۱۹۲ دقیقه دویده باشد آن‌گاه:

(برگرفته از کتاب درسی) آ) روز اول چند دقیقه دویده است؟

ب) در این ۸ روز مجموعاً چند دقیقه دویده است؟

۱۳. برای بافت یک قالی به ابعاد 21×28 متر (۶ متری) به تعداد ۵۸۵۰۰۰ گره استفاده شده است. (استفاده از ماشین حساب مجاز است.)

آ) اگر یک قالی باف برای بافت این قالی ۹۰۰ روز زمان بگذارد، او به طور متوسط هر روز چند گره زده است؟ (برگرفته از کتاب درسی)

ب) اگر برای بافت این قالی در مجموع ۸۷۷۵۰ متر نخ به کار رفته باشد، برای هر گره چند سانتی متر نخ به کار رفته است؟

۱۴. در یک کارخانه، حقوق یک مهندس ۴ برابر یک کارگر و $\frac{2}{5}$ مدیر بخش خود است. قسمت تولید این کارخانه ۵ مدیر بخش، ۸ مهندس و ۱۲ کارگر دارد. اگر برای این قسمت، ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شود، حقوق یک کارگر در ماه چقدر است؟ (برگرفته از کتاب درسی)

۱۷۰

قسمت دوم: معادله درجه دوم و روش‌های حل آن

۱۵. اگر یکی از جواب‌های معادله $ax^2 - 2x = 2a + 4$ برابر با -1 باشد،

آ) مقدار a را بیابید.
(برگرفته از کتاب درسی)

۱۶. معادلات زیر را به روش تجزیه حل کنید.

$$\text{پ) } 25x^3 - 20x + 4 = 0$$

$$\text{ب) } (x+5)(x-7) = x - 7$$

$$\text{آ) } \frac{x^2}{5} = x$$

$$\text{ج) } (2x+1)^3 + 5(2x+1) + 6 = 0$$

$$\text{ث) } 3a^3 - a - 3 = a(3-a)$$

$$\text{ت) } x^2 - 18x - 19 = 0$$

$$\text{خ) } (x+1)^2 = 4$$

$$\text{ح) } 25x^3 - 30x + 9 = 0$$

$$\text{ج) } 4x^3 - 8x + 3 = 0$$

$$\text{ذ) } 4x^2 - (2-x)^2 = 0$$

$$\text{د) } x^4 - 4x^2 = 0$$

آ) معادله درجه دومی بنویسید که دارای ریشه‌های $\frac{1}{4}$ و $-\frac{3}{4}$ باشد. چند معادله با این شرایط می‌توانید بنویسید؟

ب) معادله درجه دومی بنویسید که دارای ریشه مضاعف -2 باشد. آیا جواب منحصر به فرد است؟ (برگرفته از کتاب درسی)

۱۸. معادله درجه دومی بنویسید که ریشه‌هایش $1 + \sqrt{2}$ و $1 - \sqrt{2}$ باشد. آیا منحصر به فرد است؟ (برگرفته از کتاب درسی)

۱۹. معادلات زیر را به روش ریشه‌گیری حل کنید.

$$\text{ب) } 4x^2 - 1 = 0$$

$$\text{آ) } (x-1)^3 = 9$$

$$\text{ت) } (3x+1)^3 - 25 = 0$$

$$\text{ب) } (1-x)^2 = (5+2x)^2$$

$$\text{در معادله } (x+1)^3 = k$$

(برگرفته از کتاب درسی)

آ) دو مقدار برای k مثال بزنید که به ازای آن، معادله دو ریشه داشته باشد.

ب) دو مقدار برای k مثال بزنید که معادله فاقد ریشه باشد.

پ) آیا مقداری برای k وجود دارد که به ازای آن معادله دارای ریشه مضاعف باشد؟

۲۱. معادلات زیر را به روش مرربع کامل حل کنید.

$$\text{ب) } x^2 + x = \frac{1}{4}$$

$$\text{آ) } x^2 - 6x + 1 = 0$$

$$\text{ت) } x\left(x - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\text{ب) } 4x^2 + 4x + 3 = 0$$

معادلات زیر را به روش کلی (Δ) حل کنید.

$$\text{ب) } 3x^2 + \sqrt{3}x + \frac{1}{4} = 0$$

$$\text{آ) } 5x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$\text{ت) } (x+1)^2 + 2(x+1) + 5 = 0$$

$$\text{ب) } \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x = x$$

(برگرفته از کتاب درسی)

۲۲. معادلات زیر را به روش دلخواه حل کنید.

$$\text{ب) } 2(x+1)(2x-1) = (x-2)(2x+1)$$

$$\text{ب) } x(x-2) - 2(x+1) = 0$$

$$\text{آ) } x(6x+5) = 1$$

$$\text{ج) } (1+x)^2 = 6 - (1+x)^2$$

$$\text{ث) } \frac{x^2}{2} = \frac{x}{3}$$

$$\text{ت) } (x+1)^2 = 4(2x-1)$$

۲۴. معادله درجه دومی مثال بزنید که ریشه نداشته باشد. سپس معادله درجه دومی مثال بزنید که یک ریشه داشته باشد. (برگرفته از کتاب درسی)

(برگرفته از کتاب درسی)

$$kx^2 + x - k = 0 \quad \text{(پ)}$$

۲۵. تعداد ریشه‌های هر معادله را به ازای مقدار دلخواه k به دست آورید.

$$x^2 + x - k^2 = 0 \quad \text{(آ)}$$

$$k^2 x^2 + kx + 1 = 0 \quad \text{(ت)}$$

۲۶. در معادله درجه دوم $, mx^2 + (1-2m)x + m = 0$ آ) m را طوری بباید که معادله فاقد جواب باشد.ب) m را طوری بباید که معادله دارای ریشه مضاعف باشد. آن ریشه را بباید.پ) m را طوری بباید که معادله دارای ۲ ریشه حقیقی متمایز باشد.

بدون حل معادلات زیر، مجموع و حاصل ضرب ریشه‌ها را بباید.

$$3x(x-1) = 2 + 3x \quad \text{(آ)}$$

$$\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{6} = 0 \quad \text{(ب)}$$

۲۸. اگر یکی از جواب‌های معادله $= 0$ $4x^2 + 4x + m = 0$ باشد، مقدار m و جواب دیگر معادله را به دست آورید.

(برگرفته از کتاب درسی)

۲۹. در معادله درجه دوم $= 0$ $, 4x^2 - (k-1)x + 3k = 0$ ، مجموع و حاصل ضرب ریشه‌ها قرینه یکدیگرند. مقدار k را بباید.۳۰. اگر مجموع ریشه‌های معادله $= 0$ $(m+2)x^2 + 5mx - 1 = 0$ باشد، مقدار m و حاصل ضرب ریشه‌ها را به دست آورید.۳۱. اگر x_1 و x_2 ریشه‌های $= 0$ $3x^2 - 4x - 4 = 0$ باشند، حاصل عبارت‌های زیر را بدون حل معادله بباید.

$$2x_1 + 2x_2 \quad \text{(پ)}$$

$$x_1 x_2 \quad \text{(آ)}$$

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \quad \text{(ت)}$$

$$x_1^2 x_2 + x_2^2 x_1 \quad \text{(ج)}$$

۳۲. اگر حاصل ضرب ریشه‌های معادله $= 0$ $mx^2 + (-3m-1)x + 6 = 0$ باشد،

آ) مجموع ریشه‌ها را بباید.

ب) ریشه‌های معادله را به دست آورید.

۳۳. در معادله $= 0$ $-1 = 3x^2 + 2x + m$ مقدار m را طوری بباید که:

آ) معادله دو ریشه متمایز داشته باشد. مجموع این ریشه‌ها چقدر است؟

ب) معادله دارای ریشه مضاعف باشد. آن ریشه را بباید.

پ) معادله فاقد ریشه باشد.

ت) معادله دارای ریشه صفر باشد.

ث) معادله دارای دو ریشه معکوس و قرینه باشد.

۳۴. در معادله درجه دوم $= 0$ $ax^2 + bx + c = 0$ نشان دهید: (ویژه علاقمندان)آ) اگر $a + b + c = 0$ باشد، یکی از ریشه‌ها برابر ۱ است. ریشه دیگر را بباید.ب) اگر $b = a + c$ باشد، یکی از ریشه‌ها برابر -۱ است. ریشه دیگر را به دست آورید.

(برگرفته از کتاب درسی)

قسمت سوم: کاربردهای معادله درجه دوم

۳۵. یک واحد کمتر از مربع ثلث عددی صحیح برابر با نصف آن عدد است. آن عدد را بباید.

۳۶. اگر تفاضل عددی از معکوس آن برابر با $\frac{5}{6}$ باشد، آن عدد را به دست آورید.۳۷. مجموع معکوس دو عدد طبیعی فرد متوالی برابر با $\frac{8}{15}$ است. به کمک حل معادله درجه دوم این دو عدد را بباید.۳۸. مجموع مربعات دو عدد طبیعی فرد متوالی برابر 13^0 است. آن دو عدد را بباید.

۳۹. وقتی آراد متولد شد پدر او ۳۴ سال داشت. اگر حاصل ضرب سن فعلی آن‌ها ۲۴۰ باشد، سن آراد و پدرش را بباید.



۴۰. مساحت و محیط یک مستطیل به ترتیب ۱۴ و ۱۸ می‌باشد. طول اضلاع آن را بباید.

۴۱. مستطیلی به ابعاد $1+x$ و $3+x$ دارای قطری به طول $2x$ است. مقدار x و مساحت مستطیل را به دست آورید.


۴۲. اگر مساحت مثلث از مساحت مربع ۱ واحد کمتر باشد:

آ) مقدار x را بباید.

ب) مساحت هر دو شکل را به دست آورید.




(برگرفته از کتاب درسی)




(برگرفته از کتاب درس)

۴۳. از مربعی به ضلع ۶cm، سه شکل روبه رو بریده شده است. مساحت باقیمانده 24cm^2 است. طول ضلع کوچک بریده شده (x) چقدر است؟

۴۴. اگر مجموع مساحت های دو شکل زیر برابر ۶ باشد، طول ضلع مربع چقدر است؟



(۱)



(۲)

$$r = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x$$

۱۷۲

۴۵. در شکل روبه رو، طول تمام پاره خط ها به جز دو پاره خط مشخص شده، برابر x است. اگر اندازه مساحت شکل برابر با اندازه محیط آن باشد، مقدار x را بدست آورید.

(برگرفته از کتاب درس)

۴۶. هزینه اولیه یک کارگاه 44 میلیون و هزینه تولید هر واحد کالا 600 هزار تومان است. اگر قیمت تعیین شده برای هر واحد کالا در این کارگاه نسبت به تعداد کالای فروخته شده به صورت $(10 - 0.5x)$ میلیون تومان باشد، (می توانید از ماشین حساب استفاده کنید).

(آ) رابطه های هزینه و سود این کارگاه را بنویسید.

(ب) به ازای تولید چه مقدار کالا کارگاه نه سود می کند و نه زیان؟

۴۷. هزینه یک کارگاه به کمک رابطه $x = 640 + 12x$ میلیون تومان به ازای تولید x واحد کالا به دست می آید. اگر معادله تقاضای این کالا با قیمت p به صورت $p = 100 - x$ باشد، آن گاه:


(آ) رابطه درآمد و سود را (برحسب x) بنویسید.

(ب) اگر کارگاه هیچ کالایی نفروشد، چقدر ضرر می کند؟

(پ) نقاط سربه سر برای تولید این کارگاه را بیابید.

(ت) به ازای تولید چه تعداد کالا، سود کارگاه، ماکسیمم خواهد شد؟

(ث) بیشترین مقدار سود این کارگاه را تعیین کنید.



۴۸. برای ساخت تابلوی مقابل، از برچسب های سفید و قرمز استفاده شده است. هزینه 2cm برچسب سفید 30 تومان و هزینه 1cm برچسب قرمز 10 تومان است. مجموع هزینه برچسب های سفید و قرمز 27000 تومان شده است. مقدار x را بدست آورید.

(برگرفته از کتاب درس)

قسمت چهارم: معادله های شامل عبارت های گویا

(برگرفته از کتاب درس)

۴۹. معادلات گویای زیر را حل کنید.

$$\frac{5}{x-1} - \frac{x}{x-1} = x+1 \quad (\text{ب})$$

$$\frac{11}{x^2-4} + \frac{x+3}{2-x} = \frac{2x-3}{x+2} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{2x-1}{x+1} = \frac{1}{3} \quad (\text{آ})$$

$$\frac{2x+2}{x^2+x} + \frac{3x-2}{x} = 1 \quad (\text{ج})$$

$$\frac{x+3}{3x-2} = 1 - \frac{1}{x+4} \quad (\text{ث})$$

$$\frac{2x^2+4}{2x+1} = x \quad (\text{ت})$$

$$\frac{x+3}{x-3} - \frac{x}{x+3} = \frac{6}{x^2-9} \quad (\text{خ})$$

$$\frac{3}{x-2} - \frac{2}{x+2} = \frac{1}{x-3} \quad (\text{ح})$$

$$\frac{3x+1}{x+1} + \frac{2x+7}{x+4} = 5 \quad (\text{ج})$$

$$\frac{2x}{x+1} - \frac{6}{x^2-x-2} = \frac{x+1}{x-2} \quad (\text{ر})$$

$$\frac{7}{x-4} - \frac{5}{x-2} = \frac{1}{2} \quad (\text{ذ})$$

$$\frac{x}{5} + \frac{1}{x+1} = \frac{x-1}{2x+2} \quad (\text{د})$$

(برگرفته از کتاب درس)

۵۰. به ازای چه مقدار a معادله $\frac{2x}{a-x} + \frac{a-x}{2x} = \frac{2a}{x}$ دارای جواب $x=1$ است؟

(برگرفته از کتاب درس)

۵۱. اگر $x=4$ جواب معادله $\frac{x-2}{5x} = \frac{1}{k} - \frac{4}{15x}$ باشد، مقدار k و جواب دیگر معادله را در صورت وجود بیابید.

(برگفته از کتاب درس)

$$a = -2\sqrt{2}$$

$$a = 2$$

$$a = 1 \text{ (آ)}$$

- .۵۲. مجموع و حاصل ضرب ریشه های معادله $\frac{x-1}{2x-1} = \frac{3}{x+3}$ را بیابید.
- .۵۳. مجموع معکوس عددی با آن عدد برابر a است. برای مقادیر مختلف a ، آن عدد را بیابید.
- .۵۴. دو حسابدار با هم کار حسابرسی یک اداره را در ۶ ساعت کاری انجام می‌دهند. اگر این حسابدارها به تنها یکی کار حسابرسی را انجام دهند، یکی از آنها ۵ ساعت زودتر از حسابدار دیگر کار حسابرسی را تمام می‌کند. هر یک از حسابدارها به تنها یکی چند ساعت کار حسابرسی انجام می‌دهند؟

(برگفته از کتاب درس)

- .۵۵. مادری تعدادی شکلات بین خودش و اعضای خانواده اش به طور مساوی تقسیم می‌کند. اما برای این که به هر نفر تعداد بیشتری شکلات برسد، سهم خودش را می‌بخشد و این بار همه شکلات‌ها را بین همه اعضای خانواده اش به طور مساوی تقسیم می‌کند تا سهم هر نفر $\frac{1}{6}$ بیشتر شود. تعداد اعضای خانواده چند تاست؟

- .۵۶. در ساخت یک آلیاژ، از دو فلز آلومینیم و آهن به نسبت ۵ به ۱ استفاده شده است (یعنی نسبت وزن آلومینیم به آهن برابر ۵ است). اگر این آلیاژ را ذوب کنیم و ۵۰۰ گرم آلومینیم به آن اضافه کنیم، $\frac{1}{7}$ وزن آلیاژ را آهن تشکیل می‌دهد. وزن آلیاژ قبل از ذوب شدن چقدر است؟

(برگفته از کتاب درس)

پاسخ فصل ۱

$$\Rightarrow x = \frac{x}{2} + \frac{5}{8} \left(\frac{x}{2} \right) + 15 \Rightarrow x - \frac{x}{2} - \frac{5}{16} x = 15$$

$$\begin{array}{l} \text{ضرب تمام جملات در ۱۶} \\ 16x - 8x - 5x = 240 \\ \text{برای از بین بردن مخرجها} \end{array}$$

$$\Rightarrow 3x = 240 \Rightarrow x = \frac{240}{3} = 80$$

$$\text{انسانی} = \frac{x}{2} = \frac{80}{2} = 40$$

(ب)

$$\text{تجربی} = \frac{5}{8} \times \frac{x}{2} = \frac{5}{8} \times \frac{80}{2} = 25$$

(پ)

۴

۱ واحد بیشتر از ثلث عدد

$$\begin{array}{l} \text{نصف عدد} \\ \overbrace{\frac{1}{3}x + 1}^{\text{نصف عدد}} = \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{1}{3}x - \frac{1}{2}x = -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{ضرب تمام جملات در ۶} \\ 2x - 3x = -6 \Rightarrow -x = -6 \Rightarrow x = 6 \end{array}$$

۵

نصف ثلث عدد

$$\begin{array}{l} \overbrace{x - \frac{1}{3} \left(\frac{x}{3} \right) + 2}^{x - \frac{1}{9}x + 2} = 77 \Rightarrow x - \frac{1}{6}x + 2 = 77 \\ \Rightarrow x - \frac{1}{6}x = 77 - 2 \Rightarrow x - \frac{1}{6}x = 75 \\ \times 6 \rightarrow 6x - x = 450 \Rightarrow 5x = 450 \Rightarrow x = \frac{450}{5} = 90 \end{array}$$

۶

$$\begin{array}{l} \overbrace{7x-1}^{7x-1} = 2 \left(\overbrace{4x+3x-1}^{7x-1} \right) = 2(7x-1) = 14x-2 \\ = 3x+5x-\cancel{x}+4x+\cancel{x}=12x \end{array}$$

(آ)

$$\frac{2x+1}{x-1} = \frac{1}{10} \xrightarrow{\text{طرفین وسطین}} 10(2x+1) = (x-1)$$

۱

(آ)

$$20x + 10 = x - 1 \Rightarrow 20x - x = -1 - 10$$

$$19x = -11 \Rightarrow x = \frac{-11}{19}$$

$$\frac{3}{5}(3x-2) = x+1 \xrightarrow{x=5} 3(3x-2) = 5(x+1)$$

۲

(آ)

$$9x-6=5x+5 \Rightarrow 9x-5x=5+6 \Rightarrow 4x=11 \Rightarrow x=\frac{11}{4}$$

$$\frac{2x-3}{3} + \frac{2x+1}{4} = \frac{1}{6} \xrightarrow{x=12} 4(2x-3) + 3(2x+1) = 2$$

۳

(آ)

$$8x-12+6x+3=2 \Rightarrow 14x-9=2 \Rightarrow 14x=2+9$$

$$14x=11 \Rightarrow x=\frac{11}{14}$$

۴

(آ)

جواب معادله در معادله صدق می‌کند:

$$x+a=3-ax \xrightarrow{x=1} 1+a=3-a \Rightarrow a+a=3-1$$

$$2a=2 \Rightarrow a=\frac{2}{2}=1$$

$$ax+3a=1-\frac{x}{2} \xrightarrow{a=1} x+3=1-\frac{x}{2}$$

۵

(آ)

$$x+\frac{x}{2}=1-3 \xrightarrow{\text{طرفین وسطین}} \frac{3}{2}x=-2 \Rightarrow 3x=-4 \Rightarrow x=\frac{-4}{3}$$

۶

(آ)

تعداد کل دانش‌آموzan دهم را x در نظر می‌گیریم، داریم:

$$\frac{x}{2} = 15 \Rightarrow x = 15 \times 2 = 30$$